

ជំពូក ៥

ស្ថានភាពបរិស្ថានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់គំរោង

Description of Environment

ជំពូកទី ៥

ស្ថានភាពបរិស្ថានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់គំរោង

៥.១ សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងជំពូកនេះគឺ ពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពធនធានបរិស្ថានដែលមានស្រាប់ (បរិស្ថានរូបសាស្ត្រ បរិស្ថានជីវសាស្ត្រ និង បរិស្ថានសង្គម) ក្នុងតំបន់ទីតាំងគំរោងដែលប្រមូលព័ត៌មានបានពីស្ថាប័ន អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការចុះអង្កេតស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ ពីមូលដ្ឋាន ដើម្បីបានទិន្នន័យគ្រឹះសំរាប់ធ្វើការវិភាគ និងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (ESIA) ដែលនឹងកើត ឬ អាចកើតឡើងពីសកម្មភាព នៃការអនុវត្តគំរោង ។

ក្នុងជំពូកនេះក៏វាយការណ៍ខ្លះៗផងដែរអំពីសំណូមពរ និងប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាធារណជន និង ស្ថាប័ន- អង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទីតាំងគំរោង ។

៥.២ បរិស្ថានរូបសាស្ត្រ (Physical Environment)

៥.២.១ ធាតុនិយម, ប្រព័ន្ធចលសាស្ត្រ និង ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (Meteorology Hydrology & Irrigation Systems)

៥.២.១.១ របបទឹកភ្លៀង (Rainfall)

តំបន់កំបោល មានបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្ពស់បង្អួចប្រៀបទៅតំបន់ផ្សេងទៀត ព្រោះវាស្ថិតនៅក្បែរតំបន់មាត់សមុទ្រ ខេត្តកំពង់នៃប្រទេសកម្ពុជា និងនៅជ្រលងនៃជួរភ្នំដី ។ បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលកត់ត្រាបាននៅស្ថានីយ៍ឧតុនិយមកំពត គិតជា មធ្យមក្នុងរយៈពេល ៣៦ ឆ្នាំ (គិតពីឆ្នាំ ១៩៥៨ ដល់ ២០០៥) គឺ ១៨៣៦ មម (Return Period 36 years) ។ ម្យ៉ាងវិញ ទៀត តំបន់នេះងាយនឹងទទួលរងនូវភ្លៀងព្រិះទីហ្មង (Typhoon rainstorm) ដែលបង្កឱ្យមានជំនន់ លិចលង់ក្នុងតំបន់កំពត ជាញឹកញយ ជាឧទាហរណ៍ ជំនន់នៅឆ្នាំ១៩៩៩ (កំពស់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេលដប់ថ្ងៃជាប់គ្នា ២៧កក្កដា ដល់ ៤ខែសីហា មានដល់ទៅ ៤៥២មម) ឆ្នាំ២០០០ (កំពស់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេលតែបីថ្ងៃ ២២-២៤ខែសីហា មានដល់ទៅ ៣២៤មម) និង ឆ្នាំ២០០៦ (កំពស់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេលតែបីថ្ងៃ ១៣-១៥ ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ មានដល់ទៅ ៣១៥មម) យោងតាម កំណត់ត្រាកំពស់ទឹកភ្លៀងនៅស្ថានីយ៍កំពត ។ សំគាល់: ទិន្នន័យទឹកភ្លៀងនេះ យកត្រឹមឆ្នាំ ២០០៥ ពីព្រោះគំរោងបានគណនា និងគ្រោង តម្រូវទិន្នន័យនេះ ។


តារាងទី៩ : បរិមាណទឹកភ្លៀង ក្នុងរយៈពេល៣៦ឆ្នាំ (១៩៥៨-២០០៥) នៅស្ថានីយ៍កំពត គិតជា មម.


Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dece	Yearly
1958	33.4	13.1	0	149.2	198.1	213.2	275.8	387.8	303.4	332.2	40.9	2.1	1949.2
1959	0.2	46.6	210.5	232.8	104.2	66.8	305.5	634	128.8	127.2	66.8	110	2033.4
1961	34.4	10.3	68.6	77.4	282.3	352.5	347.9	633	236.8	204.2	101.9	40.4	2389.7
1962	8.5	1.2	57.3	193.8	98.3	184.1	49.3	222.5	413.8	188.3	21.5	2	1440.6
1963	1	8.5	87	49.2	99.4	140.7	196.3	240.4	337	248.7	162.9	6.1	1577.2
1964	19.2	12.2	6.3	199.1	167.1	94.7	80.5	482.6	212.2	161.9	111.4	86.1	1633.3
1965	4	64.8	43.4	181.1	258.6	541.2	329.1	186.9	258.8	261.3	147.4	79.4	2356.0
1966	11	45.8	170.7	106.7	355.3	66.3	211.7	330.9	178.8	333	103.8	50.8	1964.8
1967	80.9	8	0	186	247.9	288.8	417.1	609.7	94.9	274	14.5	9.1	2230.9
1968	13	17.8	14.8	215.2	77.9	134.9	143.7	332.6	173.3	245.9	16.7	38.7	1424.5
1969	34.2	23.2	88.5	41	129.3	98.7	37.3	186.2	299.3	154.3	169.6	16.6	1278.2
1970	23.5	2.3	38	319.6	180.2	224.7	328.3	255.3	329.7	235.9	118.8	179.6	2235.9
1972	1.2	32.9	73	181.3	25.4	284.1	565.9	260	441.1	220.1	191.3	49	2325.3

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Yearly
1983	0	2	0	81.7	155.7	223	56.9	311.5	209.5	288.6	0	0	1328.9
1984	16.4	28.2	24.1	81.6	69	494	147.4	490.4	101.6	189.5	44.4	0	1686.6
1985	0	28	27.1	214.6	288.3	331.5	49	191	236.5	244.1	68.2	27.2	1705.5
1986	9.5	68	2	190.7	676.8	174.3	211.1	698.5	358.5	276.6	139.3	14.2	2819.5
1987	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.8	303.8	279.6	192.3	286.4	0.0	1135.9
1988	11	33	23.0	242.6	212.1	204.4	222.5	105.6	149.7	0.0	0.0	0.4	1204.3
1989	18.6	0.2	60.1	64	226.8	164.6	154.3	284.4	103.3	239.5	9.5	0.2	1325.5
1990	11.6	0	102.5	135.7	201.9	247.5	137.4	348.4	154.9	258.4	48.6	9.6	1656.5
1991	3.8	4.4	24.2	122.7	216.3	196.8	516.1	521.6	244.9	88.4	0	0.2	1939.4
1992	3.9	14.7	43.2	40.5	68.6	133.8	171.3	632.2	76.5	457.4	66.5	36.4	1745.0
1993	87.4	0	84.7	55.5	51.3	201.5	315.4	315	224.7	297.5	122.9	7.4	1763.3
1994	4.6	14.7	156.3	84.2	130.8	238.9	462.8	444.3	248.9	130.1	7.4	100.2	2023.2
1995	11.2	1.2	80.4	142.0	171.2	115.3	204.9	467.9	320.5	95.7	44.9	43.8	1699.0
1996	29.9	-	2.6	78.0	57.3	76.7	284.1	106.8	288.2	233.5	200.4	44.7	1402.2
1997	19.0	12.6	13.4	72.0	77.4	287.0	174.1	536.9	65.6	184.0	477.5	0.3	1919.8
1998	7.8	-	-	86.8	203.2	135.4	59.2	191.2	372.6	198.9	-	-	1255.1
1999	64.5	17.0	279.5	187.9	215.0	229.6	554.2	318.7	210.6	282.9	173.0	0.0	2532.9
2000	14.8	56.3	102.6	224.2	204.1	157.4	314.9	529.0	222.1	349.9	53.9	107.8	2337.0
2001	54.8	0.9	225.6	99.7	152.2	307.7	270.3	494.6	154.6	353.1	128.4	47.4	2289.3
2002	0.0	2.8	0.8	142.4	190.1	83.8	295.0	399.7	215.3	94.1	119.2	69.7	1612.9
2003	0.0	9.4	71.1	28.8	407.8	110.2	478.3	347.4	278.0	420.2	66.9	4.4	2222.5
2004	4.3	18.0	13.8	114.7	128.9	251.5	195.1	391.8	171.0	181.7	102.6	0.0	1573.4
2005	16.8	0	18.8	46.9	232.8	139.4	528.2	294.3	260	359.3	144.2	38.4	2079.1
Mean	18.2	16.6	61.5	129.7	182.3	199.9	254.6	374.6	232.1	233.4	99.2	34.0	1836.0
Max	87.4	68	279.5	319.6	676.8	541.2	565.9	698.5	441.1	457.4	477.5	179.6	4792.5
Min.	0	0	0	0	0	0	37.3	105.6	65.6	0	0	0	1135.9

(ប្រភពទិន្នន័យបានពី មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តកំពត និង ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និង ក្រុមហ៊ុន SINOHYDRO Corporation Limited)

យោងតាមតារាងទី៩ និង ក្រាហ្វិក ១ បានបង្ហាញថាកំពស់ទឹកភ្លៀងខ្លាំងជាងគេក្នុងកំឡុងពេល ៣០ឆ្នាំនៅខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៦ ដែលមានដល់ទៅ ៦៩៨,៥ មម. ។





៥.២.១.២ សីតុណ្ហភាព (Temperature)

ប្រភពទិន្នន័យបានពីរបាយការណ៍មេរបស់ Kamchay SinoHydro Hydroelectric Co.,Ltd. ដែលយកបានពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញ ថា :

- មធ្យមភាគនៃសីតុណ្ហភាពអតិបរមារយៈពេល ១ ឆ្នាំ មានកំរិត ៣២⁰ C
- មធ្យមភាគនៃសីតុណ្ហភាពអប្បបរមារយៈពេល ១ ឆ្នាំ មានកំរិត ២៣,៣⁰ C
- មធ្យមភាគនៃសីតុណ្ហភាពរយៈពេល ១ ឆ្នាំ មានកំរិត ២៦,៩⁰ C
- សីតុណ្ហភាពអតិបរមារយៈពេល ១ ឆ្នាំ ខ្ពស់បំផុតមានកំរិត ៣៤,៦⁰ C
- សីតុណ្ហភាពអប្បបរមារយៈពេល ១ ឆ្នាំ ទាបបំផុតមានកំរិត ២១⁰ C

៥.២.១.៣ សំណើមបរិយាកាស (Humidity)

តាមរយៈការសិក្សា និងទិន្នន័យដែលទទួលបានពីរបាយការណ៍មេរបស់ SINOHYDRO Corporation Limited បានបង្ហាញ ថា តំបន់កំពត (ក្បែរតំបន់វារីអគ្គិសនី) មានសំណើមបរិយាកាសជាមធ្យមក្នុង១ឆ្នាំគឺ ៧៩,៨% ។ សំណើមនេះមានកំរិតទាបជាង គឺនៅរដូវប្រាំង ក្នុងចន្លោះ ខែធ្នូ ដល់ ខែឧសភា បន្ទាប់ពីមានខ្យល់មូសុងត្រជាក់ បក់ពីទិសខាង ជើងឈៀងខាងកើត ដែលមានកំរិតចន្លោះពី ៧៩% ទៅ ៧៩% និងនៅរដូវវស្សា ពីខែមិថុនា ដល់ ខែ វិច្ឆិកា ដែលមានកំរិតចន្លោះពី ៨១% ទៅ ៨៥% ។

៥.២.១.៤ កំរៅថ្ងៃ (Sunlight)

យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលយកបានពីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានបង្ហាញថា តំបន់កំពតបានទទួលពន្លឺថ្ងៃជាមធ្យម ៦,៣ ម៉ោង/ថ្ងៃ កំរិតនេះមានការកើនឡើងនៅចន្លោះខែ មករា និង មេសា គឺ ៧,៤ ទៅ ៨ ម៉ោង/ថ្ងៃ និងគិតជាមធ្យម គឺ ៦,៣ ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ ។

៥.២.១.៥ គុណភាពខ្យល់

មុនការសាងសង់គម្រោង តំបន់នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិបូកគោ នៅក្នុងខេត្តកំពត ដែលជាតំបន់ការពារ ហើយមានចំងាយប្រមាណ ១៥ គីឡូម៉ែត្រ ភាគខាងជើងនៃទីរួមខេត្តកំពត (គិតត្រឹមទំនប់ ទីមួយ) ដែលជាតំបន់មានព្រៃឈើ

និងដឹកសិកម្មតិចតួចនៅក្នុងតំបន់គម្រោងគ្មានតំបន់លំនៅដ្ឋានជាទីប្រជុំជនធំ ឬតំបន់ឧស្សាហកម្ម ឬពាណិជ្ជកម្មទេ ។ ចំពោះផ្លូវថ្នល់ មានផ្លូវលំជនបទគ្មានស្ពានរឹងមាំទេ មានតែស្ពានបណ្តោះអាសន្ន ហេតុដូច្នេះហើយនៅក្នុងតំបន់គម្រោងនោះ គឺគុណភាពខ្យល់មានលក្ខណៈនៅជាធម្មជាតិគ្មានការ បំពុលខ្យល់ទេ ហើយក៏គ្មាន ទិន្នន័យណាដែលបញ្ជាក់ពីការ បំពុលខ្យល់នៅតំបន់នោះដែរ ។

ចំពោះការធ្វើតេស្តគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងតំបន់គម្រោងនោះក្រុមការងារ SAWAC បានសហការណ៍ជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ នៃក្រសួងបរិស្ថាន បានចុះទៅវាស់គុណភាពខ្យល់និងសំឡេង ២៤ ម៉. នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១០ (កំឡុងពេល សាងសង់គម្រោង) នៅចំណុចប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទី២ ដែលជាកន្លែងមាន សកម្មភាពមហាញ្ជីកជាងគេក្នុងតំបន់គម្រោង បានបង្ហាញថា គុណភាព ខ្យល់ ស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតស្តង់ដារ របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅឡើយ (លំអិតមើលតារាងលេខ១០ ខាងក្រោម)

តារាងលេខ ១០ : គុណភាពខ្យល់នៅក្នុងតំបន់គម្រោងកំឡុងពេលសាងសង់ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០)

លរ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ខ្នាត	លទ្ធផល	ស្តង់ដារ	គោលការណ៍ និង ឧបករណ៍
No	Parameter	Unit	Result	Standard	Principal/Equipment
1	Cabon Monoxide(CO)	mg / m ³ N	1.06	20	Detection Tube
2	Nirogen Dioxide (NO2)	mg / m ³ N	0.04	0.1	Saltzman Method
3	Sulfur Dioxide (SO2)	mg / m ³ N	0.03	0.3	Pararosaniline Method
4	Total Suspended Particles(TSP)	mg / m ³ N	0.18	0.33	Low volume sampler Method

៥.២.១.៦ សំឡេង និងវិញ្ញ័យ

មុនការសាងសង់គម្រោងដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចគុណភាពខ្យល់រួចមកហើយ ពេលគឺតំបន់គម្រោង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ឧទ្យានជាតិបូកគោ ដែលជាតំបន់ការពារ ហើយមិនមែនជាតំបន់ទីប្រជុំជន ឬតំបន់ ពាណិជ្ជកម្ម ឬតំបន់ឧស្សាហកម្មទេ ដូចនេះគ្មានការបំពុលណាមួយដោយសារសំឡេង និងវិញ្ញ័យ គួរឱ្យកត់សំគាល់ទេ ក្រៅពីសំឡេង ម៉ូតូ រថយន្តតូច រទេះគោ គោយន្ត តិចតួចនៅតាមលំដងបទ នៃស្រុកទឹកឈូ ព្រមទាំងសំឡេងសត្វ ព្រៃស្រែក ដូចជាសត្វទោច បក្សីចក់វឹក ព្យាង ជាដើម ។ល។

ក្នុងកំឡុងពេលសាងសង់គម្រោងក្រុមការងារ SAWAC បានសហការណ៍ជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ នៃក្រសួងបរិស្ថាន បានចុះ ទៅវាស់គុណភាពខ្យល់ និងសំឡេង ២៤ម៉. នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១០ នៅចំណុចប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទី២ ដែលជាកន្លែងមាន សកម្មភាព មហាញ្ជីកជាងគេក្នុងតំបន់គម្រោង បានបង្ហាញថា គុណភាព សំឡេង លើពីកម្រិតស្តង់ដារ របស់ក្រសួងបរិស្ថានតិចតួច ដូចជាចាប់ ពីពេលព្រឹកម៉ោង ៦:០០ ដល់រសៀលម៉ោង ១៣:០០ សំឡេងជាមធ្យមមានការលើស្តង់ដារ គឺ ៧១,៣៦ dB ស្តង់ដារ ៧០ dB ប៉ុន្តែចាប់ពីម៉ោង ១៤:០០ ល្ងាចម៉ោង ១៨:០០ ស្ថិតក្រោមស្តង់ដារវិញ គឺ ៦៧,២០ dB វិញ ។ ពេលព្រលប់ចាប់ពីម៉ោង ១៩:០០ ដល់ ម៉ោង២២:០០ គុណភាពសំឡេងក្នុងការដ្ឋានក៏ស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដារដែរគឺ ជាមធ្យម៥៩,៧៥ B ឯស្តង់ដារ ៦៥dB ។ ចំណែក ឯពេលយប់ ចាប់ពី ម៉ោង២៣:០០ ដល់ ៥:០០ គុណភាពសំឡេងមានការកើនឡើងវិញ គឺជាមធ្យម៥៩,៧៥ dB ស្តង់ដារ ៥០ dB (លំអិតមើលតារាងលេខ១១ ខាងក្រោម) ។

តារាងលេខ ១១ : គុណភាពសំឡេង នៅក្នុងតំបន់គំរោងកំឡុងពេលសាងសង់ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០)

Time of Day	Survey Period	Noise Level dB(A)				Remarks
		LAed	Standard	Lmax	Lmin	
Day	6:00-7:00	71	70	86	69.0	Generator
	7:00-8:00	72.1		94	68.5	
	8:00-9:00	70.9		83.9	68.0	
	9:00-10:00	71.4		89.9	68.1	
	10:00-11:00	72.2		83.3	68.6	
	11:00-12:00	70.3		97.4	67.2	
	12:00-13:00	70.9		91.6	67.4	
	13:00-14:00	72.1		103	67.3	Mean=71.36dB
	14:00-15:00	69.8		92.1	67	
	15:00-16:00	71.2		84.4	57.3	
	16:00-17:00	66.7		88.5	57.2	
	17:00-18:00	66.3		88.1	46.9	
Evening	18:00-19:00	62		86.9	46.5	Mean=67.20dB
	19:00-20:00	56.6	65	82.2	45.9	
	20:00-21:00	59.9		77.3	47.9	
	21:00-22:00	61.3		85.4	47.4	
	22:00-23:00	61.2		83.3	49	Mean=59.75dB
Night	23:00-00:00	53.5	50	72.1	49.2	
	00:00-1:00	50.7		70.3	48.1	
	1:00-2:00	51.6		71.2	48.4	
	2:00-3:00	70.1		73.6	68.4	Generator
	3:00-4:00	70.8		71.5	69.9	
	4:00-5:00	72.3		97.9	68.3	
	5:00-6:00	71.3		86.9	69.8	Mean=59.75
24 hours Average		66.09		85.03	59.64	

សំគាល់: អត្ថបទពណ៌ក្រហមគឺជាលទ្ធផលលើសស្តង់ដារក្រសួងបរិស្ថាន

ចំពោះគុណវិញ្ញាណក្នុងពេលសាងសង់គំរោង នៅក្នុងតំបន់សាងសង់វិញ្ញាណក្រៅក្រោមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅឡើយទេ (លម្អិតមើលតារាងលេខ១២ ខាងក្រោម) ។

តារាងលេខ ១២ : គុណភាពសំឡេង នៅក្នុងតំបន់គំរោងកំឡុងពេលសាងសង់ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០)

Survey Period Day time	Standard of Type 1*	Leq (db)	Survey Period Night time	Standard of Type 1*	Leq (db)	Remark
6:00-7:00	Max 65 db Day time	43.2	18:00-19:00	Max 60 db Nigh time	26	
7:00-8:00		43.3	19:00-20:00		26.5	
8:00-9:00		43.6	20:00-21:00		26.7	
9:00-10:00		43.4	21:00-22:00		22.5	
10:00-11:00		48.8	22:00-23:00		19.9	
11:00-12:00		46.9	23:00-00:00		20.8	
12:00-13:00		46.9	00:00-1:00		20.1	
13:00-14:00		46.3	1:00-2:00		19.8	
14:00-15:00		46.3	2:00-3:00		40.6	
15:00-16:00		45.4	3:00-4:00		43.7	
16:00-17:00		27	4:00-5:00		43.4	
17:00-18:00		27.6	5:00-6:00		43.3	
Average		42.40	Average		29.44	

៥.២.១.៧ ប្រព័ន្ធអូរមន្ទី និងប្រព័ន្ធបោះទឹកក្នុងតំបន់គំរោង

(River System and Drainage Pattern in the Project Area)

ការសិក្សាតាមរយៈផែនទី JICA ឆ្នាំ ២០០២ DANIDA ២០០៦ និងការចុះអង្កេតផ្ទាល់ដល់ទីតាំងគំរោង លើផ្ទៃដីសរុប ប្រមាណជាង ២០០០ ហិកតា មានប្រព័ន្ធដោះទឹកជាលក្ខណៈធម្មជាតិដូចតទៅ :

- អាងរងទឹកភ្លៀងសរុបរបស់ព្រែកទឹកឈូ(ស្ទឹងកំប៉ាយ) គិតត្រឹមទំហំទី១ (RCC Dam 1) គឺប្រមាណ ៧០៩ Km² (ប្រភព ទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន) ។
- រីងអាងរងទឹកភ្លៀងសរុបរបស់ព្រែកទឹកឈូ(ស្ទឹងកំប៉ាយ)គិតត្រឹមទំហំទី២ (RCC Dam2) គឺប្រមាណ ៧៤៧ Km² (ប្រភព ទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន) ។
- ទឹកភ្លៀងត្រូវបានដោះតាមប្រឡាយធម្មជាតិជាច្រើនរួចហូរចុះទៅអូរធម្មជាតិសំខាន់ៗ(ដែលមានទឹកខូបប្រាំង និង វស្សា) ដូចជា អូរផ្លូវប៊ុយ, អូរបាយខ្ញុំ, អូរជ្រោះសោម, អូរពិរ, អូរបី ។ អូរទាំងនេះហូរចូល ព្រែកទឹកឈូ (ស្ទឹងកំប៉ាយ) រួចហូរចុះមកក្រោម ហើយបែកចេញជាពីរគ្រងតំបន់ត្រើយកោះ គឺស្ពាន់ដៃព្រែក កំពុងបាយ និង ខាងឆ្វេងដៃព្រែក កំពុងកណ្តាល រួចព្រែក ទាំងពីរនេះហូរចូលទៅឈូងសមុទ្រថៃ។ នៅផ្នែកខាងលើ នៃព្រែក ទឹកឈូ (ស្ទឹងកំប៉ាយ)នេះ បែកចេញជាពីរគឺ ព្រែកទឹកឈូ និង ព្រែកជ្រោះរាន ហើយព្រែកទាំងនេះមានអូរតូចៗ ដែលជាសាខារបស់វាជា ច្រើនទៀត (មើលផែនទីទី១ & ៤) ។

៥.២.១.៨ លក្ខណៈចលនាស្រូវរបស់ស្ទឹងកំប៉ាយ



តាមតារាងទី ១៣ (ក) និងក្រាហ្វិក ២ ខាងក្រោមបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាធារទឹកជាមធ្យមដែលច្រើនជាងគេប្រចាំ ខែក្នុងកំឡុងពេល ៣៤ឆ្នាំគឺ នៅ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៦ ដែលមាន ៣២៨,១ ម^៣/វិនាទី ហើយធារទឹកដែលតិចជាងគេគឺ នៅឆ្នាំ ១៩៦៤ មាន ០,៣ ម^៣/វិនាទី ។ ស្ទឹងកំប៉ាយមានឈ្មោះពីរផ្សេងទៀត គឺផ្នែកខាងលើហៅថា ព្រែកទឹកឈូ និងផ្នែកខាងក្រោម ហៅថា ព្រែក កំពុងបាយ ។ **សំគាល់:** ទិន្នន័យនេះយកត្រឹមឆ្នាំ ២០០១ ពីព្រោះគំរោងបានគណនា និងគ្រោងតាម ទិន្នន័យនេះ ។

តារាងទី ១៣ (ក) : បរិមាណធារទឹកជាមធ្យមក្នុងខែ ក្នុងរយៈពេល៣៤ឆ្នាំ (១៩៥៨-២០០១) គិតជា ម^៣/វិនាទី

Year	Jan	Fab	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	AVG Year
1958	4.4	2.3	1.1	18.2	48.0	47.0	131.1	155.3	152.0	112.3	19.4	6.1	58.1
1959	3.2	2.5	26.8	31.2	24.0	22.5	165.8	242.4	76.3	39.8	12.5	15.6	55.2
1961	5.0	1.4	2.7	11.0	50.6	127.3	167.4	320.9	95.1	71.0	22.7	11.5	73.9
1962	6.1	3.9	4.7	9.4	18.5	61.5	101.3	98.1	182.4	44.5	13.0	4.4	45.7
1963	2.9	2.1	8.6	23.7	8.1	57.5	69.4	156.1	109.9	50.9	32.3	7.9	44.1
1964	1.7	0.7	0.3	0.3	34.3	43.8	40.2	257.9	104.5	80.8	34.2	7.6	50.5
1965	4.2	4.4	3.2	48.3	46.9	188.8	161.9	87.2	125.4	62.3	55.3	13.1	66.8
1966	6.4	4.2	10.1	16.6	94.6	27.5	106.8	148.5	77.7	99.2	22.8	10.3	52.1
1967	7.9	4.6	2.9	23.7	43.7	106.5	179.3	289.7	83.5	82.5	12.4	4.9	70.1
1968	3.5	3.4	2.3	18.4	29.0	23.2	92.9	167.4	73.1	73.9	14.5	5.1	42.2
1969	6.3	4.0	4.1	3.2	14.7	28.5	57.1	85.9	253.3	23.6	54.5	7.1	45.2
1970	4.3	4.7	2.6	32.9	42.6	89.1	147.0	151.2	113.5	78.7	25.4	40.8	61.1
1971	7.9	4.7	5.7	11.0	9.6	42.3	118.5	75.3	62.6	161.8	32.4	6.8	44.9
1972	3.6	3.0	3.4	42.4	11.1	81.9	230.2	133.7	185.5	55.7	37.5	14.5	66.9
1973	4.7	3.0	5.3	28.7	37.8	66.7	175.8	158.4	65.5	64.1	100.3	12.0	60.2
1983	2.4	0.9	0.7	1.1	16.6	86.5	66.1	165.9	43.1	113.8	11.5	4.3	42.7
1984	3.1	3.4	2.0	7.4	11.4	107.3	82.0	186.8	68.5	52.0	10.7	4.3	44.9
1985	2.8	2.7	3.1	30.0	78.2	139.1	33.4	76.1	90.1	54.7	13.0	9.6	44.4

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	AVG Year
1986	3.8	5.2	5.5	6.7	157.4	59.2	81.2	328.1	186.0	57.1	25.0	7.2	76.9
1987	2.1	1.0	0.8	1.0	1.0	19.9	24.4	99.3	98.7	43.5	110.0	18.0	35.0
1988	4.0	4.7	3.7	18.5	46.8	67.9	76.0	77.0	62.5	42.7	8.4	4.2	34.7
1989	3.3	2.4	4.0	14.2	46.2	58.3	80.8	158.2	65.5	41.1	31.5	6.3	42.7
1990	3.7	2.7	4.2	6.7	16.0	92.9	43.8	146.4	96.4	62.2	19.3	5.6	41.7
1991	2.2	1.0	3.7	18.1	17.7	49.6	231.6	246.2	120.3	53.6	9.3	4.2	63.1
1992	3.1	2.3	2.5	3.2	7.4	31.7	58.0	290.4	44.1	62.3	39.0	5.6	45.8
1993	6.2	7.1	4.6	7.4	6.2	67.0	135.7	196.3	115.6	66.8	21.3	6.5	53.4
1994	4.0	3.0	29.4	13.8	29.4	64.7	162.8	220.8	167.4	28.2	8.1	10.4	61.8
1995	2.4	1.2	1.7	6.6	25.4	20.6	61.0	195.4	199.3	51.5	10.8	9.1	48.8
1996	5.9	4.1	2.1	11.6	31.1	22.3	132.5	106.0	116.5	65.0	59.4	18.7	47.9
1997	5.1	4.2	3.1	5.1	7.5	61.6	158.8	262.9	64.5	44.1	133.5	9.0	63.3
1998	3.6	2.5	1.8	3.0	27.3	48.7	56.7	90.7	94.5	58.7	14.4	4.7	33.9
1999	4.9	5.5	25.3	44.9	53.7	128.9	215.8	180.2	74.9	91.9	65.0	9.9	75.1
2000	3.2	1.3	3.1	26.1	54.1	90.2	145.0	234.9	111.7	112.9	35.5	14.7	69.4
2001	8.9	3.0	7.5	6.1	33.7	173.9	145.9	223.2	72.9	81.2	35.9	5.8	66.5
AVG	4.3	3.2	5.7	16.2	34.7	70.7	115.8	176.8	107.4	67.2	33.8	9.6	53.8
MAX	8.9	7.1	29.4	48.3	157.4	188.8	231.6	328.1	253.3	161.8	133.5	40.8	76.9
MIN	1.7	0.7	0.3	0.3	1.0	19.9	24.4	75.3	43.1	23.6	8.1	4.2	33.9

(ប្រភពទិន្នន័យបានពី SINOHYDRO Corporation Limited និង ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម)



តារាងទី ១៣ (ខ) : បរិមាណទឹកដែលបានគ្រប់គ្រង ក្នុងរយៈពេល២៤ ម៉ោង (ទែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩១)

បរិមាណទឹកដែលបានគ្រប់គ្រង Probable Maximum Flood for Hydrograph 24 hour (m³/s)

Date	Hour	Dam	Date	Hour	Dam
11-Jul-1991	12:00	44.7	12-Jul-1991	14:00	6150
11-Jul-1991	13:00	40.4	12-Jul-1991	15:00	7060
11-Jul-1991	14:00	36.8	12-Jul-1991	16:00	7940
11-Jul-1991	15:00	33.9	12-Jul-1991	17:00	8730
11-Jul-1991	16:00	31.4	12-Jul-1991	18:00	9400
11-Jul-1991	17:00	29.4	12-Jul-1991	19:00	9930
11-Jul-1991	18:00	27.8	12-Jul-1991	20:00	10300
11-Jul-1991	19:00	26.5	12-Jul-1991	21:00	10600
11-Jul-1991	20:00	25.4	12-Jul-1991	22:00	10700
11-Jul-1991	21:00	24.6	12-Jul-1991	23:00	10700
11-Jul-1991	22:00	23.9	13-Jul-1991	0:00	10400
11-Jul-1991	23:00	23.4	13-Jul-1991	1:00	10100
12-Jul-1991	0:00	22.9	13-Jul-1991	2:00	9650
12-Jul-1991	1:00	27.2	13-Jul-1991	3:00	9110
12-Jul-1991	2:00	52.9	13-Jul-1991	4:00	8460
12-Jul-1991	3:00	123	13-Jul-1991	5:00	7750
12-Jul-1991	4:00	255	13-Jul-1991	6:00	7000
12-Jul-1991	5:00	458	13-Jul-1991	7:00	6230
12-Jul-1991	6:00	737	13-Jul-1991	8:00	5500
12-Jul-1991	7:00	1110	13-Jul-1991	9:00	4790
12-Jul-1991	8:00	1570	13-Jul-1991	10:00	4130
12-Jul-1991	9:00	2150	13-Jul-1991	11:00	3530
12-Jul-1991	10:00	2810	13-Jul-1991	12:00	2990
12-Jul-1991	11:00	3560	AVG		4163.4
12-Jul-1991	12:00	4370	MAX		10700
12-Jul-1991	13:00	5240	MIN		22.9

យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណដោយក្រុមហ៊ុន គិតតាមប្រូហ្វេស៊ីលីតេ ធារទឹកអតិបរមាសំរាប់រយៈពេល ១:១០០០ឆ្នាំ គឺ ប្រមាណ ១០៧០០ ម^៣/ម៉ោង ធារទឹកនេះត្រូវបានយកទៅគណនា ទំហំទំនប់បង្ហូរដើម្បីដោះទឹកជំនន់ កុំឱ្យគំរាមកំហែងដល់ ទំនប់ និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ របស់វារីអគ្គិសនីកំបោម ។

តារាងទី ១៣ (គ) : ទិន្នន័យសំរាប់គណនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនី

Description	Unit	Dam 1	Dam 2
Dam site Perennial Average Flow	m ³ /s	56.10	56.10
Dam site PMF Flood Flow (recurrent 10 000 year)	m ³ /s	10700	4975
Plant Building Design Flood Standard and Flow (recurrent 1000 Year)	m ³ /s	8970	4510
Plant Building Checking Flood Standard and Flow	m ³ /s	6180	4975
Perennial Average Temperature	°C	27	27
Extreme High Temperature	°C	42	42
Extreme Low Temperature	°C	18	18
Perennial Average Temperature Related Humidity	%	80	80
Maximum Wind velocity	m/s	25	25
Perennial Average rainfall	mm	1910	1910
Perennial Average Evaporation Quantity	mm	1410	1410
Sediment Deposit pre Year	m ³ /year	3600	375
Basic Earthquake Fissure	Degree	6	6

៥.២.១.៩ ការវិភាគគុណភាពទឹកលើផ្ទៃ (Surface Water Quality Analysis)

ការវិភាគគុណភាពទឹកលើផ្ទៃនៅក្នុងតំបន់គម្រោង ត្រូវបានក្រុមសិក្សារបស់ SAWAC ជ្រើសរើសបីចំណុច គឺនៅខ្សែទឹក ខាងលើ ទឹកល្អិតចំណុច និងខ្សែទឹក ខាងក្រោមទឹកល្អិតចំណុច ។

ទីតាំងយកសំណាកទឹកមានបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:-

- ចំណុចទី ១ គឺនៅទីតាំងអាងទី១ ជាប់ទំនប់ទី១ ដែលមាន កូអ័រដោនេ X= 403599 និង Y= 1183262 ។
- ចំណុចទី ២ នៅមាត់អូរពីរជាប់ស្ពានដែក ដែលមានកូអ័រដោនេ X= 404409 និង Y= 1180859 ។
- ចំណុចទី ៣ នៅស្ថានីយ៍បូមទឹកនៅ(Intake)របស់រដ្ឋាករទឹកក្រុងកំពត ។

(សូមមើលផែនទី ៣ & ៥ : ទីតាំងយកសំណាកទឹក និងការសិក្សារាប់ព្រៃឈើឧបសម្ព័ន្ធ ៣) ។

សំណាកទឹកនៃខ្សែទឹកខាងលើត្រូវបានយក និងធ្វើការវិភាគក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាវាយតម្លៃបរិស្ថាន ខែកញ្ញា ២០០៦ នេះ និរៀនរាល់ ២ខែម្តង ឆ្នាំ២០១០ ហើយលទ្ធផលគុណភាពទឹកមានបង្ហាញជូនក្នុងតារាងលេខ ១៤ (ក) ។ ចំពោះគុណភាពទឹកនៅ ខ្សែទឹកខាងក្រោម គឺបានពិនិត្យន័យ ពិសោធន៍គុណភាពប្រភពទឹកពីរដ្ឋាករទឹកក្រុងកំពត ដែលមានបង្ហាញក្នុងតារាងលេខ ១៤ (គ) ។ លទ្ធផលពិសោធន៍គុណភាពទឹកច្បាប់ ដើមមានភ្ជាប់នៅឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

តារាងលេខ ១៤ (ក): លទ្ធផលការពិសោធន៍គុណភាពទឹកលើដី នៃសំណាកទី១

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ឯកតា	ស្តង់ដារគុណភាពទឹកក្នុងប្រភពទឹកសាធារណៈសំរាប់រក្សាជីវសាស្ត្រចម្រុះ MoE	ស្តង់ដារគុណភាពទឹកផឹក MIME	លេខសំណាក			
					៩-១០ កញ្ញា ២០០៦ (មុនការសាងសង់)	៤-៥ សីហា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៩-៣០ កញ្ញា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៥-១៦ ធ្នូ ២០១០ (កំពុងសាងសង់)
					4	4	4	4
					ក្នុងអាងទី២ខាងលើទំនប់ទី១	ក្នុងអាងទី២ខាងលើទំនប់ទី១	ក្នុងអាងទី២ខាងលើទំនប់ទី១	ក្នុងអាងទី២ខាងលើទំនប់ទី១
1	Manganese (Mn)	mg/l	<1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2	Iron (Fe)	mg/l	<1	0.3	0.1	0.12	0.11	0.11
3	Arsenic (As)	mg/l	<0.10			0	0	0
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	>2	-	7.01	6.8	6.65	6.8
5	BOD	mg/l	<30	-	0.75	0.13	0.35	1.2
6	COD	mg/l	<50	-	1.87	0.65	0.78	2.33
7	Total Phosphorus	mg/l	-	-	0.014	0.01	0.05	0.02
8	Total Nitrogen	mg/l	-	-	0.07	0.03	0.11	0.07
9	Fluoride	mg/l	-					
10	Total Coliform	MPN/100 ml	-	0	28	150	36	4300
11	Nitrite-N(NO ₂ -N)	mg/l	-			0.054	0.004	0.004
12	True Nitrate-N(T-N)	mg/l	-			2.746	3.396	4.096
13	Nitrate-N(NO ₃ -N)	mg/l	-			2.8	3.4	4.1
14	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<10			9.24	14.96	18.04
15	Nitrate (NO ₂)	mg/l	-			0.1782	0.0132	0.0132
16	TDS	mg/l	<1000	< 800	4.1	4.95	4.275	5.5
17	TSS	mg/l	<120		15			
18	pH	No Unit	6 – 9	6.5 – 8.5	5.6	4.8	5.1	5.1
19	Temperature (t°C)	°C	<45	-	26.7	26	26.9	27.2
20	Conductivity	µS/Cm	-	< 1500	8.3	9.9	8.55	11
21	Turbidity	NTU		< 5	1	12	7	5

- MoE : ក្រសួងបរិស្ថាន (ស្តង់ដារគុណភាពទឹកក្នុងប្រភពទឹក សាធារណៈ សំរាប់រក្សាជីវសាស្ត្រចម្រុះ ចំពោះ ទន្លេ និង អាងស្តុកទឹក)
- MIME : ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង ថាមពល

តារាងលេខ ១៤ (ខ): លំនួងលក្ខណៈពិសោធន៍គុណភាពទឹកលើដី នៃសំណាកទី២

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ឯកតា	ស្តង់ដារគុណភាពទឹក ក្នុងប្រភេទទឹក សាធារណៈ សំរាប់ រក្សាជីវសាស្ត្រចម្រុះ MoE	ស្តង់ដារគុណ ភាពទឹកជីក MIME	លេខសំណាក			
					៩-១០ កញ្ចប់ ២០០៦ (មុនការសាងសង់)	៤-៥ សីហា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៩-៣០ កញ្ចប់ ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៥-១៦ ធ្នូ ២០១០ (កំពុងសាងសង់)
					5	5	5	5
					ខាងក្រោមអតា ថាមពលទី១	ខាងក្រោមអតា ថាមពលទី១	ខាងក្រោមអតា ថាមពលទី១	ខាងក្រោមអតា ថាមពលទី១
1	Manganese (Mn)	mg/l	<1	0.1	0.1	0.1	0.11	0.2
2	Iron (Fe)	mg/l	<1	0.3	0.1	0.13	0.15	0.2
3	Arsenic (As)	mg/l	<0.10			0	0	0
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	>2	-	7.05	6.3	6.6	6.52
5	BOD	mg/l	<30	-	1.69	0.19	0.85	1.65
6	COD	mg/l	<50	-	2.85	0.94	1.77	2.52
7	Total Phosphorus	mg/l	-	-	0.016	0.03	0.07	0.04
8	Total Nitrogen	mg/l	-	-	0.084	0.09	0.19	0.15
9	Fluoride	mg/l	-					
10	Total Coliform	MPN/ 100 ml	-	0	157	200	920	920
11	Nitrite-N(NO ₂ -N)	mg/l	-			0.007	0.004	0.006
12	True Nitrate-N(T-N)	mg/l	-			12.493	3.196	3.794
13	Nitrate-N(NO ₃ -N)	mg/l	-			12.5	3.2	3.8
14	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<10			55	14.08	16.72
15	Nitrate (NO ₂)	mg/l	-			0.0231	0.0132	0.0198
16	TDS	mg/l	<1000	< 800	4	18	19.1	14.5
17	TSS	mg/l	<120		27.18			
18	pH	No Unit	6 – 9	6.5 – 8.5	5.3	7.1	8.1	7.5
19	Temperature (°C)	°C	<45	-	26.7	28	28.3	29
20	Conductivity	μS/Cm	-	< 1500	8.2	36	38.2	26.8
21	Turbidity	NTU		< 5	2	3	7	26

តារាងលេខ ១៤ (គ): លទ្ធផលការពិសោធន៍គុណភាពទឹកលើដី នៃសំណាកទី៣ របស់រដ្ឋាករទឹកកំពត

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ឯកតា	ស្តង់ដារគុណភាពទឹក ក្នុងប្រភពទឹក សាធារណៈ សំរាប់ រក្សាជីវិតសត្វចម្រុះ MoE	ស្តង់ដារគុណ ភាពទឹកផឹក MIME	លទ្ធផលវិភាគ ២០០១-២០០៤				លទ្ធផលវិភាគ ២០១០		
					មុនសាងសង់				កំពុងសាងសង់		
					Oct-01	Mar-02	Nov-03	Jul-04	6-Aug-10	30-Sep-10	30-Nov-10
1	pH		6 – 9	6.5 – 8.5	5.5	6.9	6.79	5.9	8.1	8	8.2
2	ភាពល្អក់	NTU	-	< 5	1.7	-	2.3	5.5	97	17.7	28
3	ដែក (Fe)	mg/l	<1	0.3	-	-	0.24	1.19			
4	ក្លរ (Cl)	mg/l			0	10	-	-			
5	ភាពរឹងសរុប	mg/l			-	63	25	0			
6	អង្គធាតុរឹងរលាយ ក្នុងទឹកសរុប (TDS)	mg/l	<1000	< 800		15	4	-	27	19	9
7	ម៉ង់កាណែស (Mn)	mg/l	<1	0.1	0	-	-	-			
8	ភាពចម្បងអគ្គិសនី	μs/cm	-	< 1500	-	33	8	9.8	53.6	37.8	17.6
9	នីត្រាត (NO ₃)	mg/l	<10		-	-	0.9	-			
10	អាម៉ូញាក់ (NH ₃ -N)	mg/l			-	-	0	-			
11	អាសេនិច (As)	mg/l	<0.10		0	-	-	-			
12	Total coliform	MPN/100ml	-	0	0	-	-	1			
13	Coli-faecal	MPN/100ml			0	-	-	0			
	Temperature (t°c)	°C	<45						27.6	27.3	26.3

ប្រភពទិន្នន័យ: រដ្ឋាករទឹកក្រុងកំពត

៥.២.១.១០ ការវិភាគគុណភាពទឹកក្រោមដី (Ground Water Quality Analysis)

ដូចគ្នានឹង ការវិភាគគុណភាពទឹកលើដីដែរនៅក្នុងតំបន់គំរោង ត្រូវបានក្រុមសិក្សារបស់ SAWAC ជ្រើសរើសបីចំណុច គឺនៅខាងក្រោមអាងទី១ ទឹកល្អិតចំណុច និងខ្សែទឹក ខាងក្រោមទឹកល្អិតចំណុច ។

ទីតាំងយកសំណាកទឹកមានបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:-

- ចំណុចទី ១ គឺនៅទីតាំងអាងទី១ ជាប់ទំនប់ទី១ ដែលមាន កូអរដោនេ X= 403572 និង Y= 1183234 ។
- ចំណុចទី ២ នៅមាត់អូរពីរជាប់ស្ពានដែក ដែលមានកូអរដោនេ X= 404532 និង Y= 1180839 ។
- ចំណុចទី ៣ នៅស្ថានីយ៍បូមទឹកនៅ(Intake) របស់រដ្ឋាករទឹកក្រុងកំពត ។

(សូមមើលផែនទីទី១១ & ៤) : ទីតាំងយកសំណាកទឹក និងការសិក្សារបៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តាញទឹក ៣) ។

តារាងលេខ ១៥ (ក): លទ្ធផលការពិសោធន៍គុណភាពទឹកក្រោមដី នៃសំណាកទី១

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ឯកតា	ស្តង់ដារគុណភាពទឹក ក្នុងប្រភពទឹក សាធារណៈ សំរាប់ រក្សា ជីវសាស្ត្រចម្រុះ MoE	លេខសំណាក		
				៤-៥ សីហា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៩-៣០ កញ្ញា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	១៥-១៦ ធ្នូ ២០១០ (កំពុងសាងសង់)
				1	1	1
				អណ្តូងក្នុងផ្ទះបាយ	អណ្តូងក្នុងផ្ទះបាយ	អណ្តូងក្នុងផ្ទះបាយ
1	Manganese (Mn)	mg/l	<1	0.3	0.4	0.3
2	Iron (Fe)	mg/l	<1	0.66	1.54	1.64
3	Arsenic (As)	mg/l	<0.10	0	0	0
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	>2			
5	BOD	mg/l	<30			
6	COD	mg/l	<50			
7	Total Phosphorus	mg/l	-	0.01	0.03	0.02
8	Total Nitrogen	mg/l	-	0.05	0.1	0.1
9	Fluoride	mg/l	-	0.32	0.2	0.12
10	Total Coliform	MPN/ 100 ml	-	<30	4300	1100
11	Nitrite-N(NO ₂ -N)	mg/l	-	0.003	0.001	0.001
12	True Nitrate-N(T-N)	mg/l	-	3.197	3.399	3.3399
13	Nitrate-N(NO ₃ -N)	mg/l	-	3.2	3.4	3.4
14	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<10	14.08	14.96	14.96
15	Nitrate (NO ₂)	mg/l	-	0.0099	0.0033	0.0033
16	TDS	mg/l	<1000	130	61.85	9.5
17	TSS	mg/l	<120			
18	pH	No Unit	6 – 9	6.9	6.2	6.8
19	Temperature (t°C)	°C	<45	27	27.3	27
20	Conductivity	μS/Cm	-	260	123.7	233
21	Turbidity	NTU	-	6	1	19

តារាងលេខ ១៥ (ខ): លទ្ធផលការពិសោធន៍គុណភាពទឹកក្រោមដី នៃសំណាកទី២

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ឯកតា	ស្តង់ដារគុណភាពទឹក ក្នុងប្រភពទឹក សាធារណៈ សំរាប់ រក្សា ជីវសាស្ត្រចម្រុះ MoE	លេខសំណាក		
				៤-៥ សីហា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៩-៣០ កញ្ញា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	១៥-១៦ ធ្នូ ២០១០ (កំពុងសាងសង់)
				2	2	2
				អណ្តូងក្នុងការដ្ឋាន	អណ្តូងក្នុងការដ្ឋាន	អណ្តូងក្នុងការដ្ឋាន
1	Manganese (Mn)	mg/l	<1	0.3	0.5	0.3
2	Iron (Fe)	mg/l	<1	0.05	0.05	0.07
3	Arsenic (As)	mg/l	<0.10	0	0	0
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	>2			
5	BOD	mg/l	<30			
6	COD	mg/l	<50			
7	Total Phosphorus	mg/l	-	0.02	0.08	0.01
8	Total Nitrogen	mg/l	-	0.08	0.2	0.06
9	Fluoride	mg/l	-	0.34	0.27	0.24
10	Total Coliform	MPN/ 100 ml	-	<30	2300	1600
11	Nitrite-N(NO ₂ -N)	mg/l	-	0.006	0.006	0.009
12	True Nitrate-N(T-N)	mg/l	-	4.294	4.494	1.991
13	Nitrate-N(NO ₃ -N)	mg/l	-	4.3	4.5	2
14	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<10	18.92	19.8	8.8
15	Nitrate (NO ₂)	mg/l	-	0.0198	0.0198	0.0297
16	TDS	mg/l	<1000	175	88	171.5
17	TSS	mg/l	<120			
18	pH	No Unit	6 – 9	6.9	6.7	6.8
19	Temperature (t°C)	°C	<45	29.5	27.3	27.1
20	Conductivity	μS/Cm	-	350	176	343
21	Turbidity	NTU	-	1	0	0

តារាងលេខ ១៥ (គ): លទ្ធផលការពិសោធន៍គុណភាពទឹកក្រោមដី នៃសំណាកទី៣

ល.រ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ	ឯកតា	ស្តង់ដារគុណភាពទឹកក្នុងប្រភពទឹកសាធារណៈ សំរាប់រក្សា ជីវសាស្ត្រចម្រុះ MoE	លេខសំណាក		
				៤-៥ សីហា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	២៩-៣០ កញ្ញា ២០១០ (កំពុងសាងសង់)	១៥-១៦ ធ្នូ ២០១០ (កំពុងសាងសង់)
				3	3	3
				អណ្តូងក្នុងការិយាល័យ sinohydro	អណ្តូងក្នុងការិយាល័យ sinohydro	អណ្តូងក្នុងការិយាល័យ sinohydro
1	Manganese (Mn)	mg/l	<1	0.1	0.7	2
2	Iron (Fe)	mg/l	<1	0.11	1.22	0.08
3	Arsenic (As)	mg/l	<0.10	0	0	0
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	>2			
5	BOD	mg/l	<30			
6	COD	mg/l	<50			
7	Total Phosphorus	mg/l	-	0.08	0.09	0.05
8	Total Nitrogen	mg/l	-	0.22	0.22	0.18
9	Fluoride	mg/l	-	0.35	0.25	0.22
10	Total Coliform	MPN/ 100 ml	-	30	920	2700
11	Nitrite-N(NO ₂ -N)	mg/l	-	0.004	0.008	0.006
12	True Nitrate-N(T-N)	mg/l	-	5.296	5.392	6.494
13	Nitrate-N(NO ₃ -N)	mg/l	-	5.3	5.4	6.5
14	Nitrate (NO ₃)	mg/l	<10	23.32	23.76	28.6
15	Nitrate (NO ₂)	mg/l	-	0.0132	0.0264	0.0198
16	TDS	mg/l	<1000	358	335	349.5
17	TSS	mg/l	<120			
18	pH	No Unit	6 – 9	7.8	6.3	7.6
19	Temperature (t°C)	°C	<45	27.5	28.8	28.3
20	Conductivity	μS/Cm	-	716	670	699
21	Turbidity	NTU	-	0	13	0

យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគទឹកខាងលើបានបង្ហាញថា មានពីរប៉ារ៉ាម៉ែត្រគឺ Total Coliform, Fe, និង pH ដែលលើសពីតម្លៃស្តង់ដារសំរាប់ទឹកផឹករបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និងថាមពល (MIME) (មើលតារាងលេខ ៤) ។ ក៏ប៉ុន្តែ មានតែ NO₃ ដែលលើសពីតម្លៃស្តង់ដារសំរាប់គុណភាពទឹកក្នុងប្រភពទឹកសាធារណៈសំរាប់រក្សាជីវសាស្ត្រចម្រុះរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទេ ។ នៅពេលយកសំណាកមកពិសោធន៍ គឺទឹកព្រែកមានលំហូរជាខ្លាំង ព្រោះជារដូវវស្សា (ថ្ងៃទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៦) ។

Total Coliform គឺទឹកដែលកខ្វក់អាចមានចំនួនច្រើននូវពពួកមេរោគផ្សេងៗទៀត ។ ពពួកមេរោគទាំងនោះមានដូចជា បាក់តេរី, ពងព្រូន, វិរុស ឬ protozoa យើងព្យាយាមរកប្រភេទមេរោគទាំងនោះ ដែលអាចមាននៅក្នុងទឹកបច្ចុប្បន្នហើយដែលចំណាយពេល និងថវិកាដ៏ច្រើន ។ វាអាចធ្វើការវិភាគនៃអតិសុខុមជីវសាស្ត្រទឹកដោយអស់តម្លៃថោក របស់ហើយនិងងាយស្រួលទៀតផង ។ នេះគឺមូលហេតុថា ហេតុអ្វីបានជាធម្មតា គេធ្វើការវិភាគរកឱ្យឃើញពិតប្រាកដនូវ "សន្ទស្សន៍បាក់តេរី" (indicator bacteria) ។ សន្ទស្សន៍បាក់តេរីនេះជាបាក់តេរីដែលគេជានិច្ចកាលរកឃើញនៅក្នុងលាមកមនុស្សទោះបីមនុស្សនោះជា ឬក៏ឈឺក៏ដោយ ។ គេអាចនិយាយថា បើគេរកឃើញបាក់តេរីនេះមាននៅក្នុងទឹក គេសន្មតថា ទឹកនេះបំពុលដោយលាមកមនុស្ស ។ បាក់តេរីកូលីហ្វមពិលាមកនេះ កើតមានឡើងជាធម្មជាតិនៅពោះវៀនមនុស្ស ដោយវាធ្វើការជំនួយដល់ការរំលាយអាហារ ។ ពួកគេក៏ឃើញមានផងដែរនៅក្នុងលាមកពពួកសត្វ ដែលមានលាយក្តៅ ។ Faecal Coliform បាក់តេរីដោយខ្លួនឯងមិនធ្វើឱ្យមានជំងឺទេ ។ លាមកនៃមនុស្សខ្លះអាចមានផងដែរ នូវមេរោគផ្សេងៗ នៅពេលគេមានជំងឺ ។ ដូច្នេះបើគេដឹងពិត

ប្រាកដនៅក្នុងទឹកនោះបំពុលដោយលាមកមនុស្សនោះ ទឹកនេះក៏បំពុលផងដែរដោយសារមេរោគផ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងលាមកមនុស្ស ។

ឥទ្ធិពលដល់សុខភាព : ដោយសារតែរកឃើញមាន Faecal Coliform ដែលបង្ហាញឱ្យដឹងនូវមេរោគជាច្រើនប្រភេទដូចជា វីរុស, បាក់តេរី ដង្កូវប៉ារ៉ាស៊ីត... ដែលរស់នៅ ក្នុងទឹកជានិច្ចកាលនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគទាំងនោះ (បង្កជាជំងឺ) ដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងតាមប្រភពទឹកពីសត្វមកមនុស្ស ពីមនុស្សទៅសត្វ ហើយដែលអាចមានសភាពធ្ងន់ទាមទារឱ្យមានសកម្មភាពទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ ។ ស្តង់ដារគុណភាពទឹកសំរាប់ ផឹករបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល បានបញ្ជាក់ថា Total Coliform ត្រូវមានកំរិតសូន្យ ។

pH ជាទូទៅរូបមន្តគីមីរបស់ទឹកគឺ: $H_2O \rightarrow HOH \rightarrow H^+ + OH^-$

ដូច្នេះម៉ូលេគុលទឹក គឺជាសារធាតុគីមីដែលមានស្ថេរភាព ហើយវាអាចបំបែកជាផ្នែកអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែន H^+ និង អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រុស៊ីត ទៀត OH^- ។ pH គឺជាតំណាងឱ្យអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែន ដែលមាននៅក្នុងទឹក pH មានលំដាប់ពី 0 ទៅដល់ ១៤ ហើយគេនិយាយថា វាណិតដែល pH = 7 គឺនៅសីតុណ្ហភាព ២៥°C ។

គេអាចកំណត់ថា តើទឹកវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីត (ដូរ) វិជាបានដោយសារទំនាក់ទំនងនៃកំហាប់ H^+ ។ បើ $pH > 7$ នោះគឺតែងតែជា ជាបាសហើយបើ $pH < 7$ នោះគឺទឹកមានលក្ខណៈជាអាស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍៖ យើងជួបវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ

- ទឹកសារធាតុជាបាសដូចជា: ថ្នាំធ្វើឱ្យស (pH = 12) អាម៉ូនីញ៉ាក់ (pH = 11) សូដា pH = 8,5 ទឹកសមុទ្រ (pH = 8)
- ទឹកសារធាតុអាស៊ីតដូចជា: ទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់ (pH = 5,5) កូកាកូឡា (pH = 2.5) ទឹកខ្មេះ (pH = 3) ទឹកក្រូចឆ្មារ (pH = 2) អាស៊ីត (pH = 1) ។

អាល់កាឡាំង (វិក័សមត្ថភាពបន្ទុកនៃអាស៊ីត) សំដៅលើភាពធ្ងន់នៃទឹកក្នុងការបំប្លែងបំប្លែង pH ដោយសារវាអាចបន្ទាបអាស៊ីតបាន ។ ការកើតឡើងនូវភាពរឹង(អាល់កាឡាំង) នៅក្នុងទឹកនោះវានឹងបង្កើនភាពបន្ទាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងទឹកផងដែរ ។

pH នៃទឹកវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេ ។ ពេលដែលនៅក្នុងទឹកមានអាស៊ីតខ្លាំង ($pH \leq 3$) ឬក៏បាសខ្លាំង ($pH \geq 10$) នោះវាជាលក្ខណៈធម្មតាសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពឧស្សាហកម្ម និងការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សយើង ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកទឹកនេះធ្វើការអង្កេតតាមដានផង ។

អ្នកអាចវាស់ pH បានដោយឧបករណ៍កំប៉ាអ៊ីម៉ែរ (Comparator) ឬក្រដាស ទូនណីស៊ីលដែលប្រៀបធៀបទៅ និងបទដ្ឋានកំណត់របស់វានិមួយៗ និង ប្រដាប់វាស់ pH ជា Digital ហើយអាចកំណត់រកកំរិតនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះបានយ៉ាងច្បាស់ ។

ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់៖

- ភាគច្រើននៃទឹកធម្មជាតិមាន $pH = 6 - 9$
- ភាគច្រើននៃទឹកលើដី, ធម្មជាតិអាស៊ីតមាន $pH = 5 - 8$
- ទឹកល្អក់ខ្លាំង (ទឹកកក់) ជាធម្មតាអាស៊ីតមាន $pH = 4 - 5$
- ទឹកក្នុងតំបន់ខ្សាច់ភាគច្រើនជាទឹកមានអាស៊ីត,
- ទឹកដែលស្ថិតនៅលើដីឥដ្ឋ និងទឹកក្នុងផ្នែកត្រពាំងជាបាស
- ជាទូទៅទឹក បង្ហូរចេញពីផ្ទះគឺបាស
- កាកសំណល់រាវដែលបង្ហូរចេញពីឧស្សាហកម្ម គឺអាស៊ីត ឬក៏បាស

pH នៃទឹកលើផ្ទៃដីផ្លាស់ប្តូរទៅតាមកាលវេលា និងតាមរដូវកាល គឺដោយសារពួកវារីជាតិ និងរុក្ខជាតិដែលដុះនៅក្នុងទឹក ។ ក្នុងពេលយប់ទឹកមានជាតិអាស៊ីតស្រាល ដែលដល់ពេលថ្ងៃវានឹងបង្កើនតម្លៃនៃ pH ទៀត ដូច្នេះ វារីធ្វើឱ្យមានជាតិអាស៊ីតស្រាលឡើងជាងមុន ។

ផលវិបាក

អាស៊ីត: ទឹកដែលមាន លក្ខណៈជាអាស៊ីតវាបង្កើនល្បឿននៃច្រែស (ការស៊ីផ្តាច់) ទៅលើលោហៈធាតុដូចជាទុរយោទិក ធ្វើអំពីដែកជាដើម ។



រសជាតិ: កំណត់ផងដែរនូវរសជាតិរបស់ទឹក ក្នុងករណីនេះបើ នោះទឹកមានរសជាតិជួរពីអាស៊ីត ។

គោលការណ៍ណែនាំនៃកម្រិតអតិបរមាត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឱ្យ:

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំនៃតម្លៃ $pH = 6.5 - 8.5$ សំរាប់ទឹកបរិភោគឱ្យបានសមរម្យ

Fe ដែលមាននៅក្នុង [redacted] នេះលើសពីស្តង់ដារក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ដែលអាចបណ្តាលមកពីការសំយោគ វារីជាតិ រុក្ខជាតិទឹក ជុំវិញ និងរ៉ែនៅក្នុងតំបន់ដែលទឹកបានហូរនាំយកមក ។

Fe នៅក្នុងទឹកសំដែងឡើងជា $mg/l (Fe)$ ម្យ៉ាងវិញទៀតដែកគ្មានផ្តល់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សុខភាពទេ តែមានបញ្ហាខ្លះដែលកើតឡើងដោយសារក្នុងទឹកមានកំហាប់របស់វាដែរ ។ បញ្ហានេះគឺរសជាតិទឹក ធ្វើឱ្យសំលៀកបំពាក់ប្រឡាក់ពណ៌ក្រហម ពេលដែលយើងបោសសំអាតវា និងធ្វើឱ្យស្ទះនៃប្រព័ន្ធទុយោចែកចាយទឹក ។ ដែកវាមិនរលាយក្នុងទឹកទេតែវាប៉ះ ជាមួយ និងអុកស៊ីសែន (O_2) ក្នុងខ្យល់វាក្លាយជាសំណក (បង្កជាកំណករឹងតូចៗ) នៅក្នុងទឹកដោយយោងតាមសមីការ ដូចតទៅ :



ផលវិបាក :

រសជាតិ : អ៊ុយ៉ុងដែក Fe^{2+} និង Fe^{3+} ដែលរលាយនៅក្នុងទឹកធ្វើឱ្យទឹកមានរសជាតិមិនល្អ នាំមនុស្សមិនចូលចិត្តផឹកទឹកនោះ ។

ប្រឡាក់សំលៀកបំពាក់ : ពេលដែលសំលៀកបំពាក់ ត្រូវបោកសំអាត និងទឹកដែលមានអ៊ុយ៉ុងដែករលាយក្នុងនោះធ្វើឱ្យខោអាវ ឡើងពណ៌ត្នោតស្រាល ឬក៏ពណ៌ច្រេះដែក ។

ការធ្វើឱ្យស្ទះ : សំណាញ់ប៊ីតសំរាប់ស្នប់ដែររបស់អណ្តូងទឹកអាចស្ទះដោយសារតែច្រេះ និងបាក់តើវិដែកដែល មាននៅក្នុងទឹក ហើយ កំណច្រេះដែកនេះធ្វើឱ្យស្ទះបណ្តាញទុយោចែកចាយទឹកទៀតផង ។

បើ Fe មានលើសពី $5 mg/l$ ធ្វើឱ្យទឹកមានពណ៌ និងមានភាពល្អក់ ។

ស្តង់ដារ : ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង ថាមពល បានណែនាំសំរាប់ទឹកផឹក កំហាប់ដែកមានច្រើនបំផុតត្រឹម 0.៣

ម.ក្រ/លីត្រ ពីព្រោះគេពិនិត្យពីថ្លៃលើសោភ័ណភាពទឹក ។ មានប្រទេសខ្លះដូចជា រុស្ស៊ីអាចឱ្យកំហាប់នេះខ្ពស់ពី 0.៣ - 0.៥ ម.ក្រ/លីត្រ ។

NO₃ :នីត្រាត (NO₃) មានប្រភពសំខាន់ពីអាស៊ីតនៅក្នុងទឹក គឺដោយសារការស្លាប់នៃរុក្ខជាតិ ឬសត្វ។ ប្រភពផ្សេងទៀតនៃ អាស៊ីត (N) មកពី ជីគីមី, លាមកសត្វ និងមនុស្ស ។ គេតែងតែឃើញមានអាស៊ីតក្នុងទឹកធម្មជាតិខ្លះមានកំហាប់ខ្ពស់ ដែលជាផល អាក្រក់ដល់សុខភាព។ នៅពេលដែលមានកំហាប់ NO₃ ខ្ពស់គឺមានន័យថាគុណភាពទឹកគឺខ្វះពីអតិសុខុម ជីវសាស្ត្រ។ ពេលដែលត្រួតពិនិត្យប្រភពទឹករយៈពេលយូរ គេសង្កេតឃើញកំរិត NO₃ មានការកើនឡើងនោះ បានន័យ ថាទឹកនោះចាប់ផ្តើមបំពុលដោយកត្តាណាមួយ ឬកត្តាផ្សេងទៀត រួចយើងធ្វើការបកស្រាយមកពីប្រភពនៃការបំពុល វាហូរចូលតែម្តង។ នីត្រាតអាចប្រើ ដោយរុក្ខជាតិម្តងទៀតដើម្បីការលូតលាស់របស់វា (ជីធម្មជាតិ) ដោយសារតែ ការធ្វើអុកស៊ីតកម្មយ៉ាងរហ័សនៃ NO₂ ទៅជា NO₃ នេះហើយដែលគេរកឃើញនីត្រាតមានកំរិតទាបជាងនីត្រាត។ សារធាតុនៃកំហាប់អាស៊ីតអាចសំដែងឡើងជាផ្លូវខុសៗគ្នា។ ចំពោះការរលាយ នៃនីត្រាត អាចសំដែង ឡើងក្នុង mg/l នៃ NO₃ - N ឬក្នុង mg/l នៃ NO₃ ។ ជាដំបូងត្រូវគិតពី NO₃ - N ទី ២ ក៏រាប់ បញ្ចូលផងដែរនៃការផ្សំ O₂ ។ ដូចគ្នានេះ ដែរ ដើម្បីយកជាបានការ សំរាប់ឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ (NH₃), អាម៉ូញូម (NH₄), និងនីត្រាត (NO₂) ។ ជាទូទៅការធ្វើតេស្ត ក្នុងទឹកផិតចំពោះ នីត្រាត និងនីត្រីត។ នីត្រីតអ៊ីយ៉ុងអាចបន្តនៅក្នុងទឹក ដោយសារ ការភ្ជាប់អុកស៊ីតកម្មនៃអាម៉ូញូម ឬក៏ការធ្វើរដកកម្មនៃ អ៊ីយ៉ុងនីត្រាត។ ដោយហេតុថាអ៊ីយ៉ុងនីត្រីតអាចធ្វើឱ្យ មានជំងឺ ជាពិសេសលើកូនក្រមុំ។ ដូច្នេះ អ៊ីយ៉ុងនីត្រីតមាន នៅក្នុងទឹកត្រូវរក្សាកំរិតទាបជាទីតិចតួចនៅក្រោម 0.1mg/l ។ នីត្រាតអ៊ីយ៉ុងដូចជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ (ពុល) ទេ។ ម្យ៉ាងទៀតវាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីកត្តាទី២ ដែលមានឥទ្ធិពល ទៅលើទឹក ដូចជាជី និងអុកស៊ីតកម្មនៃទឹកសំអុយ។ កំហាប់អតិបរមានៃនីត្រាតអ៊ីយ៉ុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនៅក្នុង ទឹកផិត។ មានការសិទ្ធិដ្ឋានទូលំទូលាយណាស់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ។ ជាទូទៅកំរិតអតិបរមារបស់វា គឺ ៤៥ mg/l គេអាចគណនានៃកំហាប់ដូចជា អ៊ីយ៉ុង NO₃ បានរួចពិនិត្យមើលកំរិតគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់វា។ នីត្រាត ត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងខ្លួនរបស់យើង ហើយក្លាយទៅជានីត្រីតដល់យូរទៅបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ មហារីក។ នីត្រាតគឺជា លទ្ធផលចុងក្រោយនៃអុកស៊ីតកម្មរបស់សារធាតុសរីរាង្គ ហើយបន្ទាប់មកវាអាចផ្តុំជាមួយនឹង សរីរាង្គពុលផ្សេងទៀត ផង។ ឧទាហរណ៍ ប្រព័ន្ធអនាម័យ ដែលស្ថិតនៅជិតប្រភពទឹកអាចឱ្យគេឃើញមានកំរិត នីត្រាតខ្ពស់។ ការកើនឡើងនៃ កំរិតនីត្រាតនៅក្នុងទឹកក្រោមដី គឺជាសញ្ញាមួយស្តីពីការកំពុងតែបំពុលនៃប្រភពទឹក។ ការដាំទឹកឱ្យពុះវានឹងសំលាប់មេ រោគ ដែលមាននៅក្នុងទឹក ប៉ុន្តែបរិមាណនីត្រាតនៅក្នុងទឹកនេះនឹងកើត ឡើង។ ការធ្វើតេស្តអាម៉ូញាក់បានតែលើទឹក ណាដែលបំពុលខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដូចជា ទឹកស្អុយជាដើម។

នៅក្នុងទឹកលើដី ឬទឹកលើដីក្បែរទឹកក្រោមដី បានបញ្ជាក់ឱ្យឃើញច្បាស់ពីការផ្សំឡើងនៃអ៊ីយ៉ុង អាម៉ូញូម ពីរ ឬបីភាគ ១០ម.ក្រ /លីត្រ ច្រើនជាងនូវសន្ទស្សន៍នៃការបំពុលទឹកដោយគីមី ឬលាមកសត្វ ឬមនុស្ស។ ម្យ៉ាងទៀតមាន ទឹកក្រោម យ៉ាងជ្រៅផងដែរផ្សំពី ហ្សេណូហ្សេនិក អាម៉ូញូម (អាម៉ូញូម ដែលកកើតជា ស្រទាប់ដោយសារបាតុភូតភូមិសាស្ត្រ ដូចជាការ ប្រើជី, លាមកសត្វ យូរទៅវាកកនៅក្រោមដី...។ ល។ ឬក៏កើតពី បាតុភូតភូមិសាស្ត្រជាយូរយារមកហើយ)។ ពេលនេះ បើគេធ្វើការវិភាគសរុបទឹកនេះមិនឃើញមានការបំពុលពី សកម្មភាពមនុស្ស ឬសត្វទេ។ ដូច្នេះ ការបកស្រាយនៃទិន្នន័យត្រូវគិត ពីប្រភពដើមនៃទឹកផងដែរ។

ផលវិបាក

គ្រោះថ្នាក់ដល់ទារក និងមនុស្សចាស់ : នីត្រាត (NO₃) ក្នុងកំហាប់ខ្ពស់អាចឱ្យមានជំងឺខ្លាំងដល់ទារក (តិចជាង១ឆ្នាំ) និងមនុស្សចាស់ក្នុងនោះដែរអាចធ្វើឱ្យពួកគេស្លាប់ក៏មាន។ កុមារដែលមានអាយុច្រើនជាង១២ខែ និងមនុស្សពេញវ័យគ្មាន ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេទោះបីជាកំហាប់ NO₃ ខ្ពស់ក៏ដោយ។

គោលការណ៍ណែនាំនៃអភិរក្សបរិស្ថានដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យ៖

អង្គការ WHO មិនបានធ្វើការណែនាំពីតំលៃឧស្ម័នអាម៉ូញាក់ អាម៉ូញូម នីត្រាត និងនីទ្រីត ដោយសារតែវាគ្មាន ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ។

ដូច្នេះគុណភាពទឹករបស់ព្រែកទឹកឈូនៅក្នុងតំបន់គំរោងមានការបំពុលតិចតួចណាស់ដោយសកម្មភាពមនុស្សក្នុងតំបន់ (មើលផែនទីលេខ ៣ ទីតាំងយកសំណាកទឹក និងលិខិតផលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ៣) ប៉ុន្តែចំពោះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលលើសស្តង់ដារទាំងពីរ នេះ គឺវាកើតឡើងពីធម្មជាតិក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះ ។

សន្និដ្ឋានលើគុណភាពទឹកក្នុងតំបន់គំរោងវារីអគ្គិសនីកំបោលមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគំរោង :

ក. គុណភាពទឹកលើដី

គុណភាពទឹកលើដីនៅព្រែកទឹកឈូផ្នែកខាងលើពុំមានឃើញមានបញ្ហាធំដុំអ្វីទេ ក្រៅពីសកម្មភាពធម្មជាតិ (ភ្លៀងខ្លាំង នាំឱ្យហូរច្រោះ ឬបាក់ដី និងការនាំយកកំណាត់ឈើ ស្លឹកឈើ ចូលទឹកស្ទឹង) ។

ផ្អែកលើការសង្កេតមើលឃើញដោយភ្នែក ការយកពិន្ទុមានពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន និង រដ្ឋាករទឹកកំពត ឃើញថា គុណភាពទឹកព្រែកទឹកឈូផ្នែកខាងក្រោម និង ព្រែកកំពង់បាយទាំងមូលមានការបំពុលមួយចំនួនតូចតូចទៅហើយពីសកម្មភាព មនុស្ស និងធម្មជាតិ ។

ការបំពុលពីសកម្មភាពមនុស្សមាន៖

- ការកាប់ព្រៃនៅក្នុងតំបន់ប្រមូលទឹកភ្លៀង (បង្កឱ្យមានការហូរច្រោះដី និង កំទេចកំទីរុក្ខជាតិ)
- ការប្រើប្រាស់ដី និង ថ្នាំពុលកសិកម្ម លើដី ដំណាំ នានាសងខាងស្ទឹង (សំណល់ដី និង ថ្នាំពុលទាំងនោះ អាចជ្រាប ឬ ហូរចូលក្នុងស្ទឹង)
- ការចុះរូតទឹកលេងកំសាន្ត និងការបោកគក់ លាងដុស
- ការចោលកាកសំណល់នានាពីអ្នកលក់ដូរ និងអ្នកទៅកំសាន្ត
- ការបង្ហូរទឹកខ្វក់ពីក្រុងកំពតចូលទៅដោយគ្មានការសម្អាតអ្វីទាំងអស់

ការបំពុលពីសកម្មភាពធម្មជាតិមាន៖

- ការហូរច្រោះ រីបាក់ដី និងការនាំយកកំណាត់ឈើ ស្លឹកឈើ កំទេចកំទីពុករលួយ ដោយភ្លៀងព្យុះ
- ការជោរ នាយនៃទឹកសមុទ្រ (ទឹកប្រៃចូល) មកដល់ស្ថានីយ៍បូមរបស់រដ្ឋាករទឹកកំពត

ខ. គុណភាពទឹកក្រោមដី

គុណភាពទឹកក្រោមដីនៅតំបន់ព្រែកទឹកឈូពុំមានឃើញមានបញ្ហាធំដុំអ្វីទេ ក្រៅពីសកម្មភាពធម្មជាតិ ។ ផ្អែកលើការធ្វើ តេស្តគុណភាពទឹកក្រោមដីនៅទីតាំងគំរោង និងក្បែរការដ្ឋានបានឱ្យដឹងថា ទឹកពុំទាន់មានការបំពុលណាមួយពីសកម្មភាពគំរោង ឡើយ ។ ប៉ុន្តែ វាមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយដែលមានការប្រែប្រួលគឺ នីត្រាត (NO_3) ដែលវាមានការប្រែប្រួល និងកើនឡើងទៅ តាមខែបន្តបន្ទាប់ (ដូចមានក្នុងតារាង ៥ ក ខ គ ខាងលើ) ។ កត្តាដែលមានការប្រែប្រួលនេះគឺមកពីបរិមាណទឹកក្រោមដី នៅរដូវវស្សាទឹកក្រោមដីមានបរិមាណច្រើនដោយសារជំរាលទឹកភ្លៀង ។

ការបំពុលពីធម្មជាតិមាន៖

- ប្រភពនៃ អាស៊ីត (N) ការផុយរលួយរុក្ខជាតិនៅក្រោមដី... ។
- បាក់តេរីបានបំប្លែងផ្នែកនៃរុក្ខជាតិទៅជាអាម៉ូញាក់ (NH_4) ដែលជាអុកស៊ីតនៃនីទ្រីត NO_2 ហើយបើអុកស៊ីសែន (O_2) មាននៅពេលនោះវានឹងចាប់ជាមួយ NO_2 យ៉ាងឆាប់រហ័សក្លាយជា NO_3 ។

៥.២.២ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (Irrigation system)

នៅក្នុងតំបន់គម្រោងនេះចាប់ពីទំនប់ទី២ឡើងទៅលើ មានដីធ្លីសរុបប្រមាណ ១០៣ ហិកតា ហើយដីទាំងនោះពុំមាន ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ របស់រដ្ឋសំរាប់ស្រោចស្រពទេ ។ សព្វថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់យកទឹកអូរឃី ខាងលើតំបន់ទេសចរណ៍ កោះតាដា មកស្រោចស្រពចំការរបស់ខ្លួន ដោយតាមបណ្តាញទឹក (របាយការណ៍ពីលោក ចាន់ ច័ន្ទ្យា ប្រធានមន្ទីរ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តកំពត និងការសិក្សាផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ SAWAC) ។ អ្នកភូមិមាត់ពាមមួយចំនួនមាន ការបូមយកទឹកពីព្រែកទឹកឈូនៅផ្នែកខាងលើមណីយដ្ឋានទឹកឈូទៅស្រោចស្រពដំណាំពូកតាតាមបណ្តាញបំពង់ទុយោ ហើយ មួយចំនួនទៀតដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមមណីយដ្ឋានទឹកឈូ ក៏មានបូមទឹកពីព្រែកទឹកឈូទៅនៅរដូវវស្សាទៅស្រោចស្រពដំណាំ ពូកតាផងដែរ ។

៥.២.៣ លក្ខណៈសណ្ឋានភាពដី ប្រភេទដី និង ភូគព្ភសាស្ត្រ នៅក្នុងតំបន់គម្រោង
(Topography Soil Type and Geology in Project Area)

៥.២.៤.១ សណ្ឋានភាពដី (Topography)

លក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់តំបន់គម្រោង គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំដំរី និងមានផ្នែកខាងក្រោមជាប់ និងទំនាបនៃព្រែកកំពង់បាយ ដែលមានរយៈកំពស់ចាប់ពី ២០ម (តំបន់ខាងក្រោមមុំមណីយដ្ឋានទឹកឈូ) ទៅដល់ ៤៥០ម (តំបន់ខាងលើមុំទំនប់ទី១) ធៀបនឹងនិរ្វិសមុទ្រ (មើលផែនទីលេខ១ និងលេខ២) ។ ជំរាលដីជាមធ្យមក្នុងតំបន់គម្រោងគឺ ប្រហែល $I=0.31$ ។

៥.២.៤.២ ប្រភេទដី (Soil Type)

តាមផែនទីប្រភេទដីរបស់លោក Crocker ឆ្នាំ ១៩៦៣ មាត្រដ្ឋាន ១/១.០០០.០០០ បានបង្ហាញថា តំបន់ដីផ្ទៃអោង ដែលនឹងត្រូវលិចនេះមានសមាសភាពដី តែមួយប្រភេទទេគឺ ប្រភេទដី Acid Lithosols មានផ្ទៃដី ១៥៥៧,៣ ហិកតា (១៥,៥៧៣គម^២) ។ ដីប្រភេទនេះ គឺមាន ដី ដែលមានល្បាយគ្រួសលាយដីក្រហមក្រមៅ និងដីកណ្តុង លឿងព្រឿងៗ និង ដីខ្សាច់ហ្ន៎តិចតួច ពណ៌ប្រផេះ ។ ប្រភេទដីដែលនៅសល់ជាដីព្រែក និង អូរធម្មជាតិ គឺ ៤៤២,៧ ហិកតា ។

៥.២.៤.៣ ភូគព្ភសាស្ត្រ (Geology)

យោងតាមផែនទីភូគព្ភសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថា នៅតំបន់និរតីប្រទេសមិនមានភាពផ្សេងគ្នាទេ ចំពោះ "សិលា ថ្មភក់ស្រទាប់លើ" នៃក្រុមសិលានៅភ្នំបូកគោ និងតាមបណ្តោយនៃអោងស្ទឹងកំបោម ។

ការមើលឃើញទូទៅ គឺអវត្តមានដីស្រទាប់លើនៅតំបន់ជាប់ខាងលើនៃស្ទឹង ព្រែក ផ្នែកលើផែនទីភូគព្ភសាស្ត្រលំអិតនៃ ទំនប់គម្រោង (ទីតាំងអោងស្តុកទឹក និងសំណង់សិល្បការដ្ឋានទៀត) បានផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ការសន្និដ្ឋានទូទៅផ្ទៃដីលើ ចំពោះ ការសិក្សាអង្កេតឃ្លាំងតំបន់ស្រទាប់ដីខាងក្រោម ដែលសំដែងប្រាប់បាននៅចំណុចទី១២.៥ ។ វាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងគ្រប់គ្រាន់ នូវលក្ខណៈស្រទាប់ដី និងប្រភេទសិលាលើកំរាស់សិលាកំទេចកំណ នៅកំណត់កណ្តាល ៨០០ម ទៅដល់ ៣០០០ម តាមផ្ទៃដីកំពី តំបន់ទឹកឈូទៅកំបោមប៉ែកខាងលើ ។

ទិន្នន័យនៃការសិក្សាលើភូគព្ភសាស្ត្រក្នុងតំបន់គម្រោង របស់ក្រុមហ៊ុន មានចែងក្នុងតារាង ១៦ ខាងក្រោម (មើល DWG No. DW3-DW7 Volume ២) ។

តារាងលេខ ១៦: លទ្ធផលនៃការសិក្សាភូគព្ភសាស្ត្រក្នុងតំបន់គំរោង

ស្ថានភាព ភូមិសាស្ត្រ	ក្រុម		ប្រភេទថ្ម	កម្រិតក្រាស់ (ម)	បេដ្ឋានធានាសម្បទានរបស់គំរោង
កំបោលខាងលើ	XI	GS	Fine to medium grained quartz-sandstone. Some gravelly levels.	70-100	
	X	GA3	Alternate levels of felds-quartz, sandstone, clayey sandstone, claystone, "Aleurolites"	150-200	
	IX	AG	Sandy "Aleurolites" and claystone with levels of quartz/quartz-felds, clayey matrix sandstone.	35-45	
	VIII	G3	Quartz-felds/quartz sandstone with some "Aleurolites" levels.	30-35	
កំបោលកណ្តាល	VII	GA2	Fine to medium grained felds-quartz sandstone with some "Aleurolites" levels.	55-80	
	VI	G2	Fine-grained felds-quartz sandstone above a level of quartzitic sandstone.	25-40	
	V	A	Thinly bedded "Aleurolites" changing into clayey sandstone.	20-40	
	IV	ALG	Thinly bedded, fine-grained, clayey-cemented felds sandstone. Frequent levels of "Aleurolites" and clayey breccias with carbonaceous inclusions.	40-70	
កំបោលខាងក្រោម	III	GR	Quartz sandstone and gravelly sandstone. At times some "Aleurolites" levels	20-25	
	II	G1	Thinly bedded quartz-sandstone below a quartz-rich level. Rare breccias and Aleurolites.	55-70	
	I	GA1	Quartz-felds. Sandstone with carbonaceous inclusions. Some "Aleurolites"	15-25	

តារាងលទ្ធផលនៃការសិក្សាភូគព្ភសាស្ត្រក្នុងតំបន់គំរោងបង្ហាញនូវភាពប្រែប្រួលនៃសិលាកំរិតទេចកំណ ទោះបីនៅក្នុងប្រភេទដូចគ្នា ។ មានបន្ទុកដីឥដ្ឋច្រើននៅកំបោលកណ្តាល ប្រៀបធៀបនឹងតំបន់ខាងក្រោម ។ សូមចាប់អារម្មណ៍ថា ក្រៅពីផ្ទាំងថ្មភក់ (sandstone) នៅមានដីឥដ្ឋ ដីល្បាប់ និងភាពខ្វះខាតនៃស្រទាប់នីមួយៗមានកម្រិតខ្សោយ ដែលនៅរួមគ្នាជារបៀបឡង់ទី បន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើនស្រទាប់ គឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃបរិស្ថានល្បាប់កំរិតទេចកំណ ។

តាមការពិនិត្យសង្កេតដោយភ្នែកផ្ទាល់ របស់ក្រុមសិក្សារបស់ SAWAC ឃើញថា តំបន់ភ្នំកំបោលនេះសំបូរទៅដោយសិលាកំរិតទេចកំណ ឬសិលាថ្មភក់ sandstone ហើយភូគព្ភសាស្ត្រក្នុងតំបន់គំរោងពុំមានលក្ខណៈជាសិលាជាប់មាំ ខ្លាំងឡើយ គឺមានសិលាថ្មភក់មិនស្មើសាច់ ដែលភ្ជាប់ ដោយស៊ីម៉ង់ត៍ធម្មជាតិ ពុំសូវជាប់មាំ មើលរូបខាងក្រោមនេះ ។



ប្រភេទសិលានៅតាមភ្នំក្បែរទឹកឈូ ជាប់នឹងទីតាំងទំនប់ទីពីរ នៃតំបន់គំរោង វារីអគ្គិសនីកំបោល ។

៥.២.៤.៤ រ៉ែ (Mine)

ផ្អែកលើការសិក្សា ក្នុងតំបន់សាងសង់ទំនប់ទី១ និងទី២ រួមទាំងការសាងសង់ទូទៅនៃប្រព័ន្ធបំពង់ក្រោមដី ប្រវែងសរុប ១៤៣៥ ម មានមុខកាត់មធ្យម៧,៥ម របស់ក្រុមហ៊ុន បានឱ្យដឹងថាគ្មានរ៉ែសំខាន់ៗដែលមានតម្លៃសំរាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទេ ក្នុងតំបន់នេះ សូម្បីតែថ្នល់រ៉ែសំរាប់សាងសង់សំណង់ស៊ីវិលក៏គ្មានដែរ ។ ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងតំបន់អាងទី១ មានគ្រួសបាយក្រៀម ដែលដី ល្បាយដៃកម្ពុកស៊ីតលាយថ្មខ្សាច់តូចៗសំរាប់ សាងសង់ ផ្លូវគ្រួសក្រហមបាន ដែលមានចំណុចយាមការដូចតទៅ៖

តារាងលេខ ១៧៖ ការសិក្សាពីក្នុងតំបន់គំរោង

ល.រ	ប្រភេទនៃធនធានរ៉ែ	ខ្នាត	កូអរដោនេនៃចំណុចចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់	កំពស់
១	បាយក្រៀម និងខ្សាច់ល្បាយថ្ម	ការកើតឡើងសារធាតុរ៉ែ	S.P: X = 403797, Y = 1183789 E.P: X = 403643, Y = 1185659	កំពស់ដាច់ខាត<៧៥ម ពេញជំនន់
២	ក្រែលាយគ្រោះក្រហម	ស្រទាប់រ៉ែខ្នាតតូច	S.P: X = 404218, Y = 1184213 E.P: X = 404295, Y = 1184545	កំពស់ដាច់ខាត<៧៥ម ពេញជំនន់
៣	ខ្សាច់ស (ទីតាំងទី៣៧៧)	ស្រទាប់រ៉ែខ្នាតតូច	X = 403849, Y = 1189093	កំពស់ដាច់ខាត<៧៥ម ពេញជំនន់
៤	គ្រោះក្រហមល្បាយខ្សាច់ថ្ម	ស្រទាប់រ៉ែខ្នាតតូច	S.P: X = 403602, Y = 1189368 E.P: X = 403581, Y = 1189776	កំពស់ដាច់ខាត<៧៥ម ពេញជំនន់
៥	គ្រោះក្រហមល្បាយខ្សាច់ថ្ម (ទីតាំងខ្លះមានចែ)	ស្រទាប់រ៉ែខ្នាតតូច	S.P: X = 402764, Y = 1190546 E.P: X = 403263, Y = 1160784	កំពស់ដាច់ខាត<៧៥ម ពេញជំនន់
៦	គ្រោះក្រហមល្បាយខ្សាច់ថ្ម	ស្រទាប់រ៉ែខ្នាតតូច	S.P: X = 403300, Y = 1191866 E.P: X = 402670, Y = 1192535	កំពស់ដាច់ខាត<៧៥ម ពេញជំនន់

៥.២.៤ ព្រៃឈើ (Forestry)

ក្រុមការងារបានចែកតំបន់គំរោងជាពីរផ្នែកគឺតំបន់១ (ផ្ទៃអាងទី១ ទី២ និងតំបន់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) និងតំបន់២ (តំបន់តាមគន្លងខ្សែបញ្ជូនចរន្តតង់ស្យុងខ្ពស់២៣០គ.វ៉) ។ យោងតាមតាមផែនទីប្រភេទព្រៃឈើរបស់ JICA ឆ្នាំ ២០០២ មាត្រដ្ឋាន ១/១០០.០០០ និង DANIDA 2006 រួមទាំងតាមរូបភាពថតពីលើអាកាសដែលមាន Resolution 1 m year 2005 និង យោងការចុះធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់ របស់ក្រុមការងារ SAWAC បានបង្ហាញថាតំបន់គំរោងនេះមានផ្ទៃដីសរុប ចំនួន ២.២៩១,៣៧ ហិកតា (ក្នុងនោះមានផ្ទៃអាងទាំងពីរ ២០១៥,៧ ហិកតា (ដែលមានទី១មាន១៩៩០ហិកតា និងអាងទី២មាន ២៥,៧ ហិកតា) , តំបន់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនីកម្រាលរួមទាំងផ្លូវសំរាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងការសាងសង់ និងថែទាំគំរោង (ក្រៅអាង) ២៣២,៤៣ ហិកតា , កន្លែងយកថ្ម ២៧ ហិកតា និងគន្លងខ្សែបញ្ជូនចរន្តតង់ស្យុងខ្ពស់ ២៣០ គ.វ៉.ចំនួន ៣៣,១៥ហិកតា) មានប្រភេទ ព្រៃឈើ ដូចតទៅ៖

ដីព្រៃដែលប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់ទំនប់, អាងស្តុកទឹក, និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំរោងរួមទាំងផ្លូវ

- ព្រៃស្រោង ១.៥៤៥,៩៦ ហិកតា
- ព្រៃល្បាយឬស្សី ៤១៦ ហិកតា

សរុបផ្ទៃដីព្រៃឈើដែលនឹងត្រូវប៉ះពាល់៖ ១៩៦១,៩៦ ហិកតា (មានលម្អិតនៅតារាងខាងក្រោម)

តារាងលេខ ១៨ : ព្រៃដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់គំរោង

No.	Classify	Type of Forest	Area (ha)
1	Reservoir No.1	Evergreen Forest	1372
		Mixed Bamboo Forest	416
2	Road	Evergreen Forest	5.82
3	Concrete Mixing System	Evergreen Forest	12.45
4	Crushing Rock System	Evergreen Forest	16.77
5	Dam No.1 Construction Site	Evergreen Forest	10.47
6	Intake Tunnel Construction Site	Evergreen Forest	0.77
7	Power House No.1 Compound	Evergreen Forest	3.53
8	Surge Tank Construction Site	Evergreen Forest	0.35
9	Other area of infrastructure compound	Evergreen Forest	123.8
Total Area of Evergreen Forest			1545.96
Total Area of Mixed Bamboo Forest			416.00
Grand Total			1961.96

យោងតាមក្រុមការងាររបស់ SAWAC Consultants for Development បានធ្វើការសិក្សាប៉ះពាល់ព្រៃឈើមាន ២ ប្រភេទ គឺ ព្រៃស្រោង និងព្រៃឈ្មាយឫស្សី ។ ទំហំដីព្រៃដែលប៉ះពាល់មួយគំរោងគឺ $50 \times 50 = 2500$ ម^២ ចំពោះព្រៃស្រោង មាន ២០៥ គំរោង សរុបផ្ទៃព្រៃដែលសិក្សា $50 \times 2,5 \times 10^4$ ម^២ និង ព្រៃឈ្មាយឫស្សីមាន ៦៩ គំរោង សរុបផ្ទៃព្រៃដែលសិក្សា $107,5 \times 10^4$ ម^២ ហើយទីតាំងសិក្សាព្រៃឈើមានបង្ហាញក្នុងផែនទីលេខ ២ A&B ។


(បញ្ជាក់ : អ្នកចង្អុលបង្ហាញឈ្មោះព្រៃឈើ គឺជាអ្នកដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងតំបន់គំរោងនេះ ហើយជាអ្នកចេញចូលតំបន់នេះដើម្បីប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ ។

ការសិក្សាប៉ះពាល់ព្រៃឈើលើផ្ទៃដីសរុប 685×10^4 ម^២ ខាងលើ អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចតទៅ :

▪ ព្រៃស្រោង :

យោងតាមការសិក្សាប៉ះពាល់ព្រៃ លើផ្ទៃដី $50 \times 2,5 \times 10^4$ ម^២ នៃព្រៃស្រោងដែលមានផ្ទៃដី ១៣៧២ ហិកតា ក្នុងដីព្រៃដែលត្រូវលិចនេះ មានដើមឈើ ១៣៩ ប្រភេទ (មើលតារាងលេខ ១៩ ខាងក្រោម) ។

Map No. 2A Grid of Forest Study in Reservoir No. 1 of Kamchay Hydroelectric Project in Kampot Province




Projection: UTM, Zone 48
Ellipsoid Everest 1830
Datum: Indian 1980
Unit: Meter
Prepared Date: March, 2011
Prepared By:

Data Source:
- JICA 2003
- Geography Department
- Forestry Administration (through DANIDA)-2006
- SinoHydro Kamchay Hydroelectric Project Co. Ltd.
- Orthophoto year 2005, Resolution = 1m

LEGEND



- River/Stream
- Concrete Road
- Dam
- Tunnel
- Reservoir No. 1 = 1990 ha
- Lot Boundary
- National Park
- Pond/Lake
- Grid Selection
- Grid of Lot No. 1
- Grid of Lot No. 2
- Grid of Lot No. 3
- Grid of Lot No. 4
- Grid of Lot No. 5
- Grid of Lot No. 6
- Grid of Lot No. 7
- Grid of Lot No. 8
- Grid of Lot No. 9
- Grid of Lot No. 10




TUEK CHHU DISTRICT

KAMPOT PROVINCE




KINGDOM OF CAMBODIA



Map No.2B Wild Animals and Forest Study in Reservoir No.1 of Kamchay Hydroelectric Project in Kampong Province



- Evergreen Forest
- Mixed Bamboo Forest
- Sun Bear
- Tiger
- Eurasian Cat
- Fishing Cat
- Gibbon
- Turtle
- Gaur
- Leopard
- Water Sampling
- Access Road in Reservoir
- River/Stream
- Concrete Road
- Dam
- Tunnel
- Reservoir No.1 = 1990 ha
- Lot Boundary
- National Park
- Pond/Lake/River = 202 ha
- Evergreen Forest = 1372 ha
- Mixed Bamboo Forest = 416 ha




Map No.3 Hydropower Complex of Kamchay Hydroelectric Project in Kampot Province




- Village Center
- Transmission Line Tower
- Water Sampling
- Bokor National Park Substation
- Pump of Kampot Water Supply
- Concrete Bridge
- Steel Bridge
- Culvert
- Proposed Culvert
- 230kV High Voltage Transmission Line = 11.05 km
- Tunnel
- Dam
- Concrete Road
- New Laterite Road
- New Temporary Laterite Road
- Rehabilitation Laterite Road
- Railroad
- Bokor National Park
- Reservoir Area
- Hydropower Complex = 213.58 ha
- Evergreen Forest = 123.80 ha
- River/Stream = 18.49 ha
- Road = 6.53 ha
- Non Forest = 2.82 ha
- Infrastructure Boundary = 81.94 ha




SCALE 1:12000





KINGDOM OF CAMBODIA



KAMPOT PROVINCE




TUEK CHHU DISTRICT



LEGEND


- District Center
- Commune Center
- Village Center
- Transmission Line Tower
- Water Sampling
- Bokor National Park Substation
- Pump of Kampot Water Supply
- Concrete Bridge
- Steel Bridge
- Culvert
- Proposed Culvert
- 230kV High Voltage Transmission Line = 11.05 km
- Tunnel
- Dam
- Road
- National Road
- Asphalt Road
- Concrete Road
- New Laterite Road
- New Temporary Laterite Road
- Rehabilitation Laterite Road
- Railroad
- Bokor National Park
- Reservoir Area
- Hydropower Complex
- Infrastructure Boundary
- Substation
- Transmission Route Area (30m width) = 33.15 ha
- River/Stream/Pond/Lake = 1.13 ha
- Road = 0.33 ha
- People Landuse = 31.69 ha



LEGEND

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> District Center Commune Center Village Center Transmission Line Tower Water Sampling Sinhydro Kamchay Office Power House Bokor National Park Substation Pump of Kamport Water Supply Concrete Bridge Steel Bridge Culvert Proposed Culvert CPUE Study Point 230kV High Voltage Transmission Line = 11.05 km Tunnel Dam | <ul style="list-style-type: none"> National Road Secondary Road Asphalt Road Concrete Road New Laterite Road New Temporary Laterite Road Rehabilitation Laterite Road Railroad River/Stream Reservoir Area Bokor National Park Hydropower Complex Substation Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 |
|--|---|


TUEK CHHU DISTRICT



KAMPOT PROVINCE



KINGDOM OF CAMBODIA



ផែនទី ២ A

ផែនទី ២ B

ផែនទីលេខ ៣

Hydrocomplex

ផែនទីលេខ ៤

ទម្រង់តារាងទិន្នន័យ ២៣០ គ.វ

ផែនទីលេខ ៥

Fish (CPUE)

តារាងលេខ ១៩ : ការសិក្សាអំពីផ្លែឈើស្រោចលើដំបៅផ្ទៃដីក្នុងមួយគត្តនៃ ៥០២.៥០០ ម^២ (សិក្សា២០៥គត្តសាក)

ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣០ ឬ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	មីនាគត្ត	សំណល់	មុខគាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើ ផ្ទៃដី ៥០២.៥០០ ម ^២											
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
01	បាយព្រាំង	No.3	1	-	1	6	5	2	-	-	-	-	-	-	15
02	បាយក្រព្យញ្ច	Other	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
03	ឥន្ទនេល	No.1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
04	បំប្រក់	Other	-	-	-	-	5	4	3	1	-	-	-	-	13
05	ពពោលខែ	Other	-	-	13	8	10	8	8	2	1	-	-	1	51
06	ពញា	Other	10	4	10	6	5	2	-	-	-	-	-	-	37
07	ពញាប្រើស	Other	62	97	56	93	46	14	5	-	-	-	-	-	373
08	ពពួល	LUXURY	4	3	9	16	31	11	11	4	-	2	-	-	91
09	ពពេល	No.1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
10	ពកវាល	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11	ពន់តាឡី	Other	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
12	បន្ទាត់	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	បព្រឹក្ស	Other	-	-	-	-	12	4	-	-	-	-	-	-	16
14	ច័ន្ទត្រហម	Other	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
15	ចំបក់	Other	18	8	18	50	131	97	74	42	16	14	4	33	505
16	ជំពូនទឹក	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	ចង្កៀស	Other	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
18	ដង្កោ	Other	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
19	ដង្កុំ	Other	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3
20	ដង្កក់	Other	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
21	ដូងចែម	No.1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
22	ប៊ែប៊ីក	Other	-	-	-	2	6	3	2	-	-	-	-	-	13
23	ពោធិស្វា	Other	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
24	កៅអីម	Other	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
25	ម្សៅព្រៃ	Other	11	-	19	53	59	8	6	3	-	-	-	-	159
26	ម្សៅមាស	Other	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
27	ភ្លើង	Other	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28	ភ្លើងព្រៃ	Other	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	ភ្លើងមាត់	Other	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
30	ផ្កាសោម	Other	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
31	ផ្លែក	No.2	4	2	6	11	27	11	4	1	-	-	-	3	69
32	ឈើដំរី	Other	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	8

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	បំណាច់ផ្ទះ	សំណាម	មុខការតំណើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ ២០២០ ម											
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
33	ឈើក្អែង	Other	7	16	14	15	3	-	-	1	-	1	-	-	57
34	ឈើខ្មៅ	LUXURY	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-	13
35	ឈើទាល	No.2	-	-	2	10	25	15	1	2	-	-	-	-	55
36	ឈើទាលខាងដៃ	No.2	10	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	14
37	ឈើទាលខាងដៃ	No.2	10	-	7	2	4	1	-	-	-	-	-	-	24
38	ជ្រៃ	Other	-	1	-	2	8	8	3	8	4	2	0	10	46
39	ត្រៀល	Other	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
40	ត្រៀលស្លា	Other	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	10
41	សមាទ័	Other	179	104	252	378	242	48	9	4	-	-	-	3	1219
42	ស្ពៅ	Other	19	5	2	3	11	1	-	-	-	-	-	-	41
43	ស្ពៅភ្នំ	Other	14	-	5	9	19	10	1	-	-	1	-	-	59
44	ថ្លូវ	No.3	2	-	4	5	2	-	1	-	-	-	-	-	14
45	ឆ្នាំង	LUXURY	1	-	24	17	4	-	-	-	-	-	-	-	46
46	ថ្នាំ	Other	1	-	4	5	5	4	3	-	-	-	1	-	23
47	ឆ្នក	No.3	2	5	7	9	9	12	2	1	-	-	2	-	49
48	អង្កែបដៃ	Other	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
49	អង្កាញ់ស្លា	Other	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
50	អង្ការសិល្ប៍	Other	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
51	អង្កាត់ខ្មៅ	LUXURY	5	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
52	អំបែងបែក	Other	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	7
53	ក្បក	Other	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	តាវ	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
55	កប្បាសព្រៃ	Other	4	35	3	8	2	3	1	-	-	-	-	-	56
56	កកោះ	No.1	-	-	4	5	2	2	2	1	2	-	-	-	18
57	គគីរក្នុង	No.2	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	7
58	គគីរខ្សាច់	No.2	688	508	720	911	799	116	21	7	-	1	-	1	3772
59	គល់ស្លូវ	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60	កំពិលដូង	Other	2	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	10
61	កំពិលរាជ	No.3	15	19	12	50	66	25	7	2	1	-	-	-	197
62	កណ្តាប់ចង្កេះ	Other	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
63	កន្ទុយវី	Other	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
64	គុម្ពរមាស	Other	-	10	9	1	5	3	-	-	-	-	-	-	28
65	កូនព្រៃ	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
66	ម៉ាកព្រាង	No.3	170	11	50	108	159	98	67	27	6	5	2	1	704

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	មិនាត់ថ្នាក់	សំណាប	បុព្វកត់លើគីឡូម៉ែត្រ សិក្សាលើ ផ្ទៃដី ៥៦២.៥០០ ម ^២											
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
67	មន្ត្រី	Other	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	7
68	ម្នាក់	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
69	ឆាងដែង	No.2	-	-	1	6	4	4	1	1	1	-	-	-	18
70	ឆាងផ្អែក	No.2	18	17	34	55	56	28	19	6	1	-	-	-	234
71	ទី	Other	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
72	ផ្ទុះ	No.3	2	7	3	3	5	4	1	1	-	-	-	-	26
73	ផ្អិត	No.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
74	ក្លាស	Other	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
75	ក្នុង	Other	86	96	132	145	118	43	15	3	-	1	-	1	640
76	ក្នុង	Other	9	-	2	3	6	6	-	-	-	-	-	-	26
77	ផ្កា	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
78	ឆាំឆា	No.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
79	ប្រាំដំឡើង	No.3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
80	រាំង	No.1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4
81	រាំងភ្នំ	Other	-	-	2	1	8	7	1	-	-	-	-	-	19
82	ប្រភេទ	Other	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
83	ព្រះព្រា	Other	-	-	-	5	14	10	4	1	-	1	-	-	35
84	ព្រីង	Other	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
85	ព្រីងភ្នំ	No.3	6	8	60	100	168	66	41	31	6	5	-	2	493
86	ព្រួស	No.3	-	-	3	6	6	3	1	-	-	-	-	-	19
87	ច្រកែង	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
88	ច្រមាស់	No.2	-	37	16	33	27	4	1	1	-	-	-	-	119
89	រម្យញ្ច	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
90	រស្សត	Other	-	-	-	-	2	4	2	2	-	-	-	-	10
91	រង្គ	No.3	8	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	16
92	រកា	Other	2	2	5	8	3	4	-	1	-	-	-	-	25
93	ក្រាយ	No.3	1	-	-	9	2	-	-	1	-	-	-	-	13
94	ក្រពាត់ផ្អែក	Other	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	5
95	ក្រពៅ	No.3	-	29	80	148	83	14	6	3	-	1	-	1	365
96	ក្រពូង	LUXURY	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
97	ក្រឡាញ់	No.1	-	4	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	13
98	ក្រសាំង	Other	2	10	7	16	30	10	11	8	3	-	-	1	98
99	ក្រវាញ	Other	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
00	ផ្សេងៗ	Other	11	7	9	22	11	1	1	-	-	-	-	-	62

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	មីនាត់ថ្នាក់	សំណាក	មុនការកែសម្រួលដីស្រែ សិក្សាស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ ២០២០ ម											
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
101	ស្រឡៅ	No.1	6	14	33	88	164	127	80	24	14	6	-	3	559
102	ត្រាច	No.2	-	-	11	3	2	6	-	-	-	-	-	2	24
103	ត្របែកព្រៃ	Other	-	2	3	6	2	-	1	-	-	-	-	-	14
104	ត្រឡើងស្វា	Other	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	5
105	ត្រឡើង	No.3	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5
106	ត្រសក	No.1	2	6	3	15	13	6	3	4	-	-	-	1	53
107	ត្រសៀត	Other	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
108	ត្រយោង	Other	10	18	4	25	82	60	25	20	4	1	0	3	252
109	ត្រឡាត់	No.2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
110	ត្រមូង	No.3	14	7	10	16	10	5	-	1	-	1	-	-	64
111	ត្រយឹង	LUXURY	-	-	-	1	3	2	1	3	-	-	-	-	10
112	ស្លឹក	Other	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
113	ស្លាត់	No.3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
114	ស្លាត់ដុំ	Other	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
115	ស្លាក្របី	No.3	11	2	14	20	19	12	3	2	1	-	-	1	85
116	សង្កត់ត្នាត	No.1	-	-	1	-	5	2	2	1	-	-	-	-	11
117	សង្កា	Other	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	5
118	សំបុកអង្កា	Other	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
119	សំបុកមាត់	Other	-	-	-	6	5	-	-	-	-	1	-	-	12
120	សំលៀង	Other	6	2	3	15	30	14	-	-	-	1	-	-	71
121	សីរោង	Other	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
122	សំរង	Other	28	14	104	178	197	29	13	3	-	2	-	1	569
123	ស្វាយ	Other	224	487	333	129	36	5	3	-	-	-	-	-	1217
124	ស្លាត់	Other	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4
125	ស្លូត	Other	2	14	15	23	20	4	-	-	-	-	-	-	78
126	ស្វាយព្រៃ	No.3	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
127	ស្វាយស្លាត់	No.3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
128	ស្លឹក	Other	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	4
129	ត្រូវ	No.3	30	21	25	30	8	10	5	1	-	-	-	-	130
130	តាឡាត់	Other	1	-	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	8
131	តាត្រាវ	LUXURY	-	-	3	9	7	8	1	3	-	-	-	1	32
132	ទំពូង	Other	5	8	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	18
133	ទន្លាប់	Other	-	6	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	16
134	ខ្លឹង	No.3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	9

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	បំណាច់ផ្កាត់	សំណាយ	បុព្វការណ៍គិតជាម៉ែត្រ សិក្សាស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ ២០២០ ម											
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
135	ខ្នាស់	Other	18	79	169	199	137	25	9	2	-	-	-	1	639
136	ខ្នាត	No.2	20	8	20	105	230	78	27	21	3	1	-	1	514
137	ខ្នាត	No.2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
138	ខ្នាត	Other	16	126	117	49	112	39	12	2	1	-	-	-	474
139	ខ្នាត	No.2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4

 $V(\text{m}^3/\text{ha.})$ $88.80959 \text{ m}^3/\text{ha.}$

ମୁଦ୍ରାମୁଦ୍ରାମୁଦ୍ରାମୁଦ୍ରା:

រដ្ឋធានី: ស្ទៅតាសិត, ព្រះរដ្ឋ, បំប្រក់, ឫស្សីជក, កុងស្មាត្របី, ត្រកោ, ព្រះរដ្ឋ, រដ្ឋាភិបាល, ត្រកោ, ឫស្សីជក, ស្ទៅត្រៃ, ស្ទៅតាសិត, អង្គជ្រៃជក, ត្រកោ, រដ្ឋ, ឫស្សីខ្ពង់, ក្តាតភ្នំ, កុងមេសភ្នំ, ត្រកោ, កុងសេមាង, កុងស្វាយ, ឫស្សីថ្ងៃ, បនាសិត, ស្បូវឃាំង, ឫស្សីខ្នា ។

ឧទ្ទិៈ វិល្លឹយ, វិល្លឹត្រា, វិល្លឹចាម, វិល្លឹដើមកេប, វិល្លឹត្រៃលេងទៀង, វិល្លឹដើមគោ, វិល្លឹកណាប៉ូចងេរ, វិល្លឹចាម, វិល្លឹត្រា, វិល្លឹអង្គ, វិល្លឹដោះតង់, វិល្លឹដើមគោ, វិល្លឹខាត, វិល្លឹដើមកេប, វិល្លឹត្រៃលេងទៀង, វិល្លឹរចក.

វិស្វកុមារពេទ្យ, វិស្វក្រៀវ, វិស្វបន្ទាស្ថិត, វិស្វស្វាយ, វិស្វតុល, វិស្វឯឡងទៀន, វិស្វអនុប, វិស្វចាម, វិស្វជើងក្រប, វិស្វរមៀត, ឫស្សីខ្ពង, ភ្នាក់ង្គ, វិស្វតុល, វិស្វប្រឹស, វិស្វឯឡងព្រៃ, វិស្វនរក, វិស្វក្របីក្រោង, វិស្វក្រៀវ, វិស្វអនុប, វិស្វចាម, វិស្វអាឡ, វិស្វឯឡង។

យោងតាមតារាងលេខ ២០ ឈើដែលមានអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី ៣០០មម ឡើងទៅគឺ :

តារាងលេខ ២០: ចំណាត់ថ្នាក់ឈើនៅក្នុងចំណោមឈើដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយសហគមន៍ ដែលមានអង្គភាពស្ថិតនៅ ៣០០មម ឡើងទៅ

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	វិបូរ	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ	បំណាច់ថ្នាក់	មុខភាគឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាឈើ ផ្នែក ៥១២.៥០០ ម ^២									
#	Name	FANAM	SPENAM	QUACLA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total	
01	បាយពូរាំង	MILIACEAE	<i>Aglaia spectabilis</i>	No.3	5	2	-	-	-	-	-	-	7	
02	ឥន្ទនេល	LYTHRACEAE	<i>Lagerstroemia spp</i>	No.1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
03	ប័ប្រក់		<i>Drynaria fortunei</i>	Other	5	4	3	1	-	-	-	-	13	
04	ពពោលខែ	COMBRITACEAE	<i>Terminalia bialata</i>	Other	10	8	8	2	1	-	-	1	30	
05	ពញា	TILIAACEAE	<i>Grewia paniculata</i>	Other	5	2	-	-	-	-	-	-	7	
06	ពញាប្រើស	STERCULIACEAE	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Other	46	14	5	-	-	-	-	-	65	
07	ពពួល	VERBENACEAE	<i>Vitex sp</i>	LUXURY	31	11	11	4	-	2	-	-	59	
08	ពពេល	DIPTERACARPACEAE	<i>Hopea recopei / shoprea</i>	No.1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
09	ពកវាល			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
10	ពន់តាឡី	CELASTREAE	<i>Lophopetalum</i>	Other	-	1	1	1	-	-	-	-	3	
11	បន្ទាត់			Other	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
12	បព្រឹក្ស	CEASALPINIACEAE	<i>Cassia javanica</i>	Other	12	4	-	-	-	-	-	-	16	
13	ថ្មត្រហម		<i>Dracaena cambodiana</i>	Other	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
14	ចំបក់	IRVINGIACEAE	<i>Irvingia malayana</i>	Other	131	97	74	42	16	14	4	33	411	
15	ថ្មស្អាត			Other	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
16	ដង្កោ		<i>Planchonella</i>	Other	2	-	-	-	-	-	-	-	2	

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	អំបូរ	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ	បំណាច់ផ្ទាំង	មុខកាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើ ថ្ងៃទី ៥១២.៥០០ ម ^២									
#	Name	FANAM	SPENAM	QUACLA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total	
17	ដង្កូវ			Other	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
18	ដង្កាក់			Other	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
19	ដូងច័ម	STERCULIACEAE	Tarritia javanica	No.1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
20	ប៊ែប៊ឹក			Other	6	3	2	-	-	-	-	-	11	
21	ពោធិស្វា	ANACARDIACEAE	Spondias sp	Other	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
22	កៅអឹម			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
23	ម្សៅព្រៃ	SAPINDACEAE	Euphori cambodiana	Other	59	8	6	3	-	-	-	-	76	
24	ផ្លៀក	DIPTERACARPACEAE	Anishoptera grabra	No.2	27	11	4	1	-	-	-	3	46	
25	ឈើជ័រ		Excoecaria agallocha	Other	5	1	-	-	-	-	-	-	6	
26	ឈើភ្លើង	EBENACEAE	Diospyros nitida	Other	3	-	-	1	-	1	-	-	5	
27	ឈើខ្មៅ	EBENACEAE	Diospyros sp	LUXURY	9	4	-	-	-	-	-	-	13	
28	ឈើទាល	DIPTERACARPACEAE	Dipterocarpus alatus	No.2	25	15	1	2	-	-	-	-	43	
29	ឈើទាលនាងដៃ	DIPTERACARPACEAE	Dipterocarpus costatus	No.2	2	1	-	-	-	-	-	1	4	
30	ឈើទាលនាងជ្រូក			No.2	4	1	-	-	-	-	-	-	5	
31	ជ្រៃ	MORACEAE	Ficus sp	Other	8	8	3	8	4	2	0	10	43	
32	សេម៉ាន់	POACEAE	Nephelium xerospermum	Other	242	48	9	4	-	-	-	3	306	
33	ស្លៅ	MILIACEAE	Alzadirach indica	Other	11	1	-	-	-	-	-	-	12	
34	ស្លៅភ្នំ		Aglaia leptantha	Other	19	10	1	-	-	1	-	-	31	
35	ថ្មីវ		Anthoccephallus chinensis	No.3	2	-	1	-	-	-	-	-	3	
36	ឆ្នាំង	PAPILIONACEAE	Pterocarpus pedatus	LUXURY	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
37	ថ្នាំត់			Other	5	4	3	-	-	-	1	-	13	
38	ឆ្នក	ROSACEAE	Parinarium anamensis	No.3	9	12	2	1	-	-	2	-	26	
39	អង្កាញ់ស្វា		Archidendron quocense	Other	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
40	អង្កត់ខ្មៅ	EBENACEAE	Diospyros bejaudi	LUXURY	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
41	អំបែងបែក	SAPINDACEAE	Cardiospermum halicabum	Other	3	1	-	-	-	-	-	-	4	
42	តាវ			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
43	កប្បាសព្រៃ		Cochlospermum religiosum	Other	2	3	1	-	-	-	-	-	6	
44	កកោះ	CEASALPINIACEAE	Sindora cochinchinensis	No.1	2	2	2	1	2	-	-	-	9	
45	គគីរភ្លង	DIPTERACARPACEAE	Shorea hypochra	No.2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
46	គគីរខ្សាច់	DIPTERACARPACEAE	* Shore pierrei	No.2	799	116	21	7	-	1	-	1	945	
47	កំពឹងដូង			Other	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
48	កំពឹងរាជ	MILIACEAE	Sandricum indicum	No.3	66	25	7	2	1	-	-	-	101	
49	គុម្ពរមាស់	THEACEAE	Schima sp	Other	5	3	-	-	-	-	-	-	8	
50	កូនព្រៃ			Other	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
51	ម៉ាក់ប្រាង	ANACARDIACEAE	Bouea burmanica	No.3	159	98	67	27	6	5	2	1	365	

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	អំបូរ	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ	បំណាច់ផ្ទុក	បុព្វលាភឈើគិតជាម៉ែត្រ សិប្បកម្ម ឆ្នាំ ៥០២.៥០០ ម ^៣									
#	Name	FANAM	SPENAM	QUACLA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total	
52	មន្ត្រី			Other	2	-	1	-	-	-	-	-	3	
53	ម្នាក់			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
54	នាងដៃដង	DIPTERACARPACEAE	<i>Dipterocarpus costatus</i>	No.2	4	4	1	1	1	-	-	-	11	
55	នាងផ្អែក	LAURACEAE	<i>Hassia ounata</i>	No.2	56	28	19	6	1	-	-	-	110	
56	នី		<i>Palaquium obovatum</i>	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
57	ផ្ទុះ	GUTTIFERES	<i>Callophyllum sp</i>	No.3	5	4	1	1	-	-	-	-	11	
58	ផ្អែក	DIPTERACARPACEAE	<i>Shorea otusa</i>	No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
59	ភ្លាស	MELASTROMACEAE	<i>Memecylon floribundum</i>	Other	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
60	ភ្លង	MELASTROMACEAE	<i>Memecylon edule</i> \ <i>memecylon acuminatum</i>	Other	118	43	15	3	-	1	-	1	181	
61	ភ្នំ	DILLENIACEAE	<i>Dillenia ovata</i>	Other	6	6	-	-	-	-	-	-	12	
62	ផ្កា			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
63	ឆ្មារ	MELIACEAE	<i>Toona ferbrifiga</i>	No.2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
64	ច្រំដំឡើង	COMBRITACEAE	<i>Terminalia mucronata</i>	No.3	8	-	-	-	-	-	-	-	8	
65	រាំង	DIPTERACARPACEAE	<i>Shorea siamensis</i>	No.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
66	រាំងភ្នំ		<i>Lecythidaceae</i>	Other	8	7	1	-	-	-	-	-	16	
67	ប្រឡៅ			Other	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
68	ព្រះព្រា	COMBRITACEAE	<i>Terminalia nigrovirens</i>	Other	14	10	4	1	-	1	-	-	30	
69	ព្រីង			Other	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
70	ព្រីងភ្នំ	MYRTACEAE	<i>Eugenia spp</i>	No.3	168	66	41	31	6	5	-	2	319	
71	ព្រួស	GUTTIFERES	<i>Garcinia ferra</i>	No.3	6	3	1	-	-	-	-	-	10	
72	ច្រកែង	EUPHORBIACEAE	<i>Coccoceras anisopodum</i>	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
73	ច្រម៉ាស់	DIPTERACARPACEAE	<i>Vatica astrotricha</i> /	No.2	27	4	1	1	-	-	-	-	33	
74	រមៀញ			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
75	រសៀត			Other	2	4	2	2	-	-	-	-	10	
76	រង្គ	GUTTIFERES	<i>Garcinia hanburyi</i>	No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
77	រកា	BOMBACEAE	<i>Bombax sp</i>	Other	3	4	-	1	-	-	-	-	8	
78	ក្រាយ	MIMOSACEAE	<i>Abizzia thorelli</i>	No.3	2	-	-	1	-	-	-	-	3	
79	ក្រពាត់ជ្រូក	MALVACEAE	<i>Uma lobata</i>	Other	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
80	ក្របៅ	FLACOURIACEAE	<i>Hydnocarpus anthelmatica</i>	No.3	83	14	6	3	-	1	-	1	108	
81	ក្រឡាញ់	CEASALPINIACEAE	<i>Dialium cochinchinensis</i>	No.1	3	3	-	-	-	-	-	-	6	
82	ក្រសាំង	RUTACEAE	<i>Feroniella lucida</i>	Other	30	10	11	8	3	-	-	1	63	
83	រំដួល	ANNONACEAE	<i>Popowia aberrans</i> \ <i>popowia doispyrifolia</i>	Other	11	1	1	-	-	-	-	-	13	
84	ស្រឡៅ	LYTHRACEAE	<i>Lagerstroemia spp</i>	No.1	164	127	80	24	14	6	-	3	418	
85	ត្រាច	DIPTERACARPACEAE	<i>Dipterocarpus intricatus</i>	No.2	2	6	-	-	-	-	-	2	10	

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	អំបូរ	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ	បំណាច់ផ្ទាំង	មុខកាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាឈើ ថ្ងៃទី ៥១២.៥០០ ម ^២								
#	Name	FANAM	SPENAM	QUACLA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
86	ត្របែកព្រៃ		<i>Lagerstroemia floribunda</i>	Other	2	-	1	-	-	-	-	-	3
87	ត្រចៀកស្វា			Other	1	-	1	-	-	-	-	-	2
88	ត្រមែង	RHIZOPHORACEAE	<i>Carallia lucida</i>	No.3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
89	ត្រសេក	CEASALPINIACEAE	<i>Peltophorum ferrugineum</i>	No.1	13	6	3	4	-	-	-	1	27
90	ត្រសៀត			Other	1	-	-	-	-	-	-	-	1
91	ត្រយោង	MELIACEAE	<i>Aglaia odorata</i>	Other	82	60	25	20	4	1	-	3	195
92	ត្រឡាត់	DIPTERACARPACEAE	<i>Vatica philastreana</i>	No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0
93	ត្រមូង	GUTTIFERES	<i>Garcinia schomburgiana</i>	No.3	10	5	-	1	-	1	-	-	17
94	ត្រយឹង	EBENACEAE	<i>Diospyros helferi</i>	LUXURY	3	2	1	3	-	-	-	-	9
95	ស្លឹកទឹក	EUPHORBIACEAE	<i>Cleistanthus sp</i>	Other	-	-	2	-	-	-	-	-	2
96	ស្លាច់	MYRTACEAE	<i>Melaleuca leucadendron</i>	No.3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
97	ស្លាច់ដុំ	MYRTACEAE	<i>Eugenia xylanica</i>	Other	-	-	-	-	-	-	-	-	0
98	ស្លាក្របី	MYRISTICACEAE	<i>Knema corticosa</i>	No.3	19	12	3	2	1	-	-	1	38
99	សង្កត់ត្នាត	BIGNONACEAE	<i>Sterospermum chelonoides</i>	No.1	5	2	2	1	-	-	-	-	10
100	សង្កា			Other	4	1	-	-	-	-	-	-	5
101	សំបុកមាត់		<i>Barringtonia angusta</i>	Other	5	-	-	-	-	1	-	-	6
102	សំលៀង			Other	30	14	-	-	-	1	-	-	45
103	សំរោង		<i>Sterculia foetida</i>	Other	3	-	-	-	-	-	-	-	3
104	សំរង	STERCULIACEAE	<i>Sterculia platanifolia</i> <i>sterculia lynchophor</i>	Other	197	29	13	3	-	2	-	1	245
105	ស្លាយ	MORACEAE	<i>Streblus asper</i>	Other	36	5	3	-	-	-	-	-	44
106	ស្លាភ្នំ		<i>Areca triandra</i>	Other	1	2	-	-	-	-	-	-	3
107	ស្លូត			Other	20	4	-	-	-	-	-	-	24
108	ស្លាយស្លាក់	ANACARDIACEAE	<i>Mangifera sp</i>	No.3	2	1	-	-	-	-	-	-	3
109	ស្លឹស			Other	-	-	1	-	2	-	-	1	4
110	ត្រូវ	COMBRITACEAE	<i>Terminalia chebula</i> /	No.3	8	10	5	1	-	-	-	-	24
111	តាឡាត់	BURSERRACEAE	<i>Canarium album</i>	Other	2	-	1	-	-	-	-	-	3
112	តាត្រាវ	LOGANIACEAE	<i>Fagraea fragrans</i> \ <i>afzelia cochinchinensis</i>	LUXURY	7	8	1	3	-	-	-	1	20
113	ទំពូង	EUPHORBIACEAE	<i>Mallotus cochinchinensis</i>	Other	-	1	-	-	-	-	-	-	1
114	ទន្លាប់			Other	3	-	-	-	-	-	-	-	3
115	ខ្លឹង	GUTTIFERES	<i>Calophyllum saigonensis</i>	No.3	3	-	-	-	-	-	-	-	3
116	ខ្លាស់			Other	137	25	9	2	-	-	-	1	174
117	ខ្នុរ	DIPTERACARPACEAE	<i>Shorea vulgaris</i>	No.2	230	78	27	21	3	1	-	1	361
118	ខុះ		<i>Fagaceae</i>	Other	112	39	12	2	1	-	-	-	166
119	ខ្វាវ	RUBIACAEA	<i>Adina cordipolia</i> \ <i>dipterocarpus turbinatus</i>	No.2	-	-	-	1	-	-	-	-	1

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	អំបូរ	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ	មិនទាន់ផ្ទុក	មុខកាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើ ផ្ទៃដី ៥១២.៥០០ ម ^២								
#	Name	FANAM	SPENAM	QUACLA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	Total
	មេគុណ a អាស្រ័យ d				0.245	0.245	0.181	0.18	0.63	0.632	0.632	0.632	
	មេគុណ b អាស្រ័យ d				0.409	0.409	0.469	0.47	0.45	0.452	0.452	0.452	
	កំពស់ឈើមធ្យម(ម)				6.742	7.174	7.799	7.437	8.120	8.139	8.333	8.691	
	LUXURY (V)				27	18	14	14	0	6	0	5	84
	No.1 (V)				94	101	96	43	39	18	0	18	409
	No.2 (V)				581	189	81	57	12	6	0	36	963
	No.3 (V)				275	180	147	101	34	36	15	23	810
	Other (V)				706	349	241	152	75	75	18	251	1868

■ ព្រៃឈើប្រភេទ:

យោងតាមការសិក្សារាប់ព្រៃ លើផ្ទៃដី ១៧២៥០០ម^២ ព្រៃឈើប្រភេទ ៦៩គំរូសាក ដែលមានផ្ទៃដី ៣៦៧ ហិកតា ក្នុងដី ព្រៃដែលត្រូវលិចនេះ មានដើមឈើ ៦០ ប្រភេទ (មើលតារាងលេខ ២១ ។

តារាងលេខ ២១: ការសិក្សាអំពីព្រៃឈើប្រភេទ លើផ្ទៃដីក្នុងតំបន់ប្រមូល ១៧២៥០០ម^២ (សិក្សា៦៩គំរូសាក)
ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣០ ឧ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	មិនទាន់ផ្ទុក	សំណាប	មុខកាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើ ផ្ទៃដី ១៧២៥០០ ម ^២									
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Total
01	ពញា	Other	-	-	6	3	4	-	-	-	-	-	13
02	ពញាប្រើស	Other	-	3	-	7	2	-	-	-	-	-	12
03	ពពួនទឹក	Other	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
04	ពពួន	LUXURY	-	-	-	6	1	2	1	-	-	-	10
05	ពពួនបាយ	Other	-	-	1	4	3	1	-	-	-	-	9
06	ចំបក់	Other	-	-	2	15	44	46	5	15	6	3	136
07	ជំពូនទឹក	Other	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
08	ដូងចែម	No.1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
09	ប៉ែប៊ូក	Other	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
10	បើស	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	ព្រៅ	Other	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
12	មៀនព្រៃ	Other	2	-	-	6	4	5	-	-	-	-	17
13	ផ្លែក	No.2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3
14	ឈើជ័រ	Other	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	4
15	ឈើទាលនាងផ្អែក	Other	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
16	គ្រឿងស្លា	Other	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	សមាត់	Other	2	5	6	9	18	1	1	-	-	-	42
18	ថ្មីវ	No.3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
19	ឆ្នក	No.3	-	1	2	7	10	1	-	-	-	-	21

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	បំណាច់ថ្នាក់	សំណាប	បុព្វការណ៍គិតជាម៉ែត្រ សិក្សាឈើ ផ្ទៃដី ១៧២៥០០ ម ^២									
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Total
20	អង្ការសិល្ប៍	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	កកោះ	No.1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3
22	គគីរខ្យាច់	No.2	2	-	6	14	15	1	-	-	-	-	38
23	កំពឹងដូង	Other	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
24	កំពឹងរាជ	No.3	-	-	3	8	14	3	2	-	-	-	30
25	ម៉ាក់ប្រាង	No.3	-	-	-	7	12	5	-	-	-	-	24
26	នាងផ្អែក	No.2	1	-	-	4	2	2	-	-	-	-	9
27	ភ្លង	Other	2	-	21	16	15	7	7	-	-	-	68
28	ភ្នំ	Other	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
29	ឆ្កង់ទឹក	Other	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
30	រាំងទឹក	Other	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
31	ព្រះព្នៅ	Other	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-	8
32	ព្រីងភ្នំ	No.3	-	-	3	14	16	5	1	-	-	-	39
33	ច្រម៉ាស់	No.2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
34	រកា	Other	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	8
35	ក្រពៅ	No.3	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	7
36	ក្រឡាញ់	No.1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
37	ក្រសាំង	Other	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	7
38	រំចេក	Other	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
39	ស្រឡៅ	No.1	1	1	7	1	7	17	3	1	-	-	38
40	ត្របែកត្រៃ	Other	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	ត្រសក	No.1	-	17	60	53	33	3	1	-	-	-	167
42	ត្រយោង	Other	-	-	-	-	4	5	1	-	-	-	10
43	ត្រមូង	No.3	-	-	7	2	2	-	-	-	-	-	11
44	ស្នាត្របី	No.3	-	-	1	6	3	3	-	-	-	-	13
45	សាឡាត់	Other	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	5
46	សង្កត់ត្នាត	No.1	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
47	សំព័រ	No.1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3
48	សំរង	Other	-	-	3	7	13	2	-	-	-	-	25
49	ស្វាយ	Other	-	-	14	1	-	-	-	-	-	-	15
50	ស្លាភ្នំ	Other	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
51	ស្លូច	Other	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
52	ស្វាយព្រៃ	No.3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
53	ត្រូវ	No.3	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	បំណាច់ផ្ទាំង	សំណាប	មុខគាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើផ្ទៃដី ១៧២៥០០ ម ^២									
#	Name	QUACLA	Seedling	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Total
54	តាឡាត់	Other	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4
55	តាត្រាវ	LUXURY	-	-	8	1	6	2	-	-	1	-	18
56	ទំពូង	Other	-	15	26	3	-	-	-	-	-	-	44
57	ខ្លាស់	Other	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	6
58	ខ្លវ	No.2	2	-	-	4	15	14	2	-	-	-	37
59	ខ្លវព្រៃ	No.3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
60	ខ្លុះ	Other	-	-	7	6	11	-	-	2	-	-	26
Total (V)				6.82	31.39	133.35	88.16	43.60	5.87	15.02	7.54	331.75	
V(m ³ /ha)				19.23200155 m ³ /ha.									

រុក្ខជាតិ: ត្រកោរ, កូនសេម៉ាន់, កូនស្វាយ, ឫស្សីថ្លៃ, បន្លាស្លឹក, ស្បូវឃ្លាំង, ឫស្សីខ្លា, ឫស្សីពក, ឫស្សីថ្លៃ, ប្រមាសព្រៃ, បន្លាសធម៌, ខ្លឹត, ប្រមាសព្រៃ,

ឧស្ម័ន: វល្លិអន្លង, វល្លិចាម, វល្លិអាឡ, វល្លិដំឡូង, វល្លិជើងគោ, វល្លិដកពាយ, វល្លិគុយ, វល្លិតាសិត, វល្លិដំឡូងជ្រូក.

យោងតាមតារាងលេខ ២២ លើដែលមានអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី ៣០០មម ឡើងទៅគឺ :

តារាងលេខ ២២ បំណាច់ផ្ទាំងឈើនៅក្នុងតំបន់ស្រាវជ្រាវដែលទទួលបានប៉ាន់ស្មានដោយសារគំរោង ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី ៣០០មម ឡើងទៅ

ល.រ	ឈ្មោះឈើ	អំបូរ	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ	បំណាច់ផ្ទាំង	មុខគាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើផ្ទៃដី ១៧២៥០០ ម ^២						
#	Name	FANAM	SPENAM	QUACLA	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Total
01	ពញា	TILIAACEAE	<i>Grewia paniculata</i>	Other	4	0	0	0	0	0	4
02	ពញាប្រើស	STERCULIACEAE	<i>Pterospermum diversifolium</i>	Other	2	0	0	0	0	0	2
03	ពពួល	VERBENACEAE	<i>Vitex sp</i>	LUXURY	1	2	1	0	0	0	4
04	ពពួលបាយ			Other	3	1	0	0	0	0	4
05	ចំបក់	IRVINGIACEAE	<i>Irvingia malayana</i>	Other	44	46	5	15	6	3	119
06	ដូងចម	STERCULIACEAE	<i>Tarritia javanica</i>	No.1	0	1	0	0	0	0	1
07	ប៉ៃប៊ុក			Other	3	0	0	0	0	0	3
08	ព្រៅ			Other	1	0	0	0	0	0	1
09	ម្សៅព្រៃ	SAPINDACEAE	<i>Euphorbia cambodiana</i>	Other	4	5	0	0	0	0	9
10	ផ្លៀក	DIPTERACARPACEAE	<i>Anishoptera grabra</i>	No.2	2	1	0	0	0	0	3
11	ឈើជ័រ		<i>Excoecaria agallocha</i>	Other	1	1	0	0	0	0	2
12	សេម៉ាន់	POACEAE	<i>Nephelium xerospermum</i>	Other	18	1	1	0	0	0	20
13	ធ្នូក	ROSACEAE	<i>Parinarium anamensis</i>	No.3	10	1	0	0	0	0	11
14	កកោះ	CEASALPINIACEAE	<i>Sindora cochinchinensis</i>	No.1	0	0	1	0	0	0	1
15	គគីរខ្សាច់	DIPTERACARPACEAE	<i>Shore pierrei</i>	No.2	15	1	0	0	0	0	16
16	កំពិលរាជ	MILIACEAE	<i>Sandricum indicum</i>	No.3	14	3	2	0	0	0	19
17	ម៉ាក់ប្រាង	ANACARDIACEAE	<i>Bouea burmanica</i>	No.3	12	5	0	0	0	0	17

ល.រ #	ឈ្មោះឈើ Name	វិស្វកម្ម FANAM	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ SPENAM	បំណាច់ផ្ទាំង QUACLA	ប្រភេទឈើតាមប្រភេទ សិក្សាលើផ្ទៃដី ១៧២៥០០ ម ^២						
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Total
18	ឆាវផ្អែក	LAURACEAE	<i>Hassia ounata</i>	No.2	2	2	0	0	0	0	4
19	ក្នុង	MELASTROMACEAE	<i>Memecylon edule</i> <i>memecylon acuminatum</i>	Other	15	7	7	0	0	0	29
20	រាំងទឹក	BARRINGTONIACEAE	<i>Barringtonia acutangula</i>	Other	1	0	0	0	0	0	1
21	ព្រះព្រៅ	COMBRITACEAE	<i>Terminalia nigrovenulosa</i>	Other	2	0	0	0	0	0	2
22	ព្រីងភ្នំ	MYRTACEAE	<i>Eugenia spp</i>	No.3	16	5	1	0	0	0	22
23	ច្រម៉ាស់	DIPTERACARPACEAE	<i>Vatica astrotricha</i> /	No.2	1	0	0	0	0	0	1
24	ក្របៅ	FLACOURIACEAE	<i>Hydnocarpus anthelmatica</i>	No.3	1	0	0	0	0	0	1
25	ក្រសាំង	RUTACEAE	<i>Feroniella lucida</i>	Other	4	0	0	0	0	0	4
26	រំចេក			Other	1	0	0	0	0	0	1
27	ស្រឡៅ	LYTHRACEAE	<i>Lagerstroemia spp</i>	No.1	7	17	3	1	0	0	28
28	ត្រសក	CEASALPINIACEAE	<i>Peltophorum ferrugineum</i>	No.1	33	3	1	0	0	0	37
29	ត្រយោង	MELIACEAE	<i>Aglaia odorata</i>	Other	4	5	1	1	0	0	11
30	ត្រមូង	GUTTIFERES	<i>Garcinia schomburgiana</i>	No.3	2	0	0	0	0	0	2
31	ស្លាក្របី	MYRISTICACEAE	<i>Knema corticosa</i>	No.3	3	3	0	0	0	0	6
32	សាឡាត់			Other	1	0	0	0	0	0	1
33	សំព័រ	URTICACEAE	<i>Artocarpus semperivirens</i>	No.1	2	0	0	0	0	0	2
34	សំរង	STERCULIACEAE	<i>Sterculia platanifolia</i> <i>sterculia lychnophor</i>	Other	13	2	0	0	0	0	15
35	ស្វាយព្រៃ	ANACARDIACEAE	<i>Mangifera indica</i>	No.3	0	0	0	1	0	0	1
36	ត្នូរ	COMBRITACEAE	<i>Terminalia chebula</i> /	No.3	2	1	0	0	0	0	3
37	តាឡាត់	BURSERRACEAE	<i>Canarium album</i>	Other	2	0	0	0	0	0	2
38	តាត្រាវ	LOGANIACEAE	<i>Fagraea fragrans</i> <i>afzelia cochinchinensis</i>	LUXURY	6	2	0	0	1	0	9
39	ខ្នាស់			Other	5	0	1	0	0	0	6
40	ខ្នុរ	DIPTERACARPACEAE	<i>Shorea thorelli</i>	No.2	15	14	2	0	0	0	31
41	ខ្នុរព្រៃ	URTICACEAE	<i>Artocarpus asperula</i> / <i>terminalia cambodiana</i>	No.3	1	1	0	0	0	0	2
42	ខុះ		<i>Fagaceae</i>	Other	11	0	0	2	0	0	13
រួមគ្នា a អាស្រ័យ d					0.25	0.25	0.18	0.18	0.63	0.63	
រួមគ្នា b អាស្រ័យ d					0.41	0.41	0.47	0.47	0.45	0.45	
កំពស់ឈើមធ្យម(ម)					6.10	6.62	7.03	7.31	6.83	6.50	
បន្ថែម	LUXURY (V)				3.29	2.71	1.01	0.00	2.15	0.00	9.15
	No.1 (V)				19.72	14.24	5.03	1.42	0.00	0.00	40.40
	No.2 (V)				16.43	12.21	2.01	0.00	0.00	0.00	30.65
	No.3 (V)				28.64	12.88	3.02	1.42	0.00	0.00	45.96

ល.រ #	ឈ្មោះឈើ Name	វដ្តប្រ FANAM	ឈ្មោះវិ.សាស្ត្រ SPENAM	បំណាច់ផ្ទុក QUACLA	មុខគាត់ឈើគិតជាម៉ែត្រ សិក្សាលើផ្ទៃដី ១៧២៥០០ ម ^២						
					0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	Total
		Other (V)			65.27	46.11	15.08	25.48	12.87	7.54	172.34

បញ្ជាក់: តម្លៃស្វយសារឈើ: ឈើប្រណិត: ១៥១ \$-២៨៣ \$; ឈើលេខ I: ៨១ \$; ឈើលេខ II: ៥៤ \$; ឈើលេខ III: ៤៣,២\$; ឈើថ្នាក់ផ្សេងៗ: ៤៣,២ \$ (យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំ IPCC សំរាប់ការព្រឹក្សាផ្ទៃដីកំណត់១៩៩៦)


៥.២.៥ សត្វព្រៃ និងមច្ឆជាតិក្នុងតំបន់គំរោង

៥.២.៥.១ សត្វព្រៃ-ថនិកសត្វ

ការសិក្សាសត្វព្រៃ (ថនិកសត្វ បក្សី និង ឧរស្សសត្វ) នៅតំបន់គំរោងគឺជាការងារអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងទៅតាមវិធីបង្ហាញជារូបភាពសត្វព្រៃ (Checklist) ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អត្តសញ្ញាណកម្ម សត្វព្រៃសំរាប់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចេញផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ ឆ្នាំ២០០២, សៀវភៅសត្វស្លាបនៃប្រទេសកម្ពុជា ចេញផ្សាយ ដោយក្រសួងបរិស្ថាន ឆ្នាំ១៩៩៨ ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ដែលមានមុខរបររក អនុផល ព្រៃឈើ និងនេសាទនៅក្នុងតំបន់គំរោង ជាពិសេស ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្នំប្រាំពីរ ឃុំម៉ាក់ប្រាំង និង ភូមិស្ទឹងកែវ ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ ក្នុងការសិក្សានេះ ក្រុមការងារ បានជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋ ០៣រូប ដែលស្គាល់ច្បាស់សត្វព្រៃ មាននៅក្នុងតំបន់គំរោង ដែលមានឈ្មោះ លោក **សុខ វ៉ែត** អាយុ ៤៤ឆ្នាំ, លោក **សែន សៀន** អាយុ២៩ឆ្នាំ លោក **ព្រំ ជឿន** អាយុ ២៦ឆ្នាំ ជាប្រធានផ្នែក។ បន្ទាប់មកក្រុមការងារ បានធ្វើការណែនាំដល់ពួកគាត់ អំពីការកំណត់សត្វព្រៃ ដោយបង្ហាញជារូបភាពសត្វព្រៃហើយនិង របៀបគូសលើរូបភាព ទាំងនោះ គឺមួយក្រុមគូសបាន តែម្តងលើសំណាករូបសត្វមួយប្រភេទ។ បន្ទាប់មក ក្រុមការងារបានបំបែកការធ្វើការ កំណត់សត្វព្រៃ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ខាងលើនេះ ជាបីផ្នែកផ្សេងៗគ្នា ដែលក្នុងមួយក្រុមមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០២នាក់។ ក្រោយមកធ្វើការប្រមូល លទ្ធផល ពីក្រុមនីមួយៗ ដើម្បីធ្វើការវិភាគរកចំនួនសត្វព្រៃ ឬមច្ឆជាតិ តាមគោលការណ៍ ២/៣ នៃចំនួនគំនូសរូបសត្វព្រៃនីមួយៗ ដែលក្រុមសិក្សាទាំង៣ក្រុមបានគូស (មានន័យថា យើងត្រូវពិនិត្យតាមលំដាប់ រូបភាពសត្វព្រៃ/មច្ឆជាតិ ហើយធ្វើការកំណត់សត្វព្រៃ តាមគំនូស ដែលក្រុមនីមួយៗបាន គូសឧបមាថា ក្រុមទី១ បានគូសយករូបភាពសត្វព្រៃ ១ប្រភេទ ថាមានរស់នៅតំបន់ គំរោង និងមានក្រុមទី៣ គូសយកប្រភេទសត្វព្រៃនេះដែរ ទោះបីក្រុមទី២ មិនបានគូសយកក៏ដោយ ក៏ចាត់ទុកថា ប្រភេទ សត្វព្រៃ មួយប្រភេទនេះ ពិតជាមាន រស់នៅក្នុង តំបន់គំរោង ហើយនិងកំណត់បន្តទៅលើប្រភេទសត្វផ្សេងៗទៀត រហូតដល់ រូបភាព ចុងក្រោយ) ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមការងារ បានចុះសិក្សាផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែង ដោយធ្វើការអង្កេត សិក្សា តាមដាន សត្វព្រៃ ហើយថតបាននូវសត្វព្រៃ លាមកសត្វ និងដានសត្វមួយចំនួនទៀតផង ។

បន្ថែមលើនេះទៅទៀត ក្រុមការងារសិក្សា បានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានពី ឆ្នាំអ្នកអភិរក្សឧទ្យានជាតិបូកគោ លោក **សេង សាមេន្យ** លោក **ម៉ុង ប៊ុនធឿន** និងលោក **យ៉ង គីម្យ** នាយកឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោ និងធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរកអនុផលព្រៃឈើមួយចំនួនផងដែរ អំពីវត្តមាន សត្វព្រៃ នៅតំបន់គំរោងនេះហើយលទ្ធផលដូចមានបង្ហាញថា ថនិកសត្វ ដែលតែងជួបប្រទះក្នុងតំបន់គំរោងមានចំនួន ៣៧ប្រភេទ ដូចក្នុងតារាងទី២៣ ខាងក្រោម:

តារាងលេខ ២៣ : ឈ្មោះសត្វសត្វតូចៗប្រភេទសត្វសត្វតូចៗ (សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០)

ល.រ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស	សំគាល់	រូបភាព
១	ពង្រួល	<i>Manis javanica</i>	Sunda Pangolin	I	
២	ខ្នង	<i>Bos gaurus</i>	Gaur	I	
៣	ឈ្នួស	<i>Muntiacus muntjak</i>	Red Muntjac		
៤	ឈ្នួសយក្ស	<i>Megamuntiacus vuquangensis</i>	Large-antlered Muntjac	I	
៥	កេខនរលោង	<i>Lutrogale perspicillata</i>	Smooth Otter	II	
៦	ផ្លែព្រៃ	<i>Cuon alpinus</i>	Dholes	II	
៧	សំពោចកល្យាណ ឬកាំង	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten	III	
៨	សំពោចក្រអូប/ត្នោត	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Common palm Civet	III	
៩	កាំប្រមាំ	<i>Hystrix brachyura</i>	East Asian Porcupine		
១០	កំប្រុកធំ	<i>Ratufa bicolor</i>	Black Giant Squirrel	II	
១១	កណ្តុរភ្នំ	<i>Rhizomys sumatrensis</i>	Large Bamboo Rat		
១២	កំប្រុកពណ៌	<i>Callosciurus finlaysonii</i>	Variable Squirrel		
១៣	កង្កែប	<i>Menetes berdmorei</i>	Berddmore's Squirrel		

១៤	ផ្កាដាវ	<i>Prionailurus beengalensis</i>	Eurasian Cat	II	
១៥	ផ្កាព្រៃ	<i>Felis chaus</i>	Jungle Cat	II	
១៦	ជ្រូកព្រៃ	<i>Sus scrofa</i>	Wild Pig (Boar)		
១៧	រឿងផេះ	<i>Nycticebus coucang</i>	Slow Loris	II	
១៨	រឿងភ្លើង	<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Pygmy Loris	II	
១៩	ស្វាត្រោស	<i>Macaca nemestrina</i>	Pig-tailed Macaque	II	
២០	ស្វាអង្កត់	<i>Macaca arctoides</i>	Stump-tailed Macaque	II	
២១	ស្វាក្តាម	<i>Macaca fascicularis</i>	Long-tailed Macaque	II	
២២	ស្វាព្រាម	<i>semnopithecus cristatus</i>	Silvered Languor	II	
២៣	ទោចថ្កាស់លឿង	<i>Hylobates gabriellae</i>	Yellow-cheeked Gibbon	I	
២៤	ទោចមុដ	<i>Hulobates pileatus</i>	Pileated Gibbon	I	
២៥	ខ្នាធំ (ដំបង)	<i>Panthera tigris</i>	Tiger	I	
២៦	ខ្នាត្រី	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Fishing Cat	II	
២៧	ខ្នាខ្លី	<i>Panthera pardus</i>	Leopard	I	

២៨	ខ្នាប្បូង	<i>Ursus thibetanus</i>	Asiatic Black Bear		
២៩	ខ្នាប្បូងតូច	<i>Ursus malayanus</i>	Sun Bear	I	
៣០	ក្ដាន់រំព្យង ឬផ្ទង ធំ	<i>Tragulus napu</i>	Greater Mousedeer		
៣១	ក្ដាន់រំព្យង ឬផ្ទង តូច	<i>Tragulus javanicus</i>	Lesser Mousedeer		
៣២	ឆ្កាបកន្ទុយខ្មៅ	<i>Petaurista philippensis</i>	Indian Giant Flying Squirrel		
៣៣	ឆ្កាបកន្ទុយក្រហម	<i>Petaurista petaurista</i>	Giant Flying Squirrel		
៣៤	ប្រឡើង	(Order: CHIROPTERA)	Bats		
៣៥	សំពោចធំ	<i>Viverra megaspila</i>	Large-spotted Civet	III	
៣៦	សំពោចវិលី/ឈ្មុសវិលី	<i>Viverricula india</i>	Small Indian Civet	III	
៣៧	ខ្លីន	<i>Viverra zibetha</i>	Large Indian Civet	III	

សំគាល់: I, II, III ជាលេខឧបសម្ព័ន្ធអនុសញ្ញា CITES ។

តាមការសិក្សានៅឆ្នាំ២០១០នេះ ឃើញថា ប្រភេទសត្វព្រៃ មួយចំនួនមិនដែល ជួបប្រទះ ដូចជា ស្វាត្រាវ៉ាត់ ដី កែវ ក្ដែចចក ៥.២.៥.២ ចក្សី

ចំពោះសត្វស្លាបដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃដែលត្រូវលិចមាន ៦៨ប្រភេទដូចដែលបានចែងក្នុងតារាងលេខ២៤ ខាងក្រោម:

តារាងលេខ ២៤ : ឈ្មោះបក្សីតែចម្បងប្រទះក្នុងតំបន់គំរោង (សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣០ ឬ ២០១០)

ល.រ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស	សំគាល់	រូបភាព
1	បាតូ	<i>Upupa epops</i>	Common Hoopoe		
2	ពពិចបំពង់ក ស ទ្រូងលឿងចាស់	<i>Alophoixus pallidus</i>	Puff-throated Bulbul		
3	ពពិចពុកមាត់លឿង	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	Stripe-throated Bulbul		
4	ពពិចខ្មៅ	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul		

5	ពពិចក្បាលខ្មៅកំបោម	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Black-crested Bulbul		
6	ពពិចត្រចៀកឆ្មុត	<i>Pycnonotus blanfordi</i>	Streak-eared Bulbul		
7	ពញាកំបង់	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Large-tailed Nightjar		
8	ពញាកំបង់វិក	<i>Caprimulgus affinis</i>	Savanna Nightjar		
9	ពពូលបំពង់ក លឿង	<i>Treron pompadora</i>	Pompadour Green Pigeon		
10	ពពូលចំពុះធំលឿង ឬ កំប្លក	<i>Treron curvirostra</i>	Thick-billed Green Pigeon		
11	ចាបពូកទ្រូងឆ្មុត	<i>Ploceus manyar</i>	Streaked Weaver		
12	ចាបចង្រ្កង	<i>Lonchura punctulata</i>	Scaly-breasted Munia		
13	ចាបចង្រ្កងចុងខ្នងស	<i>Lonchura striata</i>	White-rumped Munia		
14	ចាបចង្រ្កងក្បាលខ្មៅ	<i>Lonchura malacca</i>	Black-headed Munia		
15	ចាបតេតព្រៃ	<i>Orthotomus atrogularis</i>	Dark-necked Tailorbird		
16	ចាបកន្ទង់	<i>Nectarinia jugularis</i>	Olive-backed Sunbird		
17	ចាបកន្ទង់ពោះក្រហម	<i>Nectarinia sperata</i>	Purple-throated Sunbird		
18	ចាបកន្ទង់ក្រហម	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird		

19	ចក្រវិកកំប៉ាយស ឬត្រលែងវែក	<i>Garrulax leucolophus</i>	White-crested Laughingthrush			
20	ចក្រវិកវណ្ណឡងខ្មៅ	<i>Garrulax monileger</i>	Lesser Necklaced Laughingthrush			
21	ក្អែកទឹកធំ	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant			
22	ក្អែកទឹកមធ្យម	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Indian Cormorant			
23	ក្អែកទឹកតូច/ក្អាត	<i>Phalacrocorax niger</i>	Little Cormorant			
24	ព្រាំង ឬព្រាំង	<i>Aceros undulatus</i>	Wreathed Hornbill	II,R		
25	កេងកងពណ៌ត្នោត	<i>Anorrhinus tickelli</i>	Brown Hornbill	II		
26	កេងកងធំ	<i>Buceros bicornis</i>	Great Hornbill	I, R		
27	កេងកងតូច	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill	II		
28	ម្លេមតូចព្រៃ	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Asian Barred Owlet	II,C		
29	ស្មៅញាញ	<i>Anhinga melanogaster</i>	Darter			
30	សេកសោម	<i>Psittacula eupatria</i>	Alexandrine Parakeet	II,R		
31	ខ្លែងស្រោក	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	II		

32	អន្ទេបខ្មៅ	<i>Dicrurus macrocerus</i>	Black Drongo			
33	អន្ទេបខ្មៅផ្អែក	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo			
34	អន្ទេបប្រផេះ	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Ashy Drongo			
35	អន្ទេបទងកន្ត្រៃ	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo			
36	អកពស់ព្រៃ	<i>Spilomis cheela</i>	Crested Serpent Eagle	II		
37	ក្លយក្ស ឬត្រយងយក្ស	<i>Pseudibis gigantea</i>	Giant Ibis	R		
38	កញ្ឆក់ស្លាវីណូកខ្មៅ	<i>Rhipidura javanica</i>	Pied Fantail			
39	ងាវកក	<i>Halcyon capensis</i>	Stork-billed Kingfisher			
40	កងបង្កាស់	<i>Ceryle rudis</i>	Pied Kingfisher			
41	កងបង្កៀវស	<i>Todiramphus cholris</i>	Collared Kingfisher			
42	កងបក្សាស ខ្មៅ ឬប៉កតាវ	<i>Halcyon pileata</i>	Black-capped Kingfisher			
43	កុកម្ទេសទុំ	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Cinnamon Bittern			
44	កុកសំបកត្រពាំង	<i>Ixobrychus sinensis</i>	Yellow Bittern			

45	លូតធំ	<i>Centropus sinensis</i>	Greater Coucal			
46	លលកបាយ	<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted Dove			
47	មាន់ព្រៃ	<i>Gallus gallus</i>	Red Junglefowl			
48	មាន់ទោពណ៌ប្រាក់	<i>Lophura nycthemera</i>	Silver Pheasant			
49	មាន់ទឹកខ្មៅ	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen			
50	មាន់ទឹកទ្រូងស	<i>Amauromis phoenicurus</i>	White-breasted Waterhen			
51	ឆ្កែឆ្កួតលឿង	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Rufous Treepie			
52	ឆ្កែឆ្កួតខៀវ	<i>Urocissa erythrothyncha</i>	Red-billed Blue Magpie			
53	អោតឃ្មុំ	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Oriental Honey-buzzard	II,C		
54	ត្រចៀកកាំខ្មៅចុងខ្នងស	<i>Apus affinis</i>	House Swift			
55	ត្រចៀកកាំធំខ្នងត្នោត	<i>Hirundapus giganteus</i>	Brown Needletail			
56	ត្រដេវក្បាលបៃតង	<i>Merops philipinus</i>	Blue-tailed Bee-eater			
57	ត្រសេះខ្មៅ-សតូច	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Grey-capped Pygmy Woodpecker			
58	ត្រសេះខ្មៅភ្លើងតូច	<i>Dinopium javanense</i>	Common Flameback			

59	ត្រមាត់ខ្លា	<i>Crypsirina temia</i>	Racket-tailed Treepie			
60	សារិកាកែវក្បាលលឿង	<i>Ampeliceps coronatus</i>	Golden-crested Myna			
61	សារិកាកែវវង	<i>Gracula religiosa</i>	Hill Myna			
62	ស្វាំងលលក	<i>Elanus coeruleus</i>	Black-shouldered Kite	II		
63	ទាព្រៃក្បាលឆ្មុតស	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	III		
64	ទាព្រៃស្លាប ស	<i>Cairina scutulata</i>	White-winged Duck	I,En		
65	តាវ៉ៅ	<i>Eudynamys scolopacea</i>	Common Koel			
66	ទាវខៀវ	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller			
67	ទីទុយត្រីថ្មសស	<i>Ketupa Ketupu</i>	Buffy Fish Owl	II,R		
68	តុកកាតូ	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	Green-billed Malkoha			

សំគាល់: - I, II, III ជាលេខឧបសម្ព័ន្ធអនុសញ្ញា CITES ។

- En: Endangered Species, r: Rare species, Cr: Critically endangered species; Vu: Vulnerable species

៥.២.៥.៣ ពពួកឆ្កែស្លឹក (ឆ្កែ) និង កង្កែប

ពពួកឆ្កែស្លឹកច្រើនចូលចិត្តរស់នៅក្បែរប្រឡាយធម្មជាតិ និងអូរតូចៗ ដែលមានទឹកខួបប្រាំង-វស្សា។ នៅក្នុងតំបន់គំរោង គេតែងជួបប្រទះពពួកឆ្កែស្លឹក ចំនួន ២៣ប្រភេទ រស់នៅតាមមាត់ស្ទឹងកំបោល និងនៅក្បែរជ្រលងអូរ នៃជំរាលភ្នំកំបោលនេះ ។ ប្រភេទឆ្កែស្លឹកទាំងនោះ មានបង្ហាញក្នុងតារាង២៥ ដូចខាងក្រោម :

តារាងលេខ ២៥ : ប្រភេទសត្វ ដែលតែងជួបប្រទះនៅតំបន់គំរោង(សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ២០១០)

ល.រ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស	សំគាល់	រូបថត
1	បង្កុយស្ពានច្បារ	<i>Calotes versicolor</i>	Garden Fence Lizard		
2	បង្កុយស្ពាន		Horned Lizard		
3	ជាន				
4	ពស់ព្រៃខ្មៅ	<i>Ptyas korros</i>	Indochinese Ratsnake		
5	ពស់ព្រៃ	<i>Ptyas mucosus</i>	Common Ratsnake		
6	ពស់ព្រៃក្រហម	<i>Rhabdophis subminiatus</i>	Red-necked Keelback		
7	ពស់វែកដំបូក	<i>Naja siamensis</i>	Indochinese Spitting Cobra	II	
8	ពស់វែកក្របី	<i>Naja kaouthia</i>	Monocle Cobra	II	
9	ពស់វែករនាម	<i>Ophiophagus hannah</i>	King Cobra	II	
10	ពស់ក្រាយខ្លួនជ្រុងវែង	<i>Bungarus fasciatus</i>	Banded Krait		
11	ពស់ពញាកំបូស្សី	<i>Trimeresurus stejnegeri</i>	Bamboo Pit-viper		
12	ពស់ពញាកំខៀវកន្ទុយក្រហម-ត្នោត	<i>Trimeresurus albolabris</i>	White-lipped Pit Viper		
13	ថ្នាន់ធំឬពស់ថ្នាន់ក្បាលលឿង	<i>Python reticulatus</i>	Reticulated Python		
14	អណ្តើកទឹក	<i>Cyclemys spp.</i>	Asian Leaf Turtles		
15	អណ្តើកភ្នំ/ព្រិច/ដំបូក	<i>Indotestudo elongata</i>	Elongated Tortoise		
16	កញ្ចាញ់ចេក		Flying Frog		
17	កង្កែប...	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	Tiger Frog		

18	ក្អែក		Toad		
19	ក្អាយ	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asiatic Softshell Turtle		
20	កង្រង	<i>Physignathus cocincinus</i>	Water Dragon		
21	ត្រកូត	<i>Varanus bengalensis</i>	Common Monitor	I	
22	តុកកែ	<i>Gekko gekko</i>	Tokay Gecko		
23	អន្ស៊ង	<i>Varanus salvator</i>	Water Monitor	II	

សំគាល់: I, II, III ជាលេខរបស់ម្ចាស់អនុសញ្ញា CITES ។

៥-២-៦ ស្ថានភាពនេសាទត្រី

៥.២.៦.១ ស្ថិតិអកទេសាឧត្តិ នៅព្រែកកំបាយ ដែលពីចង្កែកលើត្រីមានប្រភពពីតំបន់គំរោង

តាមរយៈការធ្វើស្ថិតិរបស់ផ្នែករដ្ឋបាលជលផល អាជ្ញាធរភូមិពាក់ព័ន្ធ និងការសហការជាមួយក្រុមការងារ SAWAC នៅតាមបណ្តាលភូមិពាក់ព័ន្ធជាមួយគំរោង នោះស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ ដែលទទួលផលពីការធ្វើនេសាទ ដោយចរាចរត្រឹមចុះឡើងពីស្ទឹង កំបាយ នៃតំបន់គំរោង និងព្រែកកំបាយ នៅរដូវពេញកូន ដូចមានបង្ហាញនូវតារាង២២ខាងក្រោម ៖

[illegible]

A dark, textured background, possibly a book cover or endpaper, with a white horizontal bar at the bottom. The texture is grainy and uneven, with some lighter and darker patches. The white bar is solid and runs horizontally across the lower portion of the image.

ក.១ វិធីបាត់បង់បង្កើនសេវាសម្រាប់ នៅខាងក្រោមនៃបង្គន់ព័ន្ធនៃ

ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន តាមរយៈការចូលរួមសំភាសន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៨ភូមិ ជាប់មាត់ព្រែកកំប៉ាយ និងស្ទឹងកែវ ចំនួន៦១គ្រួសារស្មើនឹង ៤២%នៃចំនួនសរុប១៤៥គ្រួសារលើព័ត៌មានបច្ចេកទេសទាញ ក្នុងដំណាក់កាល មុនការសាងសង់គម្រោង ឆ្នាំ២០០៦ ។ លទ្ធផលដូចមាន ក្នុងតារាងទី២៩ ខាងក្រោម ៖

តារាងទី២៩: លទ្ធផលនៃការវិភាគលើព័ត៌មានបច្ចេកទេសទេសាទត្រី ដែលមានប្រភពព័ត៌មានគំរោង ២០០៦

ល.រ	ប្រភេទ ឧបករណ៍	ទំហំ ឧបករណ៍ មធ្យម ឆ្នាំកៗ	និមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍	ចំនួន ពលកម្ម	រដូវ នេសាទ	ទីតាំង នេសាទ	រយៈពេល នេសាទ មធ្យម	ចំនួន លើក	អត្រា ជលចាប់ មធ្យម	ទិន្នផល មធ្យម ឆ្នាំ ២០០៦	ប្រភេទ ត្រីចាប់ បាន
១	មេងត្រី ក្រស	60m×1.5m=90m ²	មេងស៊ែរោល PP/d=0.15, 2a=40cm	1-2	២ដង : មេរ័យ និងខែ ពេលទឹកជំនន់	ព្រែកកំប៉ាយ និងស្ទឹងកែវ	រយៈពេលត្រៀម និងនេសាទ ៣ថ្ងៃ ក្នុងពេលទឹកជំនន់ម្តងៗ ។	១ដង / រយៈពេល៣ថ្ងៃ	0.00៤គ.ក្រ/ម៉ោង/ម ^២	៥២គ.ក្រ/ឧបករណ៍/ឆ្នាំ/គ្រួសារនេសាទ	ត្រីក្រស, ត្រីខ្មៅ តាមនេសាទមានប្រភពព័ត៌មានគំរោង ។

តារាងទី៣០ : លទ្ធផលនៃការវិភាគលើព័ត៌មានបច្ចេកទេសទេសាទត្រី លក្ខណៈអាជីព តាមព្រែកកំប៉ាយ និងស្ទឹងកែវ ឆ្នាំ២០០៦

ល.រ	ប្រភេទ ឧបករណ៍	ទំហំ ឧបករណ៍ មធ្យម ឆ្នាំកៗ	និមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍	ចំនួន ពលកម្ម	រដូវ នេសាទ	ទីតាំង នេសាទ	រយៈពេល នេសាទមធ្យម	ចំនួន លើក	អត្រា ជលចាប់ មធ្យម	ទិន្នផល មធ្យម ឆ្នាំ ២០០៦	ប្រភេទ ត្រីចាប់ បាន
៣	មេងត្រី	90m×1.5m=135m ²	មេងស៊ែរោល PP/d=0.15, 2a=50cm	1-2	ប្រចាំឆ្នាំ	តាមព្រែកកំប៉ាយ និងផ្នែកខាងក្រោមតំបន់តំរោង	១២ខែ ហើយក្នុង១ខែ ការនេសាទ ជាមធ្យម ចំនួន ១៧ថ្ងៃ និងក្នុង១ថ្ងៃនេសាទរយៈពេល នេសាទ ១១ម៉ោង ៣ម៉ោង ។	១-២ដង	0.00១១គ.ក្រ/ម៉ោង/ម ^២	៣៥០គ.ក្រ/ឆ្នាំ/ឧបករណ៍/ គ្រួសារនេសាទ	ត្រី កុក, ឆ្កិន, តាអោន, ស្លាត, ក្រស, ស្រកាក្តាម, អណ្តាតវៃ, ក្តាមសេះ.

ល.រ	ប្រភេទ ឧបករណ៍	ទំហំ ឧបករណ៍ មធ្យម ម្នាក់ៗ	និមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍	ចំនួន ពលកម្ម	រដូវ នេសាទ	ទីតាំង នេសាទ	រយៈពេល នេសាទមធ្យម	ចំនួន លើក	អត្រា ផលចាប់ មធ្យម	ទិន្នផល មធ្យម ឆ្នាំ ២០០៦	ប្រភេទ ត្រីចាប់ បាន
	សន្ទូច	150 ផ្ទៃ	ផ្ទៃសន្ទូច លេខ១៣	1-2	ចន្លោះ ខែតុលា និងខែធ្នូ	ព្រែកកំចាយ ឬព្រែកកំចាយ	ពីម៉ោង៥:០០ព្រឹក - ៥ :០០ល្ងាច/យប់ រយៈពេលមធ្យម ១១ម៉ោង/យប់ ចំនួនថ្ងៃនេសាទមធ្យម ១៧ថ្ងៃ។	២-៣ដង	០.០០១៧គីឡូក្រាម/ម៉ោង/ថ្ងៃ	១៣០គ.ក្រ/ឧបករណ៍/ឆ្នាំ/ត្រួតពិនិត្យនេសាទ	ត្រីទ្រនេស, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខ្លីង មួយ ចំនួនមាន ប្រភពព័ត៌មាន គំរោង ន ។
៣	លបរប្រាំង ព្រល	2លប	ធ្វើពីប្លាស្ទិក	1-2	ចន្លោះ ខែកក្កដា និងខែតុលា រយៈពេល៦ខែ	ព្រែកកំចាយ និងស្ទឹងកែវ	រយៈពេលនេសាទមធ្យម ២៤ម៉ោង/ថ្ងៃ ចំនួននេសាទ ៣០ថ្ងៃ ក្នុង១ខែ	១ដង ព្រឹកព្រលឹម	០.០២៤គីឡូក្រាម/ម៉ោង/លប	២២២គ.ក្រ/ឧបករណ៍/ឆ្នាំ/ត្រួតពិនិត្យនេសាទ	បង្កង, ត្រីទឹកសាប មួយចំនួន

ក-២ ព័ត៌មាន អំពី បច្ចេកទេសត្រី ក្នុងតំបន់គំរោង នៃស្ទឹងកំចាយ

តារាង៣១: លទ្ធផលនៃការវិភាគលើព័ត៌មានបច្ចេកទេសនេសាទត្រី ក្នុងតំបន់គំរោង នៃស្ទឹងកំចាយសំរាប់ឆ្នាំ២០០៦

ល.រ	ប្រភេទ ឧបករណ៍	ទំហំ ឧបករណ៍ មធ្យម ម្នាក់ៗ	និមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍	ចំនួន ពល កម្ម	រដូវ នេសាទ	ទីតាំង នេសាទ	រយៈពេល នេសាទមធ្យម	ចំនួន លើក	អត្រា ផលចាប់ មធ្យម	ទិន្នផល មធ្យម	ប្រភេទ ត្រីចាប់បាន
១	មងត្រី	100m*1.5m = 150m ²	មងសរសៃចោល PP/ d=0.15, 2a=40cm-	1-2	១២ខែ	ក្នុងតំបន់គំរោង នៃស្ទឹងកំចាយ	១២ខែ ហើយក្នុង១ខែ ការនេសាទមធ្យម ១៧ថ្ងៃ និងក្នុង១ថ្ងៃរយៈពេលនេសាទមធ្យម ១១ម៉ោង ។	១-២ដង	០.០២៣ គ.ក្រ/ម៉ោង/ម	៧២២ គ.ក្រ/ឆ្នាំ/ឧបករណ៍/ ត្រួតពិនិត្យនេសាទ	ត្រីក្រស, ត្រីខ្លៅ ត្រីដំណម, ត្រីទ្រនេស, ត្រីខ្លាំង, ត្រីកំភរ, ត្រីកន្ទប់ ត្រីស្រកាក្អាម,

ល.រ	ប្រភេទ ឧបករណ៍	ទំហំ ឧបករណ៍ មធ្យម ម្នាក់ៗ	និមិត្តសញ្ញាឧបករណ៍	ចំនួន ពល កម្ម	រដូវ នេសាទ	ទីតាំង នេសាទ	រយៈពេល នេសាទមធ្យម	ចំនួន លើក	អត្រា ផលចាប់ មធ្យម	ទិន្នផល មធ្យម	ប្រភេទ ត្រីចាប់បាន
២	សន្ទូច	150 ផ្ទៃ	ផ្ទៃសន្ទូច ១២-១៤	1-2	១២ ខែ	ស្ទឹងកំចាយ	១២ខែ ក្នុងខែ ការនេសាទ ជាមធ្យម ១៧ថ្ងៃ និងក្នុងខែថ្ងៃនេសាទរយៈពេល នេសាទ ១១ម៉ោង ។	២-៣ ដង	0.00១៩គីឡូក្រ/ម៉ោង/ផ្ទៃ	៦៥៨ គ.ក្រ/ឆ្នាំ/ឧបករណ៍/នេសាទ	ត្រីតានេល, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខ្ចីង
៣	បោង	2បោង/ ម្នាក់	ធ្វើអំពីប្រឡូ កំពស់០.៨m	1-2	ប្រចាំខែ	ស្ទឹងកំចាយ	១២ខែ ក្នុងខែ ការនេសាទ ជាមធ្យម ១៧ថ្ងៃ និងក្នុងខែថ្ងៃនេសាទរយៈពេល នេសាទ ២២ម៉ោង ។	១ដង ពេលព្រឹក	0.0៨២ គីឡូក្រ/ម៉ោង/លប	៧៣៦ គ.ក្រ/ឆ្នាំ/ឧបករណ៍/នេសាទ	ត្រីតានេល, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខ្ចីង

យោង: ការប្រមូលព័ត៌មានតាមវិធីសាស្ត្រ PRA លើអ្នកនេសាទចំនួន ៣គ្រួសារ ក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទសរុប ៥គ្រួសារ នៅតំបន់គំរោង និង ការវិភាគព័ត៌មានតាមកម្មវិធី Microsoft Excel លើស្តីពីប្រភេទ និងទំហំឧបករណ៍ ចំនួនឧបករណ៍ បរិមាណផលចាប់ និង អត្រាផលចាប់ របស់គ្រួសារអ្នកនេសាទ ដែលបានសិក្សា ដើម្បីកំណត់កម្រិតនិយមមធ្យម ។

៥.២.៦.៣ ធនធានមច្ឆជាតិ

ក-១ ប្រភេទ និងការធ្វើចរាចររបស់ត្រី ក្នុងតំបន់គំរោង

ធនធានមច្ឆជាតិ ដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់គំរោង នេះ វាមានប្រភពក្នុងតំបន់ភ្នំកំចាយ និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រែកកំចាយជាពិសេសនៅរដូវវស្សា។ ការសិក្សាជាក់ស្តែងបានបង្ហាញថា កត្តានៃការបន្តពូជ និងរដូវកាល ជាមូលហេតុធ្វើឱ្យត្រីមួយចំនួនធ្វើចរាចរយ៉ាងសកម្មទៅវិញទៅមកនៅមជ្ឈដ្ឋានទីជម្រកភ្នំកំចាយ និងតំបន់ទំនាបព្រែកកំចាយ។ ក្នុងរដូវវស្សា ការបន្តពូជរបស់ប្រភេទត្រីក្រស ត្រីតានេល ត្រីខ្មៅ កំភរ ត្រីខ្មាន់ និងកំភរ ដែលមានប្រភពពីស្ទឹងកំចាយនេះ បានធ្វើចរាចរ នៅរដូវពង-កូន ជាពិសេសនៅពេលទឹកជំនន់ក្នុងខែកក្កដា និងសីហា។ ត្រីទាំងនេះ វាធ្វើចរាចរចុះមកពងកូន នៅតាមព្រែកកំចាយ និងអាចបន្តរហូតដល់ស្ទឹងកែវ ត្រង់ចំណុចភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ នៅពេលណាមានទឹកជំនន់ធំពីតំបន់ស្ទឹងកំចាយម្តងៗ។ ក្រោយពេលទំលាក់ពង ប្រភេទត្រីខាងលើ នឹងធ្វើចរាចរឡើងភ្លាមៗ ទៅកាន់ផ្នែកខាងលើនៃតំបន់គំរោង លើកលែងតែប្រភេទ ត្រីកំភរ ខ្មាន់ និងតានេល ដែលធ្វើចរាចរទៅលើនៃតំបន់គំរោងយឺតយ៉ាវ។

ទឹកជំនន់ដែលបង្កឱ្យត្រីមានចលនាបន្ទាត់ទី គឺក្នុងមួយឆ្នាំមានពីរដង គឺនៅខែកក្កដា និងខែសីហា ដោយឡែក នៅឆ្នាំ២០១០ នេះ ទឹកជំនន់តែម្តងគត់ ដែលអាចបង្កឱ្យត្រីមានចលនាបន្ទាត់ទីពីតំបន់គំរោង គឺនៅថ្ងៃទី៧-១១ ខែសីហា ប៉ុន្តែក៏រកទឹកជំនន់នេះតូច និងមានរយៈពេលពី២-៣ថ្ងៃ។

តាមការសិក្សាបានឱ្យដឹងថា ទាំងប្រជាជនសាមញ្ញ និងប្រជាជនសិក្សាមួយចំនួន តែងមានការត្រៀមជានិច្ចនៅរដូវកាល នៃទឹកជំនន់ម្តងៗ ជាពិសេសការត្រៀមទិញឧបករណ៍មេកូឡា និង៥ ដើម្បីនេសាទប្រភេទដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោងនេះ ជាពិសេស ប្រភេទត្រីក្រស ដែលបរិមាណខ្ពស់ជាងគេ ។ តាមការសម្ភាសន៍ ប្រជាជនសាមញ្ញ និងមិនអាជីព ចំនួន ៦១នាក់ និង ការវិភាគព័ត៌មាននៃការសម្ភាសន៍នេះ បានឱ្យដឹងថា មុនដំណាក់កាលសង់គំរោងឆ្នាំ២០០៦ ទឹកជំនន់ធំ គេអាចចាប់បានត្រី ដែល មានប្រភពពីតំបន់ភ្នំកំចាយ (តំបន់គំរោង) ជាមធ្យម ៤៦គ.ក្រ/គ្រួសារ ក្នុងរយៈពេលទឹកជំនន់ ក្នុងខែកក្កដា និងសីហា ។

ក-២ បរិមាណផលចាប់ត្រីដែលបានប្រភពពីតំបន់គំរោងនៅមុនទឹកជំនន់(ពីថ្ងៃទី៧-១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០)

តាមរយៈការសិក្សា ដោយរួមសហការជាមួយតំណាងអ្នកនេសាទ នៅតាមបណ្តាភូមិចំនួន ៨ភូមិ មាន១០ កំពង់ទូក ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការកត់ត្រាបរិមាណផលចាប់ត្រី ដែលមានទីតាំងដូចក្នុងតារាង៣២ខាងក្រោម ៖

តារាងទី ៣២ : ទីតាំងសិក្សាបរិមាណផលចាប់ត្រី ដែលបានប្រភពពីតំបន់គំរោងនៅខ្សែក ខាងក្រោមតំបន់គំរោង

ឈ្មោះភូមិ	ទីតាំងឡើងទូកនេសាទ	
	X	Y
ស្នំប្រាំពីរទី១	0409766	1176755
ស្នំប្រាំពីរទី២	0407185	1178437
បត់ក្បាលដំរី	0409088	1179097
កំពង់ត្រែង	0409607	1175825
ម៉ាក់ប្រាង្គ	0409913	1176863
អណ្តូងដីម៉ឺន	0409088	1179097
មាត់ពាមទី១	0407185	1178437
មាត់ពាមទី២	0408826	1180082
អន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ	0410343	1179079
តាអង្គ	0410433	1171725

លទ្ធផលកត់ត្រា ត្រូវបានគណនាផលចាប់សរុបប្រចាំថ្ងៃ តាមបណ្តាកំពង់ទូកទាំង១០ តាមរូបមន្តគណនាបរិមាណផល ចាប់ សរុបក្នុងមួយថ្ងៃ តាមរូបមន្ត $Y = (\sum_{i=1}^b Ybi) \times \frac{B}{b}$

Y : ជាបរិមាណផលចាប់សរុប ក្នុង១ថ្ងៃ

Ybi : ជាបរិមាណផលចាប់សរុប របស់អ្នកនេសាទ ដែលត្រូវបានកត់ត្រា ក្នុង១ថ្ងៃៗ

B : ចំនួនអ្នកនេសាទសរុប តាមកំពង់ទូក ឬតាមភូមិនិមួយៗ

b : ចំនួនអ្នកនេសាទ ដែលបានកាត់ត្រា

ផលចាប់សរុបក្នុងថ្ងៃៗ តាមកំពង់ទូកនិមួយៗត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា ហើយរកបរិមាណផលចាប់សរុប ក្នុងរយៈពេលជំនន់ ៣ថ្ងៃ យើងបាន ផលចាប់សរុបរួម ដូចក្នុងតារាង៣៣ខាងក្រោម ៖

តារាង៣៣: បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុបដែលបានប្រភពពីតំបន់គំរោងដោយឧបករណ៍មេ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១០

ទីតាំងប្រមូលទិន្នន័យ	បរិមាណផលចាប់រយៈពេល	បរិមាណផលចាប់រយៈពេល	បរិមាណផលចាប់សរុប
----------------------	--------------------	--------------------	------------------



	ពង្រីក ឆ្នាំប្រភេទត្រីក្រសុរ <i>Osteochilus vittatus</i> (គ.ក្រ)	ពង្រីក ឆ្នាំប្រភេទត្រីផ្សេងៗ (គ.ក្រ)	(គ.ក្រ)
កំពង់ទូកភូមិមាត់ពាម	119.40	22.47	141.87
កំពង់ទូកភូមិម៉ាក់ប្រាង្គ	83.35	33.44	116.79
កំពង់ទូកភូមិអណ្តូងជីម៉ឺន	171.00	45.69	216.69
កំពង់ទូកភូមិបត់ក្បាលដំរី	45.24	14.94	60.18
កំពង់ទូកភូមិកំពង់ត្រែង	22.83	22.23	45.06
កំពង់ទូកភូមិស្នំប្រាំពីរ	65.02	40.97	105.98
កំពង់ទូកភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ	56.70	48.20	104.90
កំពង់ទូកភូមិតាអង្គ	0	22	22
សរុបរួម	563.54	227.94	791.48
បរិមាណផលចាប់ក្នុង១គ្រួសារ	563.54/126=4.47Kg/fisherment	227.94/126=1.80Kg/fisherment	

ក-២-១ ការបំបែកប្លង់នៃបរិមាណផលចាប់ត្រីមែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោង នៅរដូវទឹកជំនន់ឆ្នាំ២០០៦-២០១០

យោងតាមការសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រ PRA និងកត់ត្រាតាមរយៈការសំភាសន៍ គឺដំបូងយើងប្រមូល រកព័ត៌មាន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបរិមាណផលចាប់មុនដំណាក់កាលសាងសង់គំរោង ឆ្នាំ២០០៦ តាមប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ និងព័ត៌មានប្រភេទ ត្រីដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោង ។ បន្ទាប់អ្នកចូលរួមបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការប៉ាន់ប្រមាណបរិមាណផលចាប់ថយ ឬកើន គិតជា ភាគរយក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ពីឆ្នាំ ២០០៧-២០០៩ និងមូលហេតុរបស់វា។ ដោយឡែកនៅឆ្នាំ២០១០នេះ គឺយើងសិក្សា ផ្ទាល់ដោយមានការកត់ត្រាជាក់លាក់ នៅតាមកំពង់ទូកនេសាទនីមួយៗ នៅតាមបណ្តាភូមិពាក់ព័ន្ធ ហើយទិន្នន័យត្រូវបានវិភាគ និងគណនាតាមរូបមន្ត ដូចមានក្នុងចំណុច ២.២.៣.៣ (ឃ) ។ លទ្ធផលដូចមានបង្ហាញ ក្នុងតារាងទី៣៤ ។

តារាង៣៤ : ការប្រែប្រួលបរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ដែលមានប្រភពព័ត៌មានគំរោង ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់២០១០

ឆ្នាំសិក្សា	វិធីសាស្ត្រសិក្សា ប្រចាំឆ្នាំ	ការប្រែប្រួលបរិមាណ ផលចាប់ តាមបណ្តាឆ្នាំ	ការប្រែប្រួល ចំនួនអ្នកនេសាទ (គ្រួសារ)	ផលចាប់ប្រភេទ ត្រីក្រុស Oste- ochilus Vittatus(គ.ក្រ)	ផលចាប់ សរុប (គ.ក្រ)	កំរិតទឹកជំនន់ ក្នុងខែកក្កដា និងខែសីហា
2006	PRA និងបញ្ជីសំនួរ		221	13,657	15,464	ទឹកជំនន់ធំ មាន២ដង
2007	PRA និងបញ្ជីសំនួរ	75% នៃផលចាប់ឆ្នាំ២០០៦	221	10,243	11,598	ទឹកជំនន់មធ្យម ២ដង
2008	PRA និងបញ្ជីសំនួរ	95% នៃផលចាប់ឆ្នាំ២០០៧	221	9,731	11,018	ទឹកជំនន់មធ្យម ២ដង
2009	PRA និងបញ្ជីសំនួរ	105% នៃផលចាប់ឆ្នាំ២០០៨	221	10,217	11,569	ទឹកជំនន់ធំ ២ដង
2010	ការសិក្សាផលចាប់តាម ការសំរង់តាមកន្លែង ឡើងទូកនេសាទ	16% នៃផលចាប់ឆ្នាំ២០០៩	173	564	791	ទឹកជំនន់តូច មាន១ ដង (ក្នុងខែសីហា)



យោងតាមតារាងទី៣៤ និងក្រាហ្វិកខាងលើ មុនដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោងឆ្នាំ២០០៦ ដែលមានទឹកជំនន់ធំ គេអាចនេសាទត្រីក្រស ត្រនេល និងត្រីខ្មៅ បានក្នុង រយៈពេលទឹកជំនន់ពីរលើក គឺនៅខែកក្កដា និងខែសីហា ។ ការធ្វើរាបចុះ យ៉ាងតំបន់របស់ពួកត្រីទាំងនេះ មានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ គឺមានរយៈពេលប្រមាណ២៤ម៉ោង ក្នុងរយៈពេលមានទឹកជំនន់ម្តងៗ ។ តែនៅឆ្នាំ២០១០ ជាដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោងដ៏ធំបំផុតដែលនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១១នេះ យើងឃើញថាបរិមាណផលចំណូលត្រី ដែលមានប្រភពពីតំបន់កំពង់ចាមមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមុនដំណាក់កាលសាងសង់គម្រោង គឺថយចុះពី១៥.៤៦៤គ.ក្រ (ក្នុងនោះត្រីក្រស១៣.៦៥៧គ.ក្រ) មកនៅត្រឹម៧៩១គ.ក្រ (ក្នុងនោះត្រីក្រស *Osteochilus Vittatus* ៥៦៤គ.ក្រ) ការថយចុះនេះ ដោយសារ ទឹកជំនន់ពុំមាននៅចុងខែកក្កដានោះទេ គឺមានតែក្នុងខែសីហាប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏រឹតទឹកជំនន់នេះ តូចបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ។ ម្យ៉ាងទៀត ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានទប់ស្កាត់ផ្លូវចរាចរត្រីស្ទើរទាំងស្រុងទៅ ហើយជាពិសេសការទប់ស្កាត់ ដោយទំនប់ទី២ ផ្នែកខាងក្រោមនៃគម្រោង ។ ដូចនេះហើយទើបយើង ពុំមានឃើញ ប្រភេទ ទ្រនេលខ្មៅ និង

ត្រីខ្មៅ ដែលរស់នៅក្នុងអាងប៉ែកខាងលើ ចាប់បាននៅផ្នែកខាងក្រោមនេះឡើយ ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ នេះគឺចាប់បានត្រីក្រស *Osteochilus Vittatus* ក្នុងបរិមាណផលចាប់តិចតូចបំផុត គិតជាមធ្យម ៤.៤៧គ.ក្រ/គ្រួសារ ដែលខុសពីបណ្តា ឆ្នាំកន្លងទៅ គិតពីឆ្នាំ២០០៦-២០០៩ ជាមធ្យម ៤៦ គ.ក្រ/គ្រួសារ អតិបរមា ៦៩.៩៧គ.ក្រ/គ្រួសារ ។

ក-៣ ការប៉ាន់ប្រមាណបរិមាណផលចាប់ តាមប្រភេទឧបករណ៍ នេសាទក្នុងអាងនៃតំបន់គំរោង

យោងតាមការសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រ PRA និងកត់ត្រាតាមរយៈការសំភាសន៍ គឺដំបូងយើងប្រមូល រកព័ត៌មាន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបរិមាណផលចាប់មុនដំណាក់កាលសាងសង់គំរោង ឆ្នាំ២០០៦ តាមប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ និងព័ត៌មានប្រភេទ ត្រីដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោង ។ បន្ទាប់អ្នកចូលរួមបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបំបែបប្រមាណផលចាប់ត្រី គិតជាភាគរយ ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ពីឆ្នាំ២០០៧-២០០៩ និងមូលហេតុរបស់វា។ ដោយឡែកនៅឆ្នាំ២០១០នេះ គឺយើងសិក្សាផ្ទាល់ដោយ មានការកត់ត្រាជាក់លាក់ ពីអ្នកនេសាទអាជីពនៅក្នុងតំបន់គំរោងពីខែមិថុនា ដល់ខែធ្នូ ហើយទិន្នន័យត្រូវបានវិភាគ និងគណនា តាមរូបមន្ត ដូចមានក្នុងចំណុច ២.២.៣.៣ (ឃ)។ លទ្ធផលដូចមាន បង្ហាញក្នុងតារាង៣៥ខាងក្រោម ៖



តារាង៣៥ : ការប៉ាន់ប្រមាណបរិមាណផលចាប់ តាមប្រភេទឧបករណ៍ នេសាទក្នុងអាងនៃតំបន់គំរោង

បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុបចាប់តាមប្រភេទឧបករណ៍ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និង២០១០			
ប្រភេទឧបករណ៍	បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ឆ្នាំ២០០៦ តាមវិធីសាស្ត្រ PRA និងបញ្ជីសំនួរ	បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ឆ្នាំ២០១០ តាម វិធីសាស្ត្រ PRA បញ្ជីសំនួរ និងសិក្សាជាក់ស្តែង	ប្រៀបធៀបបរិមាណផលចាប់ ឆ្នាំ២០១០ និង២០០៦
មងត្រី	3,609	2,227	62% នៃឆ្នាំ២០០៦
ប៉ោង	3,681	2,260	61% នៃឆ្នាំ២០០៦
សន្ទូចរនង	3,289	1,897	58% នៃឆ្នាំ២០០៦
បរិមាណផលចាប់សរុប	10,579	6,384	

ក-៣-១ ការបំបែបប្រមាណនៃបរិមាណផលចាប់ត្រីសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០១០ ក្នុងអាងនៃតំបន់គំរោង

តារាង៣៦ : ការបំបែបប្រមាណនៃបរិមាណផលចាប់ត្រីសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០១០ក្នុងអាងនៃតំបន់គំរោង

ឆ្នាំសិក្សា	វិធីសាស្ត្រសិក្សា	កំរិតថយចុះមធ្យម	បរិមាណផលចាប់សរុបប្រចាំឆ្នាំ (គីឡូក្រាម)
2006	PRA និងបញ្ជីសំនួរ		10,579
2007	PRA និងបញ្ជីសំនួរ	95% of 2006	10,050
2008	PRA និងបញ្ជីសំនួរ	90% of 2007	9,045
2009	PRA និងបញ្ជីសំនួរ	95% of 2008	8,593
2010	PRA - បញ្ជីសំនួរ & Suvey	83% of 2009	6,384



ក-៤ បរិមាណផលចាប់ត្រី សំរាប់គ្រួសារអ្នកនេសាទអាជីព នៅតាមបង្កែបកំចាយ

យោងតាមការសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រ PRA និងកត់ត្រាតាមរយៈការសំភាសន៍ គឺជំហ្វូងយើងប្រមូល រកព័ត៌មាន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបរិមាណផលចាប់មុនដំណាក់កាលសាងសង់គំរោង ឆ្នាំ២០០៦ តាមប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ និងព័ត៌មានប្រភេទត្រីដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោង ។ បន្ទាប់អ្នកចូលរួមបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបំបែបបរិមាណផលចាប់ត្រី គិតជាភាគរយ ក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ពីឆ្នាំ២០០៧-២០០៩ និងមូលហេតុរបស់វា។ ដោយឡែកនៅឆ្នាំ២០១០នេះ គឺយើងសិក្សាផ្ទាល់ដោយមានការកត់ត្រាជាក់លាក់ ពីអ្នកនេសាទអាជីពនៅតាមបង្កែបកំចាយ ចំនួន៨ភូមិ ពីខែ៧ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ហើយទិន្នន័យត្រូវបានវិភាគ និងគណនា តាមរូបមន្ត ដូចមាន ក្នុងចំណុច ២.២.៣.៣ (ឃ) ។ លទ្ធផលដូចមាន បង្ហាញក្នុងតារាង៣៧ខាងក្រោម :

តារាង៣៧ : បរិមាណផលចាប់ត្រី សំរាប់គ្រួសារនេសាទអាជីព នៅតាមបង្កែបកំចាយ

បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ដោយប្រភេទឧបករណ៍មេត្រី រយៈពេល១២ខែ (ខែមករា-ធ្នូ)				
	ចំណុចសិក្សា	បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ឆ្នាំ២០០៦ តាមវិធីសាស្ត្រ PRA និងបញ្ជីសំនួរ	បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ឆ្នាំ២០១០ តាមវិធីសាស្ត្រ PRA -បញ្ជីសំនួរ និងសិក្សាជាក់ស្តែង	ផ្សេងៗ
១	កំពង់ទូកភូមិមាត់ពាម	1,428	581	

បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ដោយប្រភេទឧបករណ៍មធ្យម រយៈពេល១២ខែ (ខែមករា-ធ្នូ)

	ចំណុចសិក្សា	បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ឆ្នាំ ២០០៦ តាមវិធីសាស្ត្រ PRA និងបញ្ជីសំនួរ	បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ឆ្នាំ២០១០ តាមវិធីសាស្ត្រ PRA -បញ្ជីសំនួរ និង សិក្សាជាក់ស្តែង	ផ្សេងៗ
២	កំពង់ទូកភូមិម៉ាក់ប្រាង្គ	2,785	862	
៣	កំពង់ទូកភូមិអណ្តូងជីម៉ឺន	3,621	2,924	
៤	កំពង់ទូកភូមិបត់ក្បាលដំរី	3,060	1,396	
៥	កំពង់ទូកភូមិកំពង់ត្រែង	1,870	577	
៦	កំពង់ទូកភូមិស្នំប្រាំពីរ	5,202	2,258	
៧	កំពង់ទូកភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ	6,075	4,855	
៨	កំពង់ទូកភូមិតាអង្គ	1,828	881	
	សរុបទី១	25,869	14,334	

បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ដោយប្រភេទឧបករណ៍សន្តូច រយៈពេល៣ខែ (តុលា-ធ្នូ) ក្នុង១ឆ្នាំ

៩	កំពង់ទូកភូមិអណ្តូងជីម៉ឺន	620	61	
១០	កំពង់ទូកភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ	332	179	
១១	កំពង់ទូកភូមិស្នំប្រាំពីរ	383	173	
១២	កំពង់ទូកភូមិបត់ក្បាលដំរី	230	41	
	សរុបទី២	1,565	454	

បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ដោយប្រភេទឧបករណ៍លបព្រួល រយៈពេល៦ខែ (កក្កដា - ធ្នូ) ក្នុង១ឆ្នាំ

១៣	អន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ	1242	724	
១៤	អណ្តូងជីម៉ឺន	252	270	
១៥	ស្នំប្រាំពីរ	390	0	
១៦	បត់ក្បាលដំរី	567	0	
១៧	ម៉ាក់ប្រាង្គ	306	0	
១៨	កំពង់ត្រែង	420	0	
១៩	សរុបទី៣	3,177	994	
	សរុបរួមទី១ + ទី២ + ទី៣	30,611	15,782	
២០	ក្នុងនោះប្រភេទត្រីចុះពីតំបន់កំរោង ឆ្នាំ២០០៦	5178		69.97Kg × 74 HH
២១	ប្រភេទត្រីចុះពីតំបន់កំរោង ឆ្នាំ២០១០		283	6.28 Kg × 45HH
២៣	ប្រភេទត្រីដែលមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ	14,589	7,191	M1-M6/year
២៤	ប្រភេទត្រីទឹកសាប និងទឹកភ្លៀង មានប្រភពពីតំបន់ផ្សេងៗ	16,022	8,591	M7-M12/year

សំគាល់ : - HH = ត្រីសាវ, M1-M6 = ខែមករា-ខែមិថុនា, M7-M12= ខែកក្កដា-ខែធ្នូ

- បំបែបរូបបរិមាណផលចាប់តាមបណ្តាញ គឺ ឆ្នាំ២០០៧ ស្មើនឹង៥៥.២០% នៃឆ្នាំ២០០៦ សំរាប់ឆ្នាំ២០០៨ ស្មើនឹង៥០.៥០ % នៃឆ្នាំ២០០៧ សំរាប់ឆ្នាំ២០០៩ ស្មើនឹង ៨៥.៧៥ % និងឆ្នាំ២០១០ ស្មើនឹង៨២.៥៣% ។

ឆ្លងតាមតារាងខាងលើ បានបង្ហាញថា ផលចាប់សរុបនៅឆ្នាំ ២០០៦ មានចំនួន ៣០.៦១១គ.ក្រ ក្នុងនោះផលចាប់ប្រភេទត្រីចុះពីតំបន់គំរោង មានចំនួន ៥.១៧៨គ.ក្រ ផលចាប់ត្រីមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ គិតពីខែមករា ដល់បំណាច់ខែមិថុនា មានចំនួន ១៤.៥៨៩គ.ក្រ ប្រភេទត្រីទឹកសាប និងទឹកភ្លៀងមានប្រភពពីតំបន់ផ្សេងៗ គិតពីខែកក្កដា ដល់បំណាច់ខែធ្នូ មានចំនួន ១០.០២២គ.ក្រ ។

ផលចាប់សរុបនៅឆ្នាំ ២០១០ មានចំនួន ១៥.៧៨២គ.ក្រ ក្នុងនោះផលចាប់ ប្រភេទត្រីចុះពីតំបន់គំរោង មានចំនួន ២៨៣គ.ក្រ ផលចាប់ត្រីមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ គិតពីខែមករា ដល់បំណាច់ខែមិថុនា មានចំនួន៧.១៩១គ.ក្រ ប្រភេទត្រីទឹកសាប និងទឹកភ្លៀងមានប្រភពពីតំបន់ផ្សេងៗ គិតពីខែកក្កដា ដល់បំណាច់ខែធ្នូ មានចំនួន ៨.៥៩១គ.ក្រ ។

ក-៥ បរិមាណផលចាប់ត្រីសរុប ប្រចាំឆ្នាំ

ផ្អែកតាមការប្រមូលព័ត៌មាន និងសិក្សាខាងលើ លទ្ធផលត្រូវបានសង្ខេប ដូចក្នុងតារាង៣៨ខាងក្រោម :

តារាង ៣៨ : បរិមាណផលចាប់សរុប ប្រចាំឆ្នាំ

ព័ត៌មានសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ និងការកត់ត្រា	បរិមាណផលចាប់សរុបតាមបណ្តាញ	ផលចាប់ត្រីចុះពីតំបន់គំរោង	ផលចាប់ត្រីក្នុងតំបន់គំរោង (ស្ទឹងកំប៉ាយ)	ផលចាប់ត្រីប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរនិងត្រីទឹក សាបពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងព្រែកកំប៉ាយ	ផ្សេងៗ
2006	51476Kg	15464Kg	10579Kg	25433Kg	
2007	45847Kg	11598Kg	10050Kg	24199Kg	
2008	41963Kg	11018Kg	9045Kg	21900Kg	
2009	38941Kg	11569Kg	8593Kg	18779Kg	
2010	22674Kg	791Kg	6384Kg	15499Kg	


ក-៦ កត្តាសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួលបរិមាណផលចាប់ត្រី

មូលហេតុ នៃការថយចុះបរិមាណផលចាប់ : តាមការសិក្សាជាក់ស្តែង តាមរយៈការសំភាសន៍លើប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់មាន សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ នៅក្នុងតំបន់គំរោង បានឱ្យដឹងថា ការថយចុះនេះ គឺដោយសារតែមានអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ ២-៣ នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ ដូចជា ឧបករណ៍ឆក់ត្រី និងប្រើគ្រឿងផ្ទុះ ។

តារាង៣៩: ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ និងការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់ដោយឧបករណ៍ល្មើស នៅក្នុងស្ទឹងកំប៉ាយ
នៃតំបន់គំរោង សំរាប់ឆ្នាំ២០០៦ និង២០១០

ប្រភេទឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់	ការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកប្រើប្រាស់	ការប៉ាន់ប្រមាណទិន្នផលមធ្យម/ថ្ងៃ	ការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនថ្ងៃ/ខែ	ការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់/ខែ	ការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនខែ/ឆ្នាំ	ការប៉ាន់ប្រមាណផលចាប់សរុប
គ្រឿងផ្ទុះ	3	25	12	900Kg	6	5,400Kg
ឧបករណ៍ឆក់ត្រី	3	22	17	1122Kg	6	6,732Kg
ផលចាប់សរុបក្នុងឆ្នាំ២០០៦						12,132Kg
គ្រឿងផ្ទុះ	2	15	4	120Kg	6	720Kg
ឧបករណ៍ឆក់ត្រី	5	10	17	850Kg	6	5,100Kg
ផលចាប់សរុបក្នុងឆ្នាំ២០១០						5,820Kg

ប្រភេទត្រីជិតពូជៈ នៅតំបន់គំរោង មានប្រភេទត្រីនាគ ដែលជាប្រភេទត្រីកំរ។ ការនេសាទត្រីនាគ គឺអ្នកនេសាទប្រើ ទូកដងយកកូនរបស់វា នៅតាមបណ្តាអន្លង់ត្រី នៅចន្លោះខែ ឧសភា-មិថុនា ។ តាមរយៈការសិក្សា ដោយផ្ទាល់ ជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនេសាទត្រីនាគ បានឱ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកនេសាទមានតិចតួច នៅឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០០៨ មានតែ ៥នាក់ ប៉ុណ្ណោះ តែដោយសារបរិមាណ កូនត្រីថយចុះ នៅឆ្នាំ ២០០៩ អ្នកនេសាទមួយចំនួនបានបោះចោលការងារនេសាទនេះ នៅ សល់ ៣នាក់ និងឆ្នាំ២០១០ នៅសល់តែ២នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលជាអ្នកមានមុខរបរអាជីពនេសាទក្នុងតំបន់គំរោងនេះ ។




(Asian Bonytongue)

តារាង៤០: ការឆ្លងប្រមាណផលចាប់កូនត្រីនាគ សំរាប់ឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១០ តាមការសំរេចចិត្តនៃអ្នកនេសាទផ្ទាល់


ការប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំ	ចំនួនអ្នកនេសាទសរុប ក្នុង តំបន់អាង (នាក់)	បរិមាណផលចាប់កូនត្រីនាគមធ្យម (ក្បាល/ឆ្នាំ/ម្នាក់)	បរិមាណផលចាប់កូន ត្រីនាគសរុប(ក្បាល)
2006	5	80	400
2007	5	70	350
2008	3	55	165
2009	3	50	150
2010	2	20	40

៥.២.៦.៤ ប្រភេទត្រីដែលចាប់បាន នៅតំបន់គំរោង និងផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គំរោង


ប្រភេទត្រីដែលចាប់ដោយឧបករណ៍មង ប៉ោង និងសន្ទូចរនង ក្នុងតំបន់គំរោង ដែលក្រុមការងារបានសិក្សា នៅចន្លោះខែ កក្កដា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០នេះ ពីអ្នកនេសាទចំនួន ៥គ្រួសារ ។ ការសិក្សានេះ ក្រុមការងារបានរៀបចំជាតារាងសំរេចចិត្ត ដែល មាន ការសំរេចចិត្តនូវបរិមាណផលចាប់ត្រីនិងមានការបែងចែកចំនួននៃប្រភេទត្រីដែលចាប់បានផងដែរ ។ ការងារនេះអនុវត្តន៍ រយៈពេល៦ ខែក្នុងមួយខែ ០៣ថ្ងៃ ។ លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរតំបន់នេសាទ គឺស្ទឹងកំបាយ លើ (តំបន់១) និងស្ទឹងផ្នែកខាងក្រោម (តំបន់២) ដោយឧបករណ៍មង ប៉ោង និងសន្ទូច បានបង្ហាញថា ប្រភេទត្រីចាប់បាន សរុប ចំនួន១៩២ក្បាល មានចំនួន១៤ប្រភេទ ដែលបានចាប់បាន នៅតំបន់នេសាទទាំងពីរនេះ ក្នុងនោះ ប្រភេទត្រីទ្រនេល ចាប់បាន ចំនួន ៥១ក្បាល ស្មើនឹង២៧%, ត្រីអណ្តែង (ពីរប្រភេទ) ចំនួន ១៧ក្បាលស្មើនឹង ៩%, ត្រីខ្លីងចំនួន ១៩ក្បាលស្មើនឹង ១០% ត្រីក្រស (ពីរប្រភេទ) បានចំនួន១៧ក្បាល ស្មើនឹង៩%, ត្រីស្រកាក្តាមបានចំនួន១៤ក្បាល ស្មើនឹង៧%, ត្រីត្រណម បានចំនួន ៣១ក្បាល ស្មើនឹង១៦%, ត្រីខ្មៅបានចំនួន ៦ ក្បាលស្មើនឹង៣%, ត្រីខ្លាំង ១៤ក្បាល ស្មើនឹង៧%, កំរ ៦ក្បាល ស្មើនឹង ៣% បានចំនួន ១៩ក្បាល ស្មើនឹង១០%, ត្រីកញ្ចូងយងបានចំនួន ១១ក្បាលស្មើនឹង ៦% និងត្រីកន្ត្រប់ចំនួន ៦ក្បាល ស្មើនឹង ៣% ។ ដូច្នេះ ឃើញថា ប្រភេទត្រីដែលចាប់បាន ច្រើនជាងគេនៅតំបន់គំរោង គឺត្រីទ្រនេលស្មើនឹង ២៧,២៣% និងចាប់បានតិច ជាងគេ គឺត្រីកន្ត្រប់ ត្រីកំរ និងត្រីខ្មៅ ស្មើនឹង ៣% ។




ដូចគ្នាដែរ ការសិក្សានៅតំបន់នេសាទទី៣ ផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ទី២ ដល់ភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ដូចមានបង្ហាញក្នុងផែនទីលេខ ៥ ហើយលទ្ធផលដូចមានបង្ហាញក្នុងក្រាហ្វិក ខាងក្រោម



ការសិក្សានៅតំបន់នេសាទទី៤ នៅតាមដងព្រែកកំបោលផ្នែកកណ្តាល ដូចមានបង្ហាញក្នុងផែនទីលេខ៥ ហើយ លទ្ធផល ដូចមានបង្ហាញក្នុងក្រាហ្វិក ខាងក្រោម :



ការសិក្សានៅតំបន់នេសាទទី៥ នៅតាមដងព្រែកកំប៉ាយផ្នែកខាងក្រោមដូចមានបង្ហាញក្នុងផែនទីលេខ៥ ហើយលទ្ធផលដូចមានបង្ហាញក្នុងក្រាហ្វិកខាងក្រោម :



៣-១ ប្រភេទត្រី សំខាន់ៗ ក្នុងតំបន់តំរោង និងជុំវិញតំបន់តំរោង

តាមរយៈការសិក្សាដោយការចូលរួមវាយតម្លៃ របស់អ្នកនេសាទ និងមានភ្ជាប់ដោយរូបភាពត្រីផងនោះ បានបង្ហាញថា ដូចក្នុងតារាង ខាងក្រោម:

តារាង៤១: ប្រភេទត្រីសំខាន់ៗ ក្នុងស្ទឹងកំប៉ាឃៈ នៃតំបន់គំរោង

ល.រ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស	រដូវនេសាទ
1	ត្រីក្រស	<i>Osteochilus vittatus</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
2	ត្រីក្រស	<i>Osteochilus hasseltii</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
3	ត្រីទ្រនេលខ្មៅ	<i>Hemibagrus wyckioides</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
4	ត្រីទ្រនេល	<i>Hemibagrus filamentus</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
5	ត្រីខ្លាំងខ្មៅ	<i>Mastaembelus armatus</i>	Tiretrack eel / Zig-zag eel	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
6	ត្រីត្រណម	Non		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
7	ត្រីខ្មៅ ឬត្រីក្អែកភ្នំ	Non		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
8	ត្រីកន្ត្រប់	<i>Pristolepis fasciata</i>	Catopra	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
9	ត្រីខ្មាំង	<i>Hampala macrolepidota</i>	Hampala barb	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
10	ត្រីកំភ័រ	<i>Hampala dispar</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
11	ត្រីអណ្តែងទន់	<i>Clarias gariepinus</i>	Blackskin catfish	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
12	ត្រីអណ្តែងង៉ាង	<i>Clarias nieuhofii</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
13	ត្រីស្រកាត្តាម	<i>Cyclocheilichthys armatus</i>	Highfin barb	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
14	ត្រីកញ្ជ័យ	<i>Channa lucius</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
15	ត្រីនាគ	<i>Scleropages formosus</i>	Asian Bonytongue	ចាប់បានពីខែ ៤-៦

តារាង៤២: ប្រភេទត្រីសំខាន់ៗ ដែលមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ និងត្រីជីវភាព ក្នុងស្ទឹងកំប៉ាឃៈ មាន២៦ប្រភេទ

ល.រ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស	រដូវនេសាទ
1	ត្រីអណ្តាតឆ្អែ	<i>Brachius panoides</i>	Scaly whipray	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
2	ត្រីដូរអង្ក	<i>Gerres filamentosus</i>	Whipfin silver-biddy	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
3	ត្រីបោះត្រា	<i>Lutjanus russlii</i>	Russell's snapper	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
4	ត្រីតោ	<i>Monacanthus chinens</i>	Fan-bellied leatherjacket	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
5	ត្រីកន្ត្រប់ស្លឹកបាស	<i>Scatophagus argus</i>	Spotted scat	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
6	ត្រីព្រលួស	<i>Sillago ingenuua</i>	Bay sillago	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
7	ត្រីតូន	<i>Hilsa kelee</i>	Kelee shad	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
8	ត្រីតង្កត់			នេសាទបានគ្រប់រដូវ
9	ត្រីឆ្កែស	<i>Lates calcarifer</i>	Barramundi	ចាប់បានពីខែ ១-៧
10	ត្រីអាងកើយក្រហម	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Mangrove red snapper	ចាប់បានពីខែ ១-៧

11	ត្រីក្បក	<i>Moolgarda seheli</i>	Bluesport mullet	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
12	ត្រីចង្វា	<i>Opsarius koratensis</i>		នេសាទបានគ្រប់រដូវ
13	ត្រីកុក	<i>Hemiarus stormii</i>	Armoured sea catfish	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
14	ត្រីកន្ទុយដំរី			នេសាទបានគ្រប់រដូវ
15	ត្រីអណ្តែងប៉ូយ	<i>Plotosus canius</i>		ចាប់បានពីខែ ១-៧
16	ក្ដាមសេះ	<i>Portunus Pelagicus</i>	Flower Crab	ចាប់បានពីខែ ១-៧
17	ក្ដាមថ្ម	<i>Scylla Serrata</i>	Giant Mud Crab	ចាប់បានពីខែ ១-៧
18	ក្ដាមជ័រ	<i>Episesarma singaporense</i>	Singapore vinegar Crab	នេសាទនៅខែ៨-៩
19	ក្ដាមក្រញ៉ាំ			នេសាទបានគ្រប់រដូវ
20	បង្ការស			នេសាទនៅខែ១-៧
21	ត្រីឆ្មាត្រពើ	<i>Lycothrissa crocodilus</i>	Sabertooth thryssa	នេសាទនៅខែ១-៧
22	ត្រីផ្ទោង		needlefish	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
23	ត្រីផ្ទោង		halfbeak	នេសាទបានគ្រប់រដូវ
24	ត្រីកញ្ចក់ស្លា			នេសាទនៅខែ១-៧
25	ស្លឹកឫស្សី			នេសាទនៅខែ១-៧
26	ត្រីម្រេច			នេសាទបានគ្រប់រដូវ

តារាង៤៣: ប្រភេទត្រីធិតសាប សំខាន់ៗ ដែលមាននៅក្នុងទំនៀមកម្ម ចំនួន១៧ប្រភេទ

ល.រ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស	តំបន់ដែលរស់នៅ	រដូវនេសាទ
1	ត្រីស្លាត	<i>Notopterus notopterus</i>	Bronze featheback	ស្ទឹងកែវ និងផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គំរោង	រដូវវស្សា
2	ត្រីស្រកាត្តាម	<i>Cyclocheilichthys erpasson</i>		រស់នៅតំបន់គំរោង និងស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
3	ត្រីក្រស	<i>Osteochilus Vittatus</i>		នៅតំបន់គំរោង	រដូវវស្សា ពេលទឹកជំនន់ពីតំបន់ទឹកឈូ
4	ត្រីក្រស	<i>Osteochilus hasselti</i>		តំបន់គំរោង និងស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
5	ត្រីតាអោន	<i>Ompuk sp. Cf. eugeneiatus</i>		ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
6	ត្រីអាចម៍កុក	<i>Dangila spilopleura</i>		ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
7	ត្រីឆ្មាញ	<i>Macrognathus siamensis</i>		ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
8	ត្រីឆ្អិន	<i>Hypsibarbus lagleri</i>		ស្ទឹងកែវ និងផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គំរោង	រដូវវស្សា
9	ត្រីឆ្មាំង	<i>Hemibagrus nemurus</i>		ស្ទឹងកែវ និងផ្នែកខាងក្រោម	រដូវវស្សា

				តំបន់គំរោង	
10	ត្រីអណ្តែងរឹង	<i>Claria batrachus</i>		ស្ទឹងកែវ និងផ្នែកខាងក្រោម តំបន់គំរោង	រដូវវស្សា
11	ត្រីអណ្តែងទន់	<i>Claria macrocephalus</i>		ស្ទឹងកែវ និងផ្នែកខាងក្រោម តំបន់គំរោង	រដូវវស្សា
12	ត្រីកន្ត្រប់	<i>Pristolepis fasciata</i>		តំបន់គំរោង - ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
13	ត្រីស្លឹកប្លង់	<i>Oxygaster pointoni</i>		ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
14	ត្រីកញ្ចុះ	<i>Mystus multiradiatus</i>		ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
15	ត្រីផ្កាចា	<i>Cirrhinus jullieni</i>	<i>Osteochilus Simus</i>	ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
16	បង្កង	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>		ស្ទឹងកែវ	រដូវវស្សា
17	ត្រីទ្រទេស	<i>Hemibagrus filamentus</i>		ស្ទឹងកែវ និងផ្នែកខាងក្រោម តំបន់គំរោង	រដូវវស្សា


៣-២ អត្តសញ្ញាណ នៃប្រភេទត្រី ក្នុងតំបន់គំរោង

លទ្ធផលនៃការសិក្សាអត្តសញ្ញាណ នៃប្រភេទត្រី ដែលចាប់បាននៅស្ទឹងកំប៉ាយ (តំបន់គំរោង) ដោយក្រុមការងារ Sawac ដូចខាងក្រោម៖



ប្រភេទត្រីក្រស ៖ *Osteochilus vittatus*

គំរូត្រី៖ ១០ត្រី L = 150-195mm,
Lo = 130-170mm , D = 3/12
A=3/5 , P=1/13, V=1/8, L1=31-33



ប្រភេទត្រីក្រស (Osteochilus hasseltii)

គំរូត្រី៖ ៥ត្រី Lo = 120-165mm
D = 3/12-13 , A=3/5 , P=1/10-11
V=1/8 , L1=31-32

ទីជីវរបស់ត្រី ៖ - ត្រីក្រស *Osteochilus vittatus* នៅតាមអន្លង់ និងដងស្ទឹងកំប៉ាយ ។


- ត្រីក្រស *Osteochilus hasseltii* នៅតាមអន្លង់ និងដងស្ទឹងកំប៉ាយ ។

ទីតាំងនេសាទ៖ ស្ទឹងកំប៉ាយ (តំបន់គំរោង) និងព្រែកកំប៉ាយ និងស្ទឹងកែវ នៅរដូវទឹកជំនន់


ត្រីក្រស *Osteochilus vittatus* ជាប្រភេទត្រីស្ទឹងតូច រស់នៅស្រទាប់កណ្តាល តាមបណ្តោយដងខ្លួនរបស់វាមាន ឆ្នូតខ្លៅធំ កន្ទុយពណ៌ក្រហម មានឆ្នូតខ្លៅចំកណ្តាល ដងខ្លួនមានពណ៌លឿងក្រមៅ។ រដូវពងកូន នៅខែកក្កដា រហូតដល់ចុង ខែសីហា។ បរិមាណផលចាប់ត្រីក្រស *Osteochilus vittatus* ខ្ពស់ជាងប្រភេទត្រីផ្សេងទៀត ដែលមានប្រភពពីស្ទឹងកំប៉ាយ (តំបន់គំរោង) នៅពេលទឹកជំនន់ចុងខែកក្កដា និងសីហា រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅព្រែកកំប៉ាយ ជាពិសេសត្រង់ចំណុចមាត់ពាម ។ នៅ រដូវវស្សាពេលមានជំនន់ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ នេះ បរិមាណផលចាប់ត្រីក្រស *Osteochilus vittatus* នៅផ្នែកខាងក្រោម តំបន់គំរោង មានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង បើប្រៀបធៀបបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅគឺប្រមាណ ៨៨% ។ ការធ្វើចរាចរចុះទំលាក់ពង របស់វា មានទៅដល់ភូមិអន្លង់ម៉ាក់ប្រាង្គ ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ និងនៅផ្នែកខាងក្រោមព្រែកកំប៉ាយជាប់នឹងសមុទ្រ តែឆ្នាំ២០១០ នេះ ពុំឃើញចុះដល់ព្រែកកំប៉ាយ ផ្នែកខាងក្រោមនោះទេ ។

ចំពោះត្រីក្រស *Osteochilus hasseltii* តែតែងតែនេសាទបានវានៅផ្នែកខាងក្រោម តំបន់គំរោងជាមួយត្រីក្រស

Osteochilus Vittatus ផងដែរ នៅរដូវទឹកជំនន់ម្តងៗ តែមានបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ។



ប្រភេទត្រីទ្រនេលខ្មៅ



ប្រភេទត្រីទ្រនេល

គំរូត្រី: ១០ត្រី $L_0=270-290\text{mm}$, $D=1/7$,
 $A=10-11$, $P=1/11$, $V=6$


គំរូត្រី: ១០ត្រី $L_0=245-272\text{mm}$, $D=1/7$
 $A=10$, $P=1/7$, $V=7$

ទីជីវភាពរបស់ត្រីទ្រនេល : អន្លង់ និងតាមដងស្ទឹងកំបោល តំបន់គំរោង ។

ទីតាំងនេសាទត្រីទ្រនេល: ស្ទឹងកំបោល តំបន់គំរោង ប៉ែកខាងលើ ។

ត្រីទ្រនេល មានប្រភពនៅតាមអន្លង់ នៃស្ទឹងកំបោល វាមានក្បាលធំសំប៉ែត រង្វះមាត់ធំ ជាប្រភេទ ត្រីរស់នៅស្រទាប់ កណ្តាល និងបាត មានព្រួយពុកមាត់ និងព្រួយពុកចង្កាមួយគូ ។ ចំណីរបស់វា គឺកណ្តៀវ និងផ្លែឈើព្រៃ ។

រដូវពងកូនរបស់ត្រីទ្រនេលគឺចាប់ពីខែឧសភា រហូតដល់បំណាច់ខែសីហា ។ ការទំលាក់ពងនៅពេលមានទឹកជំនន់នៅរដូវ វស្សា ។ គេតែងចាប់វាបានច្រើននៅស្ទឹងកំបោល (តំបន់គំរោង) ដោយឧបករណ៍បោង សន្ទូច និងមង ។ មុនដំណាក់កាលសាងសង់ គំរោង ឆ្នាំ២០០៦ គេតែងចាប់បានវា នៅព្រែកកំបោលផងដែរ ជាពិសេសត្រង់ចំណុចមាត់ពាម ពីខែកក្កដា ដល់ខែធ្នូ រៀងរាល់ ឆ្នាំ ។



ប្រភេទត្រីត្រណម


ទីជីវភាពរបស់ត្រីត្រណម : អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំបោលនៃតំបន់គំរោង ។

ទីតាំងនេសាទត្រីត្រណម: ស្ទឹងកំបោល (តំបន់គំរោង) ។

គំរូត្រី: ១០ត្រី $L_0=170-210\text{mm}$, $D=3/8$, $A=3/5$, $P=1/11$, $V=1/8$, $L1=27$

ត្រីត្រណម មានសំបុរពណ៌លឿងប្រាក់ មានឆ្នុតត្រខ្មៅតូចៗ នៅតាមបណ្តោយដងខ្នង ។ រដូវពងកូននៅខែឧសភា រហូត ដល់បំណាច់ខែសីហា ។ គេតែងចាប់វាបានច្រើន នៅស្ទឹងកំបោលនៃតំបន់គំរោង ដោយឧបករណ៍មងក្រឡា ឬហ្មឺន ទៅ៥ហ្មឺន ។

មុនដំណាក់កាលសាងសង់គំរោងឆ្នាំ២០០៦ គេតែងចាប់បានវាខ្លះៗដែរ នៅព្រែកកំបោល ជាពិសេស ត្រង់ចំណុច មាត់ពាម នៅខែកក្កដា ដល់ខែសីហារៀងរាល់ឆ្នាំ តែក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គំរោងទ្រង់ទ្រាយធំឆ្នាំ២០១០នេះ អ្នកនេសាទ ពុំដែល ចាប់វាបាន នោះទេ ។




ប្រភេទត្រីខ្លីងខ្មៅ

ទីជីវរបស់ត្រីខ្លាំងខ្មៅ : អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំចាយនៃតំបន់គំរោង។

ទីតាំងនេសាទត្រីខ្លាំងខ្មៅ: ស្ទឹងកំចាយ (តំបន់គំរោង) ។

គំរូត្រី: ១០ត្រី $L_0=175-410\text{mm}$, $D=XXXV-XXXVIII/80-85$, $A=III/80$, $P=30$

ត្រីខ្លាំងស្ទឹងកំចាយនេះ មានសំបុរធ្លោតក្រមើមានរាងមូលវែង វាជាប្រភេទត្រីរស់នៅទឹកស្រទាប់បាត ដែលមានល្បាយខ្សាច់ ក្បែរថ្ម ។ រដូវពងកូន នៅខែឧសភា រហូតដល់ខែសីហា។ គេតែងចាប់វាបានច្រើននៅស្ទឹងកំចាយ ដោយឧបករណ៍ប៉ោង និងសន្ទូចរង។ មុនដំណាក់កាលសាងសង់គំរោង ឆ្នាំ២០០៦ គេតែងចាប់បានវាខ្លះៗដែរ នៅព្រែកកំចាយ ជាពិសេស ត្រង់ចំណុចមាត់ពាម នៅខែកក្កដាដល់ខែវិច្ឆិការៀងរាល់ឆ្នាំ តែក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គំរោងឆ្នាំ២០១០នេះ អ្នកនេសាទពុំដែលចាប់វាបាននោះទេ ។




ប្រភេទត្រីខ្លាំង

ទីជីវរបស់ត្រីខ្លាំង : អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំចាយនៃតំបន់គំរោង។


ទីតាំងនេសាទ : ស្ទឹងកំចាយ (តំបន់គំរោង ប៉ែកខាងលើ) ។

គំរូត្រី: ១០ត្រី $L_0=175-210\text{mm}$, $D=3/10$, $P=1/18-19$, $A=3/5$, $V=1/8-9$, $L1=22$

រដូវពងកូន នៅខែកក្កដា រហូតដល់ សីហា។ គេតែងចាប់វាបានច្រើន នៅស្ទឹងកំចាយ នៃតំបន់គំរោងប៉ែកខាងលើ តែវាក៏ចុះមកទំលាក់ពងនៅព្រែកកំចាយផងដែរ ជាពិសេស ត្រង់ចំណុចមាត់ពាម នៅពេលទឹកជំនន់ ខែកក្កដា និងសីហា រៀងរាល់ឆ្នាំ ជាមួយត្រីក្រស តែមានបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ គេតែងចាប់វាបាន ដោយឧបករណ៍មងក្រឡាហ៊ុន ទៅ៥ហ៊ុន នៅស្ទឹងកំចាយ គ្រប់រដូវ។ នៅឆ្នាំ២០១០នៅផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គំរោងព្រែកកំចាយនេះ អ្នកនេសាទមិនដែលចាប់បាន ដូចបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេ ។



ប្រភេទត្រីខ្លាំង



ប្រភេទត្រីខ្លាំង


គំរូត្រី: ៥ត្រី $L_0=75-90\text{mm}$, $D=3/8$, $A=3/5$, $P=1/14$, $V=1/8$, $L1=24-25$

គំរូត្រី: ៥ត្រី $L_0=155-170\text{mm}$, $D=3/8$, $A=3/5$, $P=1/14$, $V=1/8$, $L1=27$

ទីជីវរបស់ ត្រីខ្លាំង: អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំចាយនៃតំបន់គំរោង។

ទីតាំងចាប់បានត្រីខ្លាំង: នៅស្ទឹងកំចាយក្នុងតំបន់គំរោង និងក្រោមតំបន់គំរោង (ក្រោមទំនប់ទី២) ។

រដូវពងកូន នៅខែឧសភា រហូតដល់សីហា។ គេតែងចាប់វាបានច្រើននៅស្ទឹងកំចាយ (តំបន់គំរោង) និងផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គំរោងផងដែរ ដោយឧបករណ៍មងក្រឡា ៣ ទៅ៥ហ៊ុន។



ប្រភេទត្រីកំភរ / ខ្មាន់

ទីជីវភារបស់ត្រីកំភរ: អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំបោលនៃតំបន់គំរោង ។

ទីតាំងចាប់បានត្រីខ្មាន់: នៅស្ទឹងកំបោលក្នុងតំបន់គំរោង និងក្រោមតំបន់គំរោង (ក្រោមទំនប់ទី២) ។

គំរូត្រី: ១០ត្រី $L_o=210-320\text{mm}$, $D= 3/ 8$, $A=3/5$, $P=1/14$, $V=1/8$, $L_1= 25$

រដូវពងកូនរបស់ត្រីកំភរ ពីខែឧសភា រហូតដល់សីហា ។ គេតែងចាប់វាបានច្រើននៅស្ទឹងកំបោល(តំបន់គំរោង) និង ផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គំរោង (ព្រែកកំបោល) ផងដែរ ដោយឧបករណ៍មងក្រឡា៤ ទៅ៧ហ្វុន ។



រូបភាព ត្រីកន្ត្រប់

គំរូត្រី: ៥ត្រី $L_o = 110-120\text{mm}$, $D= X \text{ III}/12$, $A=\text{III}/7$, $P=12$, $V=\text{I}/5$, $L_1=24 +3=27$

ទីជីវភារបស់ត្រីកន្ត្រប់: អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំបោលនៃតំបន់គំរោង ។

ទីតាំងនេសាទត្រីកន្ត្រប់: នៅស្ទឹងកំបោលក្នុងតំបន់គំរោង ។



រូបភាព ត្រីអណ្តែងទន់ *Clarias gariepinus*(Blackskin catfish)




ត្រីអណ្តែងង៉ាង *Clarias nieuhofi*

គំរូត្រី: ៥ត្រី $L_o = 170-210\text{mm}$, $D= 73$,
 $A=45-46$, $P=\text{I}/9$, $V=7$


ទីជីវភារបស់ត្រីអណ្តែងទន់ *Clarias gariepinus* និងត្រីអណ្តែងង៉ាង *Clarias nieuhofi* : អន្លង់និងដងស្ទឹងកំបោលនៃតំបន់គំរោង ។

ទីតាំងនេសាទ: នៅស្ទឹងកំបោលក្នុងតំបន់គំរោង ។



រូបភាព ត្រីជញ្ជូនជ័យ *Ophiocephalus lucius*

គំរូត្រី: ៥ត្រី $L_o = 170-210\text{mm}$, $D= 38-40$,



រូបភាព ត្រីស្រកាក្តាម

គំរូត្រី: ៥ត្រី $L_o = 70-120 \text{ mm}$

$A=28, P=18, L1= 19+5+41=65$

ទីជម្រករបស់ត្រីជញ្ជូនជ័យ និងត្រីស្រកាក្តាម : អន្លង់ និងដងស្ទឹងកំប៉ាយនៃតំបន់គំរោង ។

ទីតាំងនេសាទ: នៅស្ទឹងកំប៉ាយក្នុងតំបន់គំរោង ។

៥.២.៧ សន្និដ្ឋាន

ក្រោយពីការសិក្សា អាចសន្និដ្ឋាន ដូចខាងក្រោម :



- បរិមាណផលចាប់សរុបឆ្នាំ២០០៦ មានចំនួន ៥១.៤៧៦ គ.ក្រ ក្នុងនោះ អ្នកនេសាទអាជីពក្នុងព្រែកកំប៉ាយ ចំនួន ១០១គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិចំនួន៨ ទទួលបានទិន្នផលចាប់សរុប ៣០.៦១១ គក្រ/ឆ្នាំ (ផលចាប់មធ្យម ៣០៣ គ.ក្រ/គ្រួសារ/ឆ្នាំ) អ្នកនេសាទត្រីពេលទឹកជំនន់ពីតំបន់គំរោងសរុប២២១គ្រួសារ(៧៤គ្រួសារជាអ្នកនេសាទអាជីព) ទទួលបានទិន្នផលត្រីដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោងសរុប ១៥.៤៦៤ គ.ក្រ/រដូវទឹកជំនន់ (ផលចាប់មធ្យម ៦៩.៩៧ គ.ក្រ /គ្រួសារ/រដូវទឹកជំនន់) អ្នកនេសាទក្នុងអាងទឹកនៃតំបន់គំរោងសរុប០៥គ្រួសារ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ នេសាទ ៣ ប្រភេទ /គ្រួសារ ទទួលបានទិន្នផលសរុបចំនួន១០.៥៧៩គ.ក្រ (ផលចាប់មធ្យម ២.១១៦គ.ក្រ/គ្រួសារ) ។
- ការប៉ាន់ប្រមាណបរិមាណផលចាប់សរុបនៅឆ្នាំ២០១០ មានចំនួន ២២.៦៧៤ គ.ក្រ ក្នុងនោះ អ្នកនេសាទអាជីពក្នុង ព្រែកកំប៉ាយ ចំនួន ៥៥ គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិ ចំនួន៨ ទទួលបានទិន្នផលចាប់សរុប១៥.៧៨២ គក្រ/ឆ្នាំ (ផលចាប់ មធ្យម២៩៧គ.ក្រ/គ្រួសារ/ឆ្នាំ) អ្នកនេសាទត្រីពេលទឹកជំនន់ពីតំបន់គំរោង សរុប ១២៦ គ្រួសារ (៤៥គ្រួសារ ជាអ្នក នេសាទអាជីព) ទទួលបានទិន្នផលសរុប៧៩១គ.ក្រ/ឆ្នាំ (ផលចាប់មធ្យម ៦.២៨ គ.ក្រ/ គ្រួសារ/រដូវទឹកជំនន់) អ្នកនេសាទក្នុងអាងទឹក នៃតំបន់គំរោងសរុប០៥គ្រួសារប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ៣ប្រភេទ/គ្រួសារ ទទួលបាន ទិន្នផល សរុបចំនួន ៦.៣៨៤គ.ក្រ (ផលចាប់មធ្យម ១.២៧៧ គ.ក្រ/ឆ្នាំ /គ្រួសារ) ។
- បរិមាណផលចាប់ត្រីដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោង នៅតាមព្រែកកំប៉ាយ ក្នុងឆ្នាំ២០១០នេះ មានការថយចុះរហូត ដល់៩៥ភាគរយ គឺស្មើនឹង៥ភាគរយ នៃបរិមាណផលចាប់ត្រីសរុបចំនួន ១៥.៤៦៤គ.ក្រ/រដូវទឹកជំនន់ នៅឆ្នាំ២០០៦ ប៉ុណ្ណោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ចំនួនគ្រួសារនេសាទត្រី ដែលមានប្រភពពីតំបន់គំរោង ក៏មានការថយចុះផងដែរ គឺស្មើនឹង ចំនួន ៥៧ភាគរយ នៃចំនួនសរុប ២២១គ្រួសារ នៅឆ្នាំ២០០៦ ។
- បរិមាណផលចាប់ត្រី ដែលមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ និងត្រីទឹកសាប ពីតំបន់ផ្សេងៗ ក្នុងព្រែកកំប៉ាយនៅឆ្នាំ២០១០នេះ មានចំនួនថយចុះ៤៤,៧៥ភាគរយ គឺស្មើ៥៥,២៥ភាគរយ នៃចំនួនសរុប ២៥.៤៣៣គ.ក្រ (៣០.៦១១-៥១៧៨ = ២៥.៤៣៣គ.ក្រ) នៅឆ្នាំ២០០៦ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឆ្នាំ២០១០នេះ ចំនួនគ្រួសារនេសាទត្រី ដែលមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ និងត្រីទឹកសាបពីតំបន់ផ្សេងៗនៅព្រែកកំប៉ាយ ដែលជាអ្នកនេសាទអាជីព ក៏មានការថយចុះផងដែរ គឺស្មើនឹង ៥៨ ភាគរយ នៃចំនួនសរុប១០១គ្រួសារ នៅឆ្នាំ២០០៦ ។
- បរិមាណផលចាប់ត្រីនៅស្ទឹងកំប៉ាយ ក្នុងតំបន់គំរោង នៅឆ្នាំ២០១០នេះ មានការថយចុះប្រមាណ៤០ភាគរយ គឺ ស្មើនឹង ៦០ភាគរយនៃបរិមាណផលចាប់សរុបចំនួន ១០.៥៧៩ គ.ក្រ នៅឆ្នាំ២០០៦ ។ ចំនួនអ្នកនេសាទ ពុំមាន ការកើនឡើង ឬថយចុះ នោះទេ ។
- ត្រីកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់មានប្រភេទត្រីនាគ ដែលគេតែងតែចាប់កូនរបស់វា មកលក់ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០នេះ ចាប់បាន ត្រីមតែ ៤០ក្បាល ប៉ុណ្ណោះ គឺស្មើនឹង ១០ភាគរយ នៃផលចាប់សរុប ៤០០ក្បាល នៅឆ្នាំ២០០៦ ។

- ទិន្នផលនេសាទប្រភេទត្រី ដែលមានប្រភពពីតំបន់ឆ្នេរ គិតពីខែមករា ដល់បំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ នេះ មានការថយចុះ៥១ភាគរយ គឺស្មើនឹង៤៤ភាគរយ នៃទិន្នផលសរុប ១៤.៥៨៩ត.ក្រ នៅឆ្នាំ២០០៦ ដោយសារ គឺធនធានផលផលតំបន់ឆ្នេរថយចុះ ការអភិវឌ្ឍន៍តាមតំបន់ឆ្នេរ ការបាត់បង់ព្រៃកោងកាង គឺពុំមែនជាការបង្ក ដោយសារការសាងសង់គម្រោងវារីអគ្គិសនីកំបោម ទាំងស្រុងនោះទេ ។
- ទិន្នផលនេសាទត្រី នៅក្នុងស្ទឹងកំបោម ក្នុងតំបន់គម្រោងមានការថយចុះ ប្រមាណ ៤០ភាគរយ គឺស្មើនឹង ៦០ភាគរយ នៃទិន្នផលនេសាទសរុប ១០.៥៧៩ត.ក្រ នៅឆ្នាំ២០០៦ ដោយសារ ការប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រី គ្រឿងផ្ទុះ បរិមាណទឹកក្នុងអាងមានបរិមាណតិច ជាងបណ្តាឆ្នាំកន្លងទៅ ការប្រែប្រួលបរិស្ថានរូបសាស្ត្រ និងបរិស្ថានធនធានព្រៃឈើ ។
- គ្រួសារនេសាទនៅផ្នែកខាងក្រោមតំបន់គម្រោង ក្នុងភូមិជាប់មាត់ព្រែកកំបោមចំនួន៨ ត្រូវបោះបង់ចោល ការងារនេសាទមានចំនួន ១៣៧គ្រួសារ ក្នុងនោះ អ្នកប្រកបរបរនេសាទបន្ទាប់បន្សំ នៅពេលទឹកជំនន់ (នេសាទ ត្រីក្រស) មានចំនួន៥៥គ្រួសារ អ្នកប្រកបរបរនេសាទអាជីពនៅតាមព្រែកកំបោម និងដៃស្ទឹងកែវ មាន ចំនួន៤២គ្រួសារ ។

៥.៣ ស្ថានភាពបរិស្ថានសង្គមនៅក្នុងតំបន់គម្រោង

៥.៣.១ សេចក្តីផ្តើម

ស្រុកទឹកឈូមានទីតាំងនៅប៉ែកខាងកើតក្រុងកំពត (ទីរួមខេត្តកំពត)មានចម្ងាយ៦គ.មមាន ផ្លូវជាតិ២ខ្សែសំខាន់ឆ្លងកាត់ ភូមិសាស្ត្រស្រុកគឺ៖ ផ្លូវជាតិលេខ ៣ និងផ្លូវជាតិលេខ៣៣ ហើយនិងផ្លូវថ្នល់ ១ខ្សែឆ្លងកាត់ពីភ្នំពេញ ទៅខេត្តព្រះសីហនុ។ ស្រុកទឹកឈូមានអំណោយផលធនធានធម្មជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យកសិកម្ម,ទេសចរណ៍ជាពិសេស លើវិស័យឧស្សាហកម្ម (វារីអគ្គិសនី)។ ស្រុកទឹកឈូមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងស្រុកឈូកខេត្តកំពត និង ស្រុកកំពង់សិលា ខេត្តព្រះសីហនុ, ខាងកើតទល់នឹងស្រុកដងទង់ខេត្តកំពត និងស្រុកដំណាក់ចង្កើរខេត្តកែប, ខាងត្បូង ទល់នឹងដែនសមុទ្រ កម្ពុជា-វៀតណាម, ខាងលិចទល់នឹងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុ។ ស្រុកទឹកឈូមាន១៦ឃុំ ចែកចេញជា ៦៦ភូមិផ្នែកតាមការ ស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋមានទី១ ឆ្នាំ ២០១០។ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុង ស្រុកទឹកឈូមាន ២០៩៤៣គ្រួសារ មានមនុស្ស សរុប ១០៥០៦៩នាក់ ស្រី៥៤៨៨៦ នាក់ ក្នុងនោះអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង សរុប ៦១៨៥០ ស្រី ៣២៣០៨ មានជនជាតិខ្មែរ ៩៩៩៩៩នាក់ ស្រី ៥៥៥៤៩នាក់ អាយុ ១៨ឆ្នាំឡើងសរុប ៧២៥២ នាក់ ស្រី ៣៧៤៥នាក់ ជនជាតិវៀតណាមមាន ១១គ្រួសារ មនុស្សសរុបចំនួន ៧០នាក់ ស្រី ៣៥នាក់ អាយុ ១៨ឆ្នាំឡើង មានចំនួន ៣២នាក់ស្រី១៦នាក់។

ទីតាំងភូមិសាស្ត្រគម្រោងវារីអគ្គិសនីកំបោមស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋបាលរបស់ស្រុកទឹកឈូ និងក្រុងកំពតខេត្តកំពត ហើយនិងដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិត្របូកគោផងដែរ ។

១- ស្រុកទឹកឈូមាន ៤ឃុំ៖

- ឃុំម៉ាក់ប្រាងមាន ៣ ភូមិ : ភូមិស្ទឹងព្រំ,និងភូមិមាត់ពាម, ភូមិបត់ក្បាលដី ។
- ឃុំកំពង់ត្រែងមាន ៣ភូមិ : ភូមិម៉ាក់ប្រាង,ភូមិអណ្តូងដីម៉ឺន, ភូមិកំពង់ក្រុង,កំពង់ត្រែង,ភូមិព្រៃត្នោត ។
- ឃុំព្រៃឃ្មុំ៖ មាន ១ភូមិ : ភូមិព្រៃឃ្មុំ (ប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ផ្លូវនិងបង្គោល) ។
- ឃុំព្រៃថ្លង៖ មាន ១ភូមិ៖ ភូមិទ្វារថ្មី (ប៉ះពាល់លើទីតាំងយកថ្មដើម្បី សាងសង់ទំនប់)

២- ក្រុងកំពតមាន ១ ឃុំ៖

- ឃុំអណ្តូងខ្មែរ មាន ២ភូមិ : ភូមិអូរតូច,ទីខាងជើង(ប៉ះពាល់លើមុខរបរអនុផលព្រៃឈើ)

៥.៣.២ អំពីប្រជាជន

ខេត្តកំពតចែកចេញជា ០១ក្រុង និង ០៧ ស្រុកមានសង្កាត់ចំនួន០៥ ឃុំចំនួន ៨៧ និងភូមិចំនួន ៤៨២។ ខេត្តកំពត មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ខេត្តតាកែវ, ខាងលិចជាប់ក្រុងព្រះសីហនុ និងកោះកុង, ខាងជើងជាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តាកែវ និង កោះកុង, ហើយនិងខាងត្បូងជាប់ខេត្តកែប និងឈូងសមុទ្រថៃ, ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបក្នុងខេត្ត កំពតឆ្នាំ ២០០៩ គឺប្រមាណ ៦១៥.៩៤៥ នាក់, ស្រី ៣១៨.៨១៥ នាក់។ ចំនួនគ្រួសារ មាន ១២៧.៧៣៦គ្រួសារ . អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ៣៧៩.៥៤៥នាក់,ស្រី១៩៦.៧០៦នាក់ (យោងតាមរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០០៩ទិសដៅឆ្នាំ២០១០របស់សាលាខេត្តកំពត)។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកំលាំងពលកម្មមានអាយុ២០ឆ្នាំដល់៦៤ឆ្នាំមានប្រមាណ២៧៧.១៤៩នាក់(៤៣,៧៣%) ដង់ស៊ីតេប្រជាជនមានប្រហែល ១៣០នាក់/គម ២ ។

៥.៣.២.១ អំបូរជនជាតិ

យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារSAWACបានអោយដឹងថានៅក្នុង/ក្បែរតំបន់គម្រោងតំបន់គម្រោងនេះ មានអំបូរជនជាតិដូចជា ជនជាតិខ្មែរ,ឥស្លាម,ចិន,វៀតណាម,ភូមី, និងបារាំង។ ដូចមានចែងក្នុងតារាង លេខ៤៤ខាង ក្រោម។

តារាងលេខ៤៤ អំបូរជនជាតិដែលរស់នៅក្នុង/ក្បែរតំបន់គម្រោងសិក្សាថ្ងៃទី ១០មិថុនា ឆ្នាំ ៣១ ធ្នូ ២០១០

១ ឃុំម៉ាករោង					
ជនជាតិ	ចំ.គ្រួសារសរុប	ចំ.មនុស្ស	១៨ ឆ្នាំឡើង	ស្រី ១៨ឆ្នាំឡើង	ផ្សេងៗ
ខ្មែរ	1004	4984	3188	1617	
ឥស្លាម	5	32	15	6	
សរុប	1009	5016	3203	1623	
២ ឃុំកំពង់ត្រែង					
ជនជាតិ	ចំ.គ្រួសារសរុប	ចំ.មនុស្ស	១៨ ឆ្នាំឡើង	ស្រី ១៨ឆ្នាំឡើង	ផ្សេងៗ
ខ្មែរ	909	4682	2931	1510	
ឥស្លាម	478	2041	1363	725	
ចិន	2	2	2	2	
បារាំង	1	1	1	1	
ភូមី	1	1	1	1	
សរុប	1391	6727	4298	2239	
៣ សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ					
ជនជាតិ	ចំ.គ្រួសារសរុប	ចំ.មនុស្ស	១៨ ឆ្នាំឡើង	ស្រី ១៨ឆ្នាំឡើង	ផ្សេងៗ
ខ្មែរ	1299	6875	5241	2716	
ឥស្លាម	467	2028	1549	918	
ចិន	210	1179	817	463	
វៀតណាម	13	52	47	23	
សរុប	1989	10134	7654	4120	
៤ ឃុំកែវ					
ជនជាតិ	ចំ.គ្រួសារសរុប	ចំ.មនុស្ស	១៨ ឆ្នាំឡើង	ស្រី ១៨ឆ្នាំឡើង	ផ្សេងៗ
ខ្មែរ	1424	6689	4200	2276	
ឥស្លាម	104	455	303	152	
សរុប	1528	7144	4503	2428	

យោងតាមការសិក្សានៅទីវាលរបស់ក្រុមការងារបានបង្ហាញអោយឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ គំរោង សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវារីអគ្គិសនី កំបោលនេះចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ៖ ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដោយប្រយោល និង ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ។ ចំពោះក្រុមប៉ះពាល់ដោយប្រយោលគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្តោយ ព្រែក ទឹកឈូ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់ទី២ ។ ដោយហេតុនេះគំរោងមានក្រុមជាច្រើនជាពិសេសអ្នក សំរាប់រស់នៅ ពីតំបន់អាងនឹងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អ ។ ក្រុមទាំងនេះគឺមានបង្ហាញ នៅតារាង៤៥ខាងក្រោម៖

តារាងលេខ៤៥ ប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងតំបន់ដែលប៉ះពាល់ដោយសារគំរោង សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣១ ធ្នូ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ចំ.ប្រ.រដ្ឋ សរុបក្នុងភូមិ			ចំ.មនុស្ស/ គ្រួ	ចំ.អ្នក ប៉ះពាល់	ចំ.ប្រ.ដែលរស់.	ចំ.មនុស្ស	សំគាល់
1	មាត់ពាម	287	1432	436	4.99	33	27	136	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ
2	អណ្តូងដីម៉ឺន	353	1794	564	5.08	20	20	102	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំកំពង់ត្រែង
3	ម៉ាក់ប្រាង្គ	399	1840	659	4.61	13	13	65	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំកំពង់ត្រែង
4	កំពង់ក្រុង	212	863	311	4.07	4	3	17	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំកំពង់ត្រែង
5	ស្មៅប្រាំពីរ	627	3085	968	4.92	33	33	157	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ
6	ព្រៃឃ្មុំ	395	1961	637	4.96	15	13	73	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំព្រៃឃ្មុំ
7	ទ្វារថ្មី	435	2201	655	5.06	14	14	62	ស្រុកទឹកឈូ ឃុំព្រៃថ្មង
8	អូរតូច	375	1920	1533	5.12	24	24	118	ក្រុងកំពត ឃុំអណ្តូងខ្មែរ
9	ទីខាងជើង	430	2379	1753	5.53	7	7	39	ក្រុងកំពត ឃុំអណ្តូងខ្មែរ
សរុប៖		3513	17475	7516	4.97	163 គ្រួសារ	154 គ្រួសារ	769 នាក់	

៥.៣.២.២ ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំរោង និងការទទួលសំណងក្នុងដំណាក់កាលទី១

ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា៥៨គ្រួសារដែលមានផ្ទៃដីសរុប ៣០ ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមាត់ពាម និងភូមិស្មៅប្រាំពីរ. នៃឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចេញថ្លៃ សំណងទូទាត់រួចរាល់ហើយ ។ ក្នុងនោះដីគ្មានដំណាំ១ហិកតា មានតម្លៃស្មើ ៥០០០០ ដុល្លារអាមេរិក(ប្រាំម៉ឺនដុល្លារ), ដីមានដំណាំ ១ហិកតា ១០០០០០ដុល្លារអាមេរិក (ដប់ម៉ឺនដុល្លារ អាមេរិក) ។ នៅក្នុងទំនប់ទី២ មានដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា២ គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្មៅប្រាំពីរ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជួលដីពីពួក គេដោយក្នុង ១ហិកតា មានតម្លៃ ប្រមាណជា៥០០០ដុល្លារអាមេរិក(ប្រាំពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ។

ចំណែកឯនៅក្នុងទីតាំងយកថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្នុងភូមិទ្វារថ្មី,ឃុំព្រៃថ្មង, ស្រុកទឹកឈូវិញ មានគ្រួសារប្រមាណ ជា ១០០គ្រួសារ ដែលមានដីប្រហែលជា ២៧ ហិកតា ក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់លើដីដែលប៉ះពាល់ដោយធ្វើការសហការ ជា អាជ្ញាធរខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ។ ចំពោះគ្រួសារសរុបដែលប៉ះពាល់ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់គិតចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ៣ដល់ ទំនប់ទី១ មានប្រមាណជា ៣៨គ្រួសារដែលមានដីសរុបប្រមាណជា ១២ ហិកតា ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមាត់ពាម, កំពង់ក្រុង .ទ្វារថ្មី,ព្រៃឃ្មុំ ក្នុង ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ, កំពង់ត្រែង,ព្រៃឃ្មុំ, និង១០៤គ្រួសារ ដែលមានដីប្រមាណជា ១១ ហិកតាចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ ៣ដល់ កន្លែងយកថ្មដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទ្វារថ្មី ឃុំព្រៃថ្មងក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់សំណងលើ ផលប៉ះពាល់រួចរាល់ដែរ ។ មើលតារាងលេខ៤៦, ៤៧ក,៤៧ខ,៤៧គ ខាងក្រោម ។

[illegible]

ສາກວນອ: ໔໕໐: ແຮງເຄື່ອນຍ້າຍສູງຂຶ້ນໃນການຝຶກສຳຮູ້ ແລະ ການສຶກສາ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ວຽກ ແລະ ສູ່ການສຶກສາຕໍ່ໜ້າ

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

C ខ្សែចង្រង ២៣០គតិ																					
បង្គោលស្ទឹង ២៣០គតិ	0.8	50000	22	5	3	មាត់ពាម. អណ្តូងជីមីន. ម៉ាក់ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង. ព្រៃឃ្មុំ	ម៉ាក់ប្រាង្គ កំពង់ក្រុង ព្រៃឃ្មុំ	3	100000	27	5	3	មាត់ពាម. អណ្តូងជីមីន.ម៉ាក់ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង. ព្រៃឃ្មុំ	ម៉ាក់ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង ព្រៃឃ្មុំ	5000	2	8	5	3	មាត់ពាម. អណ្តូងជីមីន. ម៉ាក់ប្រាង្គ.កំពង់ក្រុង. ព្រៃឃ្មុំ	ម៉ាក់ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង ព្រៃឃ្មុំ
ដូរចូលទៅកាន់បង្គោល ក្នុង	1	5000	13	5	3	មាត់ពាម. អណ្តូងជីមីនម៉ាក់ ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង. ព្រៃឃ្មុំ	ម៉ាក់ប្រាង្គ កំពង់ក្រុង ព្រៃឃ្មុំ	1.75	100000	22	5	3	មាត់ពាម. អណ្តូងជីមីន.ម៉ាក់ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង. ព្រៃឃ្មុំ	ម៉ាក់ប្រាង្គ កំពង់ក្រុង ព្រៃឃ្មុំ	5000	1	8	5	3	មាត់ពាម. អណ្តូង ជីមីន. ម៉ាក់ប្រាង្គ. កំពង់ក្រុង. ព្រៃឃ្មុំ	ម៉ាក់ប្រាង្គ កំពង់ក្រុង ព្រៃឃ្មុំ

សំគាល់: ប្រភេទប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ រុក្ខាប្រមាញ់ កំពង់ ហើយ ហើយប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ខ្លះ មិន ទាន់ ទេ

តារាងលេខ៤៧: តម្លៃសំណងប្រាក់ប្រកបរបរកសិកម្ម

Environmental resources	Impacted field	Type of impact	Proposed mitigation		Budget (USD)	Remarks
			Design to minimize needs Land acquisition	Implement Suitable Compensation Plan including payment, recruit and transfer temporal living land		
Socio-economic Resources	SOCIAL	Impact on land use at construction sites	Adjust route to minimize effects on valuable Land acquisition	In the result of 10KM trans mission line from powerhouse to the Grid.	100,000	Consulting and design fees
		Impact on Income source of Villages for forest product	Compensation for loss of income		500,000	Compensate to stakeholders/villagers for
		Impact on water supply source of Kampot Town	Discuss with related department of government to change the location of intake station to Reservoir2		50,000	Consulting fees
Socio-economic Resources	SOCIAL	Impact on Income source of Villages for tourism in Tuekchhou	Compensation for loss		500,000	Compensate to downstream stakeholders/villagers
		Sub-Total (1)			1,250,000 USD	
		Type of impact				
Environmental resources	Impacted field	Impact on land use	Proposed mitigation	Early compensation and land acquisition procedures	Budget (USD)	Remarks
Socio-economic Resources	SOCIAL	Alteration of water quality	Alternative water supply		3,500,000	(Fund to be used)
Socio-economic Resources	SOCIAL	Loss of forest product resources	Find near suitable place to make them continue their career, recruit some people		500,000	Arrangement will be various accordingly
		Sub-Total (2)			400,000	
		EMP Budget in Total=(Part 1+Part 2)= Sub-Total (1) +Sub-Total (2) =			6,500,000 USD	
					5,650,000 USD	

សំគាល់: ប្រភេទប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ រុក្ខាប្រមាញ់ កំពង់ ហើយ ហើយប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ខ្លះ មិន ទាន់ ទេ

៥.៣.៣ ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីគម្រោង

យោងតាមការអង្កេតរបស់ក្រុមការងារ SAWAC បានរកឃើញថាក្នុងតំបន់គម្រោងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ចំនួនសរុប ៧៦៩នាក់ (មាននៅក្នុងតារាងលេខ ៥០ខាងក្រោម) ត្រូវជា១៥៤ គ្រួសារ ក្នុងនោះប៉ះពាល់លើមុខរបរដូចជា អ្នកដែលរកអនុផលព្រៃឈើ, អាជីវករលក់ដូរក្នុងរមណីយដ្ឋានទឹកឈូ, និងមួយផ្នែកទៀតប៉ះពាល់លើដីស្រែចំការ, ដំណាំ ដោយ សារការសាងសង់បង្គោលភ្លើង ២៣០គ.វ៉. និងប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី ដោយសារការខូចជីកកាយនិងប្រើគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីយក ថ្មសាង សង់ទំនប់ ។

៥.៣.៣.១ ប្រជាជនដែលទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិការ និងប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមផ្លូវចូលទៅឧទ្យានជាតិបូកគោ"ទឹកឈូ"មួយសប្តាហ៍ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអត្ត សញ្ញាចំនួនមនុស្សដែលបានចូលទៅក្នុងឧទ្យានជាតិ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយ។ ប្រហែលជា ១០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានចូលតំបន់អាងដើម្បីរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាបោចវល្លិ, កាប់ផ្តៅ, រើសផ្លែខ្ទះ, កាប់ឈើយកទៅលក់យក ប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ មានសកម្មភាពខ្លះទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងទៅ និងអាជីវកម្មព្រៃឈើដូចជាមានមុខរបរធ្វើកន្ត្រកធ្វើអំពី ឫស្សី រឺ ល្អ ។ លទ្ធផលសិក្សាដូចមានបង្ហាញក្នុងតារាង ៤៨ខាងក្រោម

តារាងលេខ ៤៨: ការរាប់រាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឧទ្យានជាតិបូកគោ, តុលា ២០១០

ថ្ងៃក	ថ្ងៃទី ១	ថ្ងៃទី ២	ថ្ងៃទី ៣	ថ្ងៃទី ៤
ឫស្សី	៣៥	៣៧	៣៣	៣០
ផ្តៅ	៦	៨	១០	៧
អុស	៣៦	៤២	៣០	២៥
ផ្លែឈើ	២១	៣	១០	៥
ដាក់អន្ទាក់ រឹបបាញ់	២	០	០	១
សរុប	១០០	៩០	៨៣	៦៨

សំគាល់: សិក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី: ២០ ដល់ ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១០ ។

៥.៣.៣.២ ការគ្រប់គ្រងឫស្សី, ផ្តៅ

តាមការសិក្សានិងអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅតាមផ្លូវចូលទៅតំបន់ទេសចរណ៍ទឹកឈូយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ជា ៧០ទៅ ៨០នាក់ដែលធ្វើដំណើរដោយកងភាគច្រើននិងមិត្តភាពគ្នា-បានចូលទៅក្នុងឧទ្យាន"ទឹកឈូ"ប្រមូលអនុផល ព្រៃឈើ ដែល មិនមែន ជាដើមឈើដូចជា(ឫស្សី) ភាគច្រើនគឺឫស្សី, និងដើមឈើផ្សេងៗ"ផ្តៅ"តិចតួច, ចំណែកការប្រមូលផល រឺ ល្អ រមៀត នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសិក្សានេះគឺមិនមានទេ។ នៅក្នុងពេលសិក្សានៅ ទីវាលនោះក្រុមការងារក៏បានសាកសួរពីតិមានមួយ ចំនួនពីមន្ត្រី ប៉ុស្តិ៍បរិស្ថាន ទឹកឈូស្តីអំពីការកត់ត្រាពីចំនួនអ្នកចូលព្រៃប្រមូលអនុផល ព្រៃឈើនិងបរិមាណផលិតផលតែមិនមាន ការកត់ត្រា។ ប្រហែលជា៣៥ ទៅ៣៧នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាដោយក្រុមការងារដែលពួកគាត់មាន សកម្មភាពទាក់ទងទៅនឹង ឫស្សីនៅក្នុងតំបន់សិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាទូទៅសកម្មភាពដែលទាក់ទងទៅការកាប់ឫស្សីភាគច្រើនជាមនុស្សបុរសហើយកាប់ឫស្សី នៅក្នុងតំបន់គម្រោង នេះតាំងពីព្រលឹមរហូត ដល់ពាក់កណ្តាលថ្ងៃត្រង់។ ពួកគេកាប់ឫស្សីក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលពី ៤០ ទៅ៥០ដើម (មានប្រវែងចាប់ពី៤ម និងអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី៣ទៅ៥សម) ហើយភាគច្រើនគឺពួកគាត់ច្រៀកជាចំប្លែករួចជាស្រេចនៅ និងកន្លែង នោះរួចទើបដឹកយកមកផ្ទះ សំរាប់គ្រួសារវេញធ្វើកន្ត្រករឺធ្វើល្អ ។ឫស្សីនេះទៀតសោតមានគុណភាពផ្សេងៗ។ ចំពោះឫស្សីមួយ

បាច់ដែល គេត្រូវរក្សាទុកមានតំលៃ ចាប់ពី២៥០០រៀលទៅ ៣០០០រៀល (ប្រហែលជា២៥ចំរៀង) ឬស្មើត្រូវបានរកឃើញ នៅតំបន់ព្រៃឈើដែលរងការបំផ្លាញ (ស្ទឹងកែវ) នៅភាគខាងកើតនៃឃុំស្ទឹងកែវដែលមានចំងាយប្រមាណជា១០គម ពីតំបន់ គំរោង។ យោងតាមប្រភពខ្លះប្រមាណ ជា៨០គ្រួសារមកពីឃុំស្ទឹងកែវ(នៅផ្នែកខាងកើតនៃអាងស្តុក ត្រូវបានទៅផ្នែកនេះ ដែរ ដើម្បីកាប់ឫស្សី។ ប្រជាជនមកពីភូមិស្ទឹងកែវ បានមកកាត់ឫស្សីមកពីភ្នំដែលនៅជិតៗ(ផ្នែកខាងកើតនៃជួរភ្នំ ខាងកើតនៃ ឧទ្យានបូកគោ)។ ជាងនេះទៅទៀតការកាត់ឫស្សី នៅចន្លោះតំបន់អាងស្តុកមានការលំបាកព្រោះមានរាំងធម្មជាតិ ដូចជា (ចំងាយ, ទន្លេ, ភ្នំ)។ យោងតាមការធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលព្រៃប្រមូលអនុផល ព្រៃឈើបានអោយដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ដែលបានមកពីអនុផល ព្រៃឈើមានការថយចុះជាងមុន ហើយពួកគាត់ក៏មានការ ព្រួយ បារម្ភអំពីបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលពឹងអាស្រ័យលើ អនុផល ព្រៃឈើនាពេលអនាគត។ មើលតារាងលេខ៥០: ខាងក្រោម

តារាងលេខ ៤៩ : មេគ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍

#	ឈ្មោះភូមិ	មេគ្រួសារសម្ភាសន៍	ចំ.មនុស្សបន្ថែម	សំគាល់
1	អូរតូច	24	118	ភូមិអូរតូច ឃុំអណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត
2	ថ្មីខាងជើង	7	39	ភូមិថ្មីខាងជើង ឃុំអណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត
សរុប		31	157	

បញ្ជាក់: មេគ្រួសារដែលបានធ្វើការសម្ភាសន៍ខាងលើនេះគឺមានមុខរបរតែមួយគត់។

តារាងលេខ ៥០ : បង្ហាញពីការបំបែកប្រាក់ចំណូលរបស់មេគ្រួសារ

បង្ហាញពីការបំបែកប្រាក់ចំណូលរបស់មេគ្រួសារ				
ឆ្នាំ	ចំនួនគ្រួសារ	ចំនួនមនុស្ស	ចំណូលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុង១គ្រួសារ	ភាគរយថយចុះ
២០១០	31	157	\$ 1,343.87	21.89 %

យោងតាមតារាងខាងលើនេះបានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលរបស់មេគ្រួសារដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃ ឈើជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយគ្រួសារគឺ ប្រមាណជា ១៣៤៣,៨៧ ដុល្លារអាមេរិក ។




អ្នកកាប់ឫស្សី និងផ្តៅ ថតនៅថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១០

៥.៣.៣.៣ ការប្រមូលរុក្ខជាតិផ្សេងៗ

ផ្នែកខ្លះ : ផ្នែកខ្លះគ្រាប់ គឺត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងឧទ្យាន និងបានលក់សំរាប់ការបរិភោគ។ ចំនួនមនុស្សសរុប ដែលប្រមូល ប្រមាណជា ២១ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា ២ខែ (តុលា, វិច្ឆិការ) ។ ការប្រមូលប្រចាំថ្ងៃនៃផ្នែកខ្លះ (៤ ទៅ ៥គ.ក) គឺវាត្រូវបាន លក់នៅទីផ្សារតំលៃ ៤០០០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម។ យោងតាមការធ្វើ សម្ភាសន៍ជាមួយ អ្នកប្រមូល

ផ្ទៃខ្ទះបានអោយដឹងថាផ្ទៃខ្ទះនេះជាប្រភេទផ្ទៃក្នុងជាតិម្យ៉ាងដែលកំរែផ្ទៃណាស់រយៈពេលពី១០ទៅ២០ឆ្នាំទើបមានផ្ទៃម្តងហើយការរកអនុផលនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការកាប់ឫស្សី កិច្ចការនេះត្រូវចំណាយពេលទៅសំរាកនៅក្នុងព្រៃចាប់ពីរទៅបីឆ្នាំទើបអាចប្រមូលបានផ្ទៃនេះច្រើន។



ផ្ទៃខ្ទះដែលរើសនៅក្នុងព្រៃ ថតនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០

៥.៣.៣.៤ ការបេឡាញ និង ការដាក់អន្ទាក់លូចលាក់

វាជាការពិគណនាស្តង់ដារក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពបរិបូណ៌ដែលជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ និងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកការពារឧទ្យានជាតិ (ជាពិសេសប៉ូស្តិប៊ីស្ថានទឹកឈូ) និងប៉ូស្តិប៊ីស្ថានស្ទឹងកែវ ។ ពុំមានរបាយការណ៍ជាផ្លូវការនៃចំនួនអ្នកបរិបូណ៌នៅក្នុងតំបន់ទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រជាជនខ្លះបានធ្វើការបរិបូណ៌ម្តងម្កាលនៅក្នុង ព្រៃដែលមានសត្វព្រៃដូចជា ជ្រូកព្រៃ, កាំប្រម៉ា, ពង្រួល, អណ្តើក, ត្រកូត, ក្តាន់ព្រៃដែលត្រូវបានចាប់សំរាប់តម្រូវការ បុគ្គល ឬដើម្បីលក់ ទៅអោយឈ្មួញឬភោជនីយដ្ឋាន នៅក្នុងតំបន់។ ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សានៅទីវាល យើងបានជួបអ្នកដាក់អន្ទាក់ប្រមាណជា២ទៅ ៣នាក់ត្រូវបានកត់ត្រា (អណ្តើក, កាំ ប្រម៉ា) ដែលពួកគាត់មកពីភូមិ ស្ទឹងកែវស្ថិតនៅក្នុង ឃុំស្ទឹងកែវ។

៥.៣.៣.៥ ប្រមាណរដ្ឋដែលទាក់ទងនឹងរមណីយដ្ឋានទឹកឈូ

ម្ចាស់តូបលក់ត្រី និងអាជីវកម្មអាហារដ្ឋាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទឹកឈូមានសារៈសំខាន់ដែរ នៅក្នុងរមណីយទីកន្លែងមានតូប លក់ដូរប្រមាណ ជា៤១ និងអាហារដ្ឋានប្រមាណជា១០ ដែលរកចំណូលសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ ដោយការផ្តល់សេវាកម្ម។ ភាគច្រើនសេវាកម្មលក់ដូរជាក់ស្តែងនៅចុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ជាពិសេសនៅរដូវបុណ្យទានផ្សេងៗ ដូចជាពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំខ្មែរ, ឆ្នាំចិន, ភ្ជុំបិណ្ឌ និងថ្ងៃឈប់សំរាក ពេលដែលអ្នកកំសាន្ត មកពី តំបន់ផ្សេងៗ ដូចជាភ្នំពេញ រឺក៏ខេត្តផ្សេងៗទៅ កំសាន្តដើម្បីងូតទឹកនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ទឹកឈូ។ ភាគច្រើនពួកគេលក់អាហារ, ភេសជ្ជៈ, ផ្លែឈើ, និងនំ, ជួលកន្លែងងូតទឹក/ក្រមា/អង្រឹង ជួលកន្លែងលេងខ្ទុះ។ គ្រប់តូបនិងរានលក់ដូរទាំងអស់ត្រូវបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ។ សំរាប់តូបមួយ ១០០,០០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ។ ភាគច្រើនផលិតផលដែលលក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទឹកឈូ (ភេសជ្ជៈ, បន្លែសាច់, អាហារ, ផ្លែឈើខ្លះ) គឺត្រូវបានទិញពីផ្សារកំពតដោយឡែកផលិតផល ផ្លែឈើតាមរដូវមួយចំនួនទៀតដូចជាចូរន, សាម៉ាវ, ក្រូចថ្មី, ទៀបបារាំង ដែលជាផលិតផលនៅតាមចំការក៏ត្រូវ ដាក់តាំង នៅទីនោះ ផងដែរ។ វិស័យទេសចរក៏ជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយនាពេលអនាគតតាមការជួបសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នក លក់នៅក្នុងរមណីយ ដ្ឋានទឹកឈូបានអោយដឹងថាមុខរបរលក់ដូររបស់ពួកគាត់បច្ចុប្បន្ននេះមានការថយចុះច្រើនដោយមិនសូវមានភ្ញៀវមកកំសាន្តហើយ អ្នកលក់តាមតូបខ្លះបានងាក ទៅរកមុខរបរបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗទៀតដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរួមផ្សំ និងចំណូលដែលបានមកពីប្តីរបស់ពួកគេ (កសិករ, កម្មករ, អាជីវកម្មព្រៃឈើ) ជាដើម។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរ ខេត្តកំពត បានអោយដឹងថានៅ រមណីយដ្ឋានទឹកឈូ ឆ្នាំ

២០០៦ (មុនដំណាក់កាល សាងសង់) ភ្លៀវទេសចរ មានការកើនឡើង ដែលមានភ្លៀវទេសចរសរុប ២៧៩៧៧នាក់ ក្នុងនោះ មានភ្លៀវជាតិ ២៧៥៦៤នាក់ និងភ្លៀវបរទេស ២៣៣៣នាក់។ នៅឆ្នាំ ២០១០នេះ ភ្លៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនា នៅមណីយដ្ឋានទឹកឈូនេះមានការថយចុះមកត្រឹមតែ ៦៥៥៤២នាក់ ក្នុងនោះមានភ្លៀវជាតិ ៦៧៦៥៨នាក់ និង ភ្លៀវបរទេស ១៨៨៨៤នាក់ ការថយចុះនេះបានជះឥទ្ធិពល ផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទឹកឈូនេះ ជាពិសេសនោះគឺ ប្រជាពលរដ្ឋដែល ប្រកបមុខរបរលក់ដូរទឹកឈូនិងផ្តល់សេវាផ្សេងៗ ជូនភ្លៀវទេសចរ។ តាមការធ្វើអង្កេត និងរបាយការណ៍ពីមន្ទីរ ទេសចរខេត្ត អោយដឹងថាមូលហេតុដែលធ្វើអោយ ភ្លៀវទេសចរនៅ ទឹកឈូនេះថយចុះ គឺបណ្តាលមកពីនៅរដូវប្រាំងពុំសូវមានទឹកទេ ដែល ជាហេតុបង្កឱ្យភ្លៀវទេសចរអោយទៅកំសាន្តនៅមណីយដ្ឋានផ្សេងៗ ទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះដូចជា កែបថ្មី ភ្នំបូកតោ ភ្នំ កំពង់ត្រាច ប្រាសាទភ្នំឈ្លាក់ ភ្នំស ព្រែកអំពិល ប្រាសាទភ្នំខ្យង ភ្នំដូង និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ។ ការថយ ចុះភ្លៀវទេសចរ នេះបានប៉ះពាល់ដល់មុខរបរ អាជីវករលក់ដូរ នៅទឹកឈូចំនួន៣២គ្រួសារ ហើយប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រចាំ ឆ្នាំក្នុងមួយគ្រួសារដែលបានមកពី ការលក់ដូរនៅក្នុងតំបន់ទេសចរទឹកឈូនេះគឺប្រមាណជា ៥៥៣,២២ដុល្លារ អាមេរិច ។

តារាងលេខ ៥១ : ចំណូលសរុបនៅក្នុងមណីយដ្ឋានទឹកឈូដែលបានសម្ភាសន៍ សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១០

#	ឈ្មោះភូមិ	មេ.គ្រូដែលសម្ភាសន៍	ចំ.មនុស្សនៃគ្រូ	សំគាល់
1	ស្តុំប្រាំពីរ	៣២	១៤៨	អាជីវករទឹកឈូ
	សរុប	៣២ នាក់	១៤៨ នាក់	

តារាងលេខ ៥២: ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់មេគ្រូសារដែលបានសម្ភាសន៍ សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១០

	ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកលក់ដូរទឹកឈូប្រចាំឆ្នាំ ២០១០		
	ចំនួនគ្រួសារ	ចំនួនមនុស្ស	ចំណូលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុង ១ គ្រួសារ
១	32	148	\$ 953.22

៥.៣.៣.៦ ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដោយសារការសាងសង់បង្គោលភ្លើង

យោងតាមការសិក្សានៅទីវាលជាក់ស្តែងរបស់ក្រុមការងារ SAWAC បានរកឃើញថាមានភូមិ៤ ក្នុងឃុំបីដែលប៉ះ ពាល់ ដោយសារការសាងសង់បង្គោលភ្លើង ២៣០ គវី គិតចាប់តាំងពីអគារថាមពលទី១ រហូតដល់អនុស្ថានីយ ព្រៃឃ្មុំ ហើយ ចំនួនបង្គោលសរុប ទាំងអស់មាន៣៤បង្គោលដែលមានប្រវែងសរុប១១,០៥គមដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណជា ៣៣,១៥ហិកតា ក្នុង នោះដីបឹង,ត្រពាំង, ព្រែក, ស្ទឹង មាន ១,១៣ ហិកតា, ដីដែលប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជនមាន ៣១,៦៥ហិកតា, ដីផ្លូវមាន ០,៣៣ហិកតា។ បង្គោលលេខ០១ដល់បង្គោល១៦ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមាត់ពាម(ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ) ប៉ះពាល់១៤គ្រួសារស្មើនឹងចំនួន មនុស្សសរុប៧៦នាក់ លើដីចំការ និងដំណាំរួមមានចូររនធំ ២០ ដើម, ចូររនតូច ១១៧ដើម,ស្វាយធំ ៣២២ដើម ស្វាយតូច៤៣១ ដើម,លុង ១២ដើម, ចេក ១០៧៥ ដើម, ខ្នុរ ៣៩ ដើម ទៀប ៦ និងក្រូច ៧ដើមសរុបទាំងអស់២០២៩ដើម។ ភូមិអណ្តូង ដីម៉ឺន(ឃុំកំពង់ត្រែង) ១០គ្រួសារ ស្មើមនុស្ស ចំនួនមនុស្សសរុប ៥៥ នាក់(ចាប់ពីបង្គោលលេខ ១៧ ដល់២៣),ភូមិម៉ាក់ប្រាង្គ (ឃុំកំពង់ត្រែង) ១០គ្រួសារ មានចំនួនមនុស្សសរុប ៥០នាក់ (គិតចាប់ពីបង្គោល ២៤ ដល់បង្គោល ២៨) , ភូមិព្រៃឃ្មុំ (ឃុំព្រៃ

ឃុំ) ៦ត្រូវមានចំនួនមនុស្សសរុប ៣៤នាក់ (ចាប់ពី បង្គោលលេខ២៩ដល់៣៤) ។ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ ដីស្រែ ចំការក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់បង្គោលនេះ ក្រុមហ៊ុនបានចេញថ្លៃសំណងលើការខូចខាតផលដំណាំ និងដីដោយ មានកិច្ចសហការ ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តកំពត, ស្រុក, មន្ទីរ, ឃុំ និងភូមិដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ ។ (មើលតារាងលេខ: ៥៣ខាង ក្រោម)

តារាងលេខ ៥៣: មេគ្រួសារសរុបដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់បង្គោល សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣១ ធ្នូ ២០១០

ស្រុក	ឃុំ	ភូមិប៉ះពាល់	ចំ.គ្រួសារប៉ះពាល់	ចំ.មនុស្ស/គ្រួសារ	ដីស្រែគិតជាម ^២	ដីចំការគិតជាម ^២	ដើមឈើដែលប៉ះពាល់សរុប	សំគាល់
ផ្ទៃក្នុង	បាក់រន្ទ	មាត់ពាម	14 គ្រួសារ	76 នាក់	-	2242.23 ម ^២	2029 ដើម	ពីបង្គោល ០១ដល់ ១៦
	កំពង់ត្រែង	អណ្តូងជ័យ	10គ្រួសារ	55 នាក់	999.96 ម ^២	-	-	ពីបង្គោល ១៧ ដល់២៣
		ម៉ាក់ប្រាង	10គ្រួសារ	50 នាក់	769.93 ម ^២	-	-	ពីបង្គោល ២៤ ដល់២៨
	ចំរើម	ព្រៃឃ្មុំ	6គ្រួសារ	34 នាក់	861.42 ម ^២	-	-	ពីបង្គោល ២៩ ដល់៣៤
សរុប	3 ឃុំ	4 ភូមិ	40 គ្រួសារ	215 នាក់	2631.32 ម ^២	2242.3 ម ^២	2029 ដើម	

៥.៣.៣.៧ ប្រជាជនដែលអាចប៉ះពាល់ដោយសារគន្លងទំនៀម

យោងតាមការសិក្សាបានបង្ហាញអោយឃើញថាអាចនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៦ត្រូវស្នើមនុស្ស ៦៤ នាក់ដែល មានផ្ទះស្ថិតនៅក្រោមគន្លងទំនៀមឆ្នើង២៣០ គ.វ ។ ការសិក្សាចាប់ពីអត្រាបង្គោលប្រមាណជា ២៥ម សងខាង (សរុប ៥០ម) ។

តារាងលេខ: ៥៤ មេគ្រួសារសរុបដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ះពាល់ដោយសារគន្លងទំនៀម សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣១ ធ្នូ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំ	ចំ.គ្រួសារ ប៉ះពាល់គន្លងទំនៀម	ចំ.មនុស្ស គន្លងទំនៀម	សំគាល់
01	ព្រៃឃ្មុំ	ព្រៃឃ្មុំ	2	8	អាចប៉ះពាល់ផ្ទះ
02	កំពង់ក្រែង	កំពង់ត្រែង	4	16	អាចប៉ះពាល់ផ្ទះ
03	ម៉ាក់ប្រាង	កំពង់ត្រែង	1	4	អាចប៉ះពាល់ផ្ទះ
04	មាត់ពាម	ម៉ាក់ប្រាង	9	36	អាចប៉ះពាល់ផ្ទះ
ចំនួនគ្រួសារសរុប			16	64	

៥.៣.៣.៨ ប្រជាជនដែលអាចប៉ះពាល់ដោយសារការបង្កើនផ្ទះនៅជិតរំយកថ្មដុបថ្លៃ និងដុបមាត់ត្រា

យោងតាមការសិក្សានិងធ្វើសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរកន្លែងយកថ្មសាងសង់ ទំនប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទ្វារថ្មីនៃឃុំព្រៃថ្មងស្រុកទឹកឈូពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថា ដំបូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មួយចំនួនបាន ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ដោយសារផ្ទាំងថ្មធ្លាក់ចំណូលអោយផ្ទះឆ្ងាយដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ទោះបីជា ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ចំងាយប្រមាណជា១០០មពីទីបន្ទុះនោះក៏ដោយ ក៏មានដុំថ្មធំៗខ្លះខ្លាតលើសរហូតដល់ប្រមាណពី ១៥០ ទៅ ២០០មនេះ បើតាម ការអះអាងរបស់ពួកគាត់ ។ ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់ពីលោក **គល់ សុខា** ប្រធានការិយាល័យមន្ទីរឧស្សាហកម្ម ខេត្តកំពតបាន មានប្រសាសន៍ថា ចំពោះការខូចខាតដំបូលផ្ទះជាយថាហេតុដោយសារកំទេច ថ្មខ្លាតប៉ះធ្វើអោយបែកដំបូលផ្ទះរបស់ប្រជាពល រដ្ឋនោះ គឺត្រូវបានភាគីខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចេញសំណងដោយប្រើប្រាស់សន្លឹកមានតម្លៃ ស្មើ២០ដុល្លារអាមេរិក ។ ចំណែកអាជ្ញា ធរដែនដីបានបញ្ជាក់ថាការខូចខាត នេះគឺត្រូវបានភាគីខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចេញសំណងជាបសិទ្ធិ (បើបែកប្រើប្រាស់សន្លឹក តម្លៃសង្ឃឹមសន្លឹកវិញ) ។ មើលតារាងលេខ:៥៥ ខាងក្រោម:

តារាងលេខ ៥៥ : មេត្រូវការសរុបដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ះពាល់ដោយសារបន្ទុក សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មិនា ឆ្នាំ ២០១០

ចំនួនគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ដោយសារការបន្ទុក					
ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំ	ចំនួនគ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍	ចំនួនសមាជិកគ្រួសារសរុប	សំគាល់
01	ទ្វាថ្មី	ព្រៃថ្មង	14	62	គ្រួសារដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងយកថ្ម(ភ្នំដុនជ្រឹង និងដុបមាន់ព្រៃ)សំរាប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ចំនួនគ្រួសារសរុប			14	62	


៥.៤.១ អាជីព និងមុខរបរ

៥.៤.១.១ មុខរបរសំខាន់ៗ

យោងតាមទិន្នន័យដែលបានចែងក្នុងតារាងលេខ៥៥បង្ហាញថាមុខរបរបស់មេត្រូវការនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងតំបន់គំរោងមាន ដូចជាកសិករ/កម្មករ 54.55% , មន្ត្រីរាជការ 6.49% (ទាហាន,គ្រូបង្រៀន,មេភូមិ) , អ្នកលក់ដូរ 18.18% ហើយ និងអ្នករកអនុផលព្រៃឈើ 20.78% ។

តារាងលេខ ៥៦ : មុខរបរបស់មេត្រូវការដែលបានសម្ភាសន៍នៅតំបន់គំរោង សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មិនាឆ្នាំ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ឈ្មោះឃុំ	ចំនួនគ្រួសារ ដែលបានសម្ភាសន៍	មុខរបរសំខាន់ៗរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ				សំគាល់
				កសិករ/កម្មករ	មន្ត្រីរាជការ	លក់ដូរ	អនុផលព្រៃឈើ	
01	ព្រៃថ្មង	ព្រៃថ្មង	13	11	1	1	0	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
02	ថ្មីខាងជើង	អណ្តូងខ្មែរ	7	0	0	0	7	សង្កាត់កំពង់បាយ, ខេត្តកំពត
03	អណ្តូងជីម៉ូន	កំពង់ត្រែង	21	18	2	0	1	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
04	អូរតូច	អណ្តូងខ្មែរ	23	0	0	0	23	សង្កាត់កំពង់បាយខេត្តកំពត
05	កំពង់ក្រុង	កំពង់ត្រែង	3	3	0	0	0	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
06	ម៉ាក់ប្រាង	កំពង់ត្រែង	13	13	0	0	0	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
07	មាត់ពាម	ម៉ាក់ប្រាង	27	23	4	0	0	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
08	ស្នំប្រាំពីរ	ម៉ាក់ប្រាង	33	3	3	26	1	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
09	ទ្វាថ្មី	ព្រៃថ្មង	14	13	0	1	0	ស្រូវទឹកឈូ, ខេត្តកំពត
ចំនួនគ្រួសារសរុប			154	84	10	28	32	
ភាគរយ %			100.00%	54.55%	6.49%	18.18%	20.78%	




៥.៤.២ ផលិតផលក្នុងស្រុក (Gross Domestic Product (GDP))

ចំណូលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១០គឺកើនឡើងជាង៥.៥ភាគរយស្មើ១១,៣កោដិដុល្លារអាមេរិក ហើយចំនួនប្រជាជនមាន ១៣,៨ លាននាក់ ដូច្នេះ GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗក្នុង១ឆ្នាំគឺUS\$ 783 per capita (ទិន្នន័យនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅស្ថិតិឆ្នាំ ២០១០ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការរបស់ប្រទេសកម្ពុជា) (ប្រភពពី istock analyst,IMF,ADB,andWB,date:Tuesday,11January,2011) និងប្រភព ទិន្នន័យដែលស្រង់ ចេញពី www.indexmundi.com>Cambodia> Economy ។ ចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំក្នុង គ្រួសារនីមួយៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គំរោងមាននៅក្នុងតារាងលេខ ៥៧ ខាងក្រោម ។

តារាងលេខ: ៥៧ ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់គ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងតំបន់គំរោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ ១០ មិនា ដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍							
		\$301-500	%	\$501-1000	%	\$1001-3000	%	\$3001-50000	%
1	មាត់ពាម	0	0	1	3.70	8	29.63	18	66.67
2	អណ្តូងដីម៉ឺន	1	5	1	5	14	70	4	20
3	ម៉ាក់ប្រាង	0	0	0	0	8	61.54	5	38.46
4	កំពង់ក្រុង	0	0	1	33.33	1	33.33	1	33.33
5	ស្ម័គ្រចិត្ត	0	0	1	3.03	20	60.61	12	36.36
6	ព្រៃឃ្មុំ	0	0	1	7.69	5	38.46	7	53.85
7	ទ្វារថ្មី	0	0	3	21.43	10	71.43	1	7.14
8	អូរតូច	0	0	1	4.17	22	91.67	1	4.17
9	ទីខាងជើង	0	0	0	0	1	14.29	6	85.71



យោងតាមតារាង ៥៨ ខាងលើនេះបានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលប្រចាំគ្រួសារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងភូមិទាំង ៩ មាន កំរិតដូចជា \$301- \$500 មាន 0.65%, ពី \$501- \$1000 មាន 5.84%, ពី \$1001- \$3000 មាន 57.79%, ហើយប្រាក់ចំណូលលើសពី \$3001 មាន 35.71% កំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោងគឺប្រាក់ ចំណូលមធ្យមម្នាក់ៗមាន ៦២៥.១០ដុល្លា អាមេរិក ទាបជាងប្រាក់ចំណូលផលិតផលក្នុងស្រុក(GDP) របស់ ប្រទេសកម្ពុជា គឺ ៧៨៣ ដុល្លាអាមេរិក/នាក់/ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ។ មើលតារាងលេខ ៥៨ ខាងក្រោម ។

តារាងលេខ ៥៨: ប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គម្រោងនៅក្នុងតំបន់គម្រោង
សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ២០១០

ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិដែលបានសម្ភាសន៍	ចំ.គ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍	ចំ.មនុស្សក្នុងមួយគ្រួសារ	ចំ.មនុស្សនៃគ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍	ចំ. ប្រជាពលរដ្ឋអាពុធទាំងឡើង	ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងគ្រួសារ	ប្រាក់ចំណូលម្នាក់ៗក្នុងមួយឆ្នាំ
480,702.35	154 គ្រួសារ	4.99	769 នាក់	461 នាក់	\$3,121.44	\$625.10

៥.៤.៣ វិស័យអប់រំ និងសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ

តាមការសិក្សានិងការធ្វើសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គម្រោងបានរកឃើញថានៅក្នុងតំបន់គម្រោង និងសង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ នៃភូមិទាំង៩មានសាលារៀន បឋមសិក្សា ១៧កន្លែងស្មើ ៥ខ្នង ដែលមាន២៤ បន្ទប់ចំនួនសិស្ស គឺ១០៣០នាក់ និងគ្រូ២៤នាក់ ហើយនិងអនុវិទ្យាល័យ៥ ។ កំរិតនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់អ្នកភូមិមានកំរិតទាបនៅឡើយ ។ តាមតារាងលេខ ១៥ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញថា មេគ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍ចំនួន១៥៤គ្រួសារក្នុងនោះមានមេគ្រួសារជាបុរសចំនួន១០៨នាក់ និងស្ត្រីដែល ជាមេគ្រួសារចំនួន ១២នាក់ដែលចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ (កំរិតវប្បធម៌ត្រឹមថ្នាក់ទី ៣ និងទី៧) ។ បើគិតជាភាគរយមានមេគ្រួសារ៧៨,៨៥%ជាអ្នកចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរនៃចំនួនគ្រួសារសរុបដែលបានសម្ភាសន៍ទាំង៩ភូមិ ។ ចំពោះមេគ្រួសារ ដែលមិនចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរជាបុរសមានចំនួន ១៥នាក់ និងស្ត្រី៣នាក់ ។ បើគិតជាភាគរយ មានមេ គ្រួសារ ២១,១៥ % ដែលមិនចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ ។

តារាងលេខ: ៥៩ ស្ថិតិរបស់មេគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់គម្រោងដែលចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរសិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ២០១០

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ចំ.គ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍	មេគ្រួសារចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរដែលបានសម្ភាសន៍			
			ប្រុស	ស្រី	សរុប	%
1	មាត់ពាម	27	19	2	21	77.78
2	អណ្តូងជីម៉ិន	20	19	1	20	85
3	ម៉ាក់ប្រាង្គ	13	8	0	8	61.54
4	កំពង់ក្រុង	3	3	0	3	100
5	ស្ទឹងប្រាំពីរ	33	20	9	29	87.88
6	ព្រៃឃ្មុំ	13	11	0	11	61.54
7	ទ្វារថ្មី	14	12	0	12	85.71
8	អូរតូច	24	11	0	11	45.83
9	ថ្មីខាងជើង	7	5	0	5	71.43
សរុប		154 គ្រួសារ	108 នាក់	12 នាក់	120 នាក់	77.92 %

តារាងលេខ: ៦០: ស្ថិតិសាធារណៈតំបន់សិក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងបំណងសិស្ស និងគ្រួសារក្នុង និងក្បែរ តំបន់គម្រោងសិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ដល់ ១៥ កក្កដា ២០១០

ស្ថិតិសាធារណៈ					
I. ឃុំប៉ោយប៉ែត					
#	ឈ្មោះសាធារណប័ណ្ណ	សិស្សស្រី	សិស្សប្រុស	គ្រូស្រី	គ្រូប្រុស
1	មាត់ពាម	52	64	3	3
2	ស្ទឹងព្រី	187	218	5	11
សរុប		239	282	8	14
		521 នាក់		22 នាក់	
#	ឈ្មោះសាធារណអនុវិទ្យាល័យ	សិស្សស្រី	សិស្សប្រុស	គ្រូស្រី	គ្រូប្រុស
1	ស្ទឹងព្រី	43	66	2	5
សរុប		43	66	2	5
		109 នាក់		7 នាក់	
II. ឃុំកំពង់ឆ្នាំង					
#	ឈ្មោះសាធារណប័ណ្ណ	សិស្សស្រី	សិស្សប្រុស	គ្រូស្រី	គ្រូប្រុស
1	កំពង់ក្រុង	165	166	7	10
2	ព្រៃទប់	79	66	0	5
3	មាត់ក្របាច់	107	88	2	4
4	បឹងព្រះ	158	147	5	4
សរុប		509	467	14	23
		976 នាក់		37 នាក់	
#	ឈ្មោះសាធារណអនុវិទ្យាល័យ	សិស្សស្រី	សិស្សប្រុស	គ្រូស្រី	គ្រូប្រុស
1	បឹងព្រះ	102	138	7	5
សរុប		102	138	7	5
		240 នាក់		12 នាក់	
III. ឃុំក្របាច់					
#	ឈ្មោះសាធារណប័ណ្ណ	សិស្សស្រី	សិស្សប្រុស	គ្រូស្រី	គ្រូប្រុស
1	វត្តអង្គ	228	236	10	6
2	ភ្នំសរ	151	164	4	5
3	ព្រៃគុំ	148	137	5	5
4	បឹងតាពោង	53	52	4	0
សរុប		580	589	23	16
		1169 នាក់		29 នាក់	
#	ឈ្មោះសាធារណអនុវិទ្យាល័យ	សិស្សស្រី	សិស្សប្រុស	គ្រូស្រី	គ្រូប្រុស
1	ភ្នំសរ	50	63	3	3
សរុប		50	63	3	3
		113 នាក់		6 នាក់	
IV. ឃុំក្របាច់					

ស្រុកទឹកឈូ					
#	ឈ្មោះសាធារណៈបរិស្ថាន	សិល្បស្រី	សិល្បប្រុស	ច្រសី	ច្របុស
1	រដ្ឋបារក	153	164	4	9
2	ទ្វារថ្មី	177	165	2	6
3	ច្បារអំពៅ	253	279	3	4
4	ជនសយ	109	129	0	4
5	ដំរីដុំ	91	65	0	4
6	ឧត្តមានជ័យ	209	202	2	4
7	ព្រៃថ្មី	73	64	0	3
		1065	1068	11	34
សរុប		2133 នាក់		45 នាក់	
#	ឈ្មោះសាធារណៈអនុវិទ្យាល័យ	សិល្បស្រី	សិល្បប្រុស	ច្រសី	ច្របុស
1	រដ្ឋបារក	206	266	12	12
2	ច្បារអំពៅ	58	52	4	4
		264	318	16	16
សរុប		582 នាក់		32 នាក់	

សំគាល់: ប្រភពទិន្នន័យពីការយោបល់របស់ស្រុកទឹកឈូឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១ ។

៥.៤.៤ ការប្រើប្រាស់ដី និងការកាន់កាប់ដីដោយប្រជាពលរដ្ឋ

យោងតាមការចុះសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅតំបន់គំរោងគិតចាប់ពីទំនប់អាងទី២ឡើងទៅលើបានបង្ហាញអោយឃើញថាដីដែលបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនសរុប៣០១,៣៧ហិកតា (ដីចំការ, ស្រែ) ហើយដីទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ មាត់ពាម, អណ្តូងដីមុន, ម៉ាក់ប្រាង, ព្រៃឃ្មុំ, ទ្វារថ្មី ។ ដីដែលកាន់កាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺមានការ អនុញ្ញាតថ្នាក់ ពីភូមិប្រធាន ក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងអស់នោះមិនមានប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានស្តីរយោលដី និងភូមិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង សំណង់នៅឡើយទេ ។ យោងតាមច្បាប់ភូមិបាល មាត្រា៣៥និង ៣០ ក្នុងជំពូក២ខាងលើក្នុងទំព័រទី៩ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីទាំងនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ភូមិបាលនេះ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះជាដីឧទ្យានជាតិបូកគោ ។ យោងតាមការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយលោកយ៉ង់ការម្យ ប្រធានឧទ្យានជាតិបូកគោព្រះសុភារមិតបានប្រាប់អោយដឹងថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងដីឧទ្យានជាតិមិនអាចទទួលប័ណ្ណសំគាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ ដោយស្របច្បាប់ទេ តែអាចបន្តការយកផលពីដំណាំដែលខ្លួនបានដាំទាំងនោះបាន ។

៥.៤.៥ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ

ប្រភពទឹករបស់រដ្ឋាករស្វ័យត្រក្រងកំពតសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់គឺត្រូវបានបូមចេញពីព្រែកទឹកឈូហើយស្ថានីយ៍បូមទឹកបច្ចុប្បន្ននេះនៅចម្ងាយតែ១,២គម ប៉ុណ្ណោះពីទំនប់ទី២របស់គំរោងវារីអគ្គិសនីកំចាយ ។ សមត្ថភាពរោងចក្រសព្វថ្ងៃ អាចផលិតទឹកបានដល់ទៅ ២៦០ម^៣/មី ហើយអាចផ្គត់ផ្គង់រយៈពេល២៤មី ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនេះអាចផ្គត់ផ្គង់បានប្រមាណជា ៣៨០០គ្រួសារ នៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់គំរោងទាំងមូល និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្តោយផ្លូវទៅទឹកឈូ តំលៃទឹក គឺ១៤០០រៀល ក្នុង

១២ (០,៣៥ដុល្លា ក្នុង១២) យោង តាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ពីលោកនាយករដ្ឋាករទឹកក្រុងកំពត លោក ប៊ុន ចាន់ដា ប្រធានរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តខេត្តកំពត ។

ដោយឡែកប្រភពទឹកសំខាន់សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិក្នុង និងជុំវិញនិងនៅតំបន់តំបន់ភ្នំព្រែក ទឹកឈូ ស្ទឹង អូរ, ទឹកម៉ាស៊ីនដែលតមកពីភ្នំក្នុងតំបន់ និងអណ្តូងជីក(រាក់)ក្នុងនោះ៩៥ភាគរយនៃទឹកត្រូវបានដាំអោយ ពុះមុននិងបរិភោគ ។

ចំនួនបង្គន់នៅក្នុងភូមិមួយៗមានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ។ ក្នុងភូមិទាំងអស់ដែលបានសម្ភាសន៍ មានតែភូមិស្នំ ព្រំពីរទេដែលមានការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ ។ ចំពោះកន្លែងណាដែលគ្មានបង្គន់ ជាធម្មតាពួកគាត់ ច្រើនតែបត់ ជើងចំនៅក្នុងវិវាតកម្រិតព្រៃ វិជីកដឹកបំ ។ ចំណែកការចោលកាកសំណល់ដូចជាសំ រាមពួកគាត់ច្រើនបោះចោលនៅវិញផ្ទះ របស់គេ ។ ពុំមានប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់រាវបានត្រឹមត្រូវទេ ។ ដូច្នេះបញ្ហាអនាម័យ ត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលត្រូវតែមាន ការអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀត ។ តារាងលេខ៦១ខាងក្រោមនេះបង្ហាញអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់អ្នកភូមិក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់តំបន់ ។

តារាងលេខ: ៦១ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអនាម័យនៅជុំវិញនិងក្នុងតំបន់តំបន់ (គិតជាគ្រួសារអ្នកបានសម្ភាសន៍)

ល.រ	ឈ្មោះភូមិ	ចំ.គ្រួសារដែលបានសម្ភាសន៍	អ្នក	ប្រភពទឹក/ប្រភពទឹក	អន្តរាគមន៍/ប្រភពទឹក	ទឹកត្រូវបាន/ទឹកម៉ាស៊ីន	មានបង្គន់ប្រើ
1	មាត់ពាម	27	9	12	1	8	8
2	អណ្តូងជីម៉ឺន	20	3	11	4	9	6
3	ម៉ាក់ប្រាង្គ	13	2	8	3	9	4
4	កំពង់ក្រុង	3		2	1	2	1
5	ស្នំព្រំពីរ	33	13			23	27
6	ព្រៃឃ្មុំ	13	10			5	8
7	ទ្វារថ្មី	14		10	2	6	5
8	អូរតូច	24		21	2	24	1
9	ថ្មីខាងជើង	7	1	1		7	2
សរុប		154		32	13	93	62
%			4% 15%		6%	45%	30%

៥.៤.៦ សុខាភិបាល និងអប់រំសុខភាព

យោងតាមការសិក្សានិងជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដែលនៅក្នុងនិងក្បែរតំបន់តំបន់បានបង្ហាញ អោយឃើញថា ពួកគាត់បានជួបប្រទះជំងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភពទឹកកើតមានច្រើនប្រភេទដូចជា ជំងឺគ្រុនចាញ់, ជំងឺគ្រុន ឈាម, គ្រុនសន្ធឹង, អាសន្នរោគ, រាគ, គ្រុនពោះវៀន, និងសើស្បែក ។ នៅពេលដែលពួកគាត់ជួបប្រទះជំងឺផ្សេងៗ ប្រសិនបើជា ជំងឺស្រាលគេ តែងតែទៅទិញថ្នាំនៅតាមហ្វាម៉ាស៊ី រឺតូបលក់ថ្នាំយកមកបរិភោគ ក្នុងករណីដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ គេតែងតែទៅ មណ្ឌលសុខភាព រឺក៏ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពត ។

តារាងលេខ ៦២៖ ជីវិតដែលគិតបានតាមឃុំនៅខ្សែចង្វាក់បង្គោលគំរូ(គិតជាគ្រួសារអ្នកបានសម្ភាសន៍)

សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ ៣១ ឬ ២០១០

ឃុំកំពង់ត្រែង	គ្រួសារចាញ់	គ្រួសារឈាម	គ្រួសារស្នំ	អាសន្នរោគ	រាគ	គ្រួសារពោះវៀន	សើស្បែក
	12	10	21	2	18	10	8
%	15%	12%	26%	3%	22%	12%	10%
ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ	គ្រួសារចាញ់	គ្រួសារឈាម	គ្រួសារស្នំ	អាសន្នរោគ	រាគ	គ្រួសារពោះវៀន	សើស្បែក
	22	17	27	0	26	13	12
%	19%	15%	23%	0%	22%	11%	10%
ឃុំអណ្តូងខ្មែរ	គ្រួសារចាញ់	គ្រួសារឈាម	គ្រួសារស្នំ	អាសន្នរោគ	រាគ	គ្រួសារពោះវៀន	សើស្បែក
	15	12	14	2	11	5	3
%	24%	19%	23%	3%	18%	8%	5%
ឃុំព្រៃថ្លង	គ្រួសារចាញ់	គ្រួសារឈាម	គ្រួសារស្នំ	អាសន្នរោគ	រាគ	គ្រួសារពោះវៀន	សើស្បែក
	3	3	8	0	5	6	2
%	11%	11%	30%	0%	19%	22%	7%

សំគាល់: គ្រួសារនិមួយៗអាចកើតជំងឺ ១ ឬ ២ ។

ក្រុមការងារក៏បានជួបជាមួយតំណាងបុគ្គលិកអង្គការ GRET-SKY (សុខភាពគ្រួសារយើង) សំរាប់ជួយ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល ត្រីក្រដែលខ្វះខាតថវិកាក្នុងការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងគ្រួសារនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា បច្ចុប្បន្នខាង អង្គការបានជួយដល់ ជនក្រីក្រតាមរយៈគ្រួសារមូលនិធិសមធម៌ចូលជាសមាជិកដោយបង់ថ្លៃសេវាថែទាំគ្រួសារ។ ហើយអង្គការ បានធ្វើកិច្ចសហការល្អ ជាមួយមន្ទីរពេទ្យកំពតនិងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួន។ តាមរយៈគ្រួសារមូលនិធិសមធម៌នេះនៅ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១០ នៅមណ្ឌលសុខភាពសូមមើលតារាងលេខៈខាងក្រោម៖

តារាងលេខៈ៦២១ តម្លៃប្រាក់វិភាគបានម្សៅទំនប់បូលនិធិសមធម៌


ទំហំគ្រួសារ	វិភាគបានរយៈពេល១ ខែ ជាម្សៅ
១ នាក់	៤០០០ រៀល
ពី ២ ទៅ ៤ នាក់	៧៥០០ រៀល
ពី ៥ ទៅ ៧ នាក់	៩៥០០ រៀល
ចាប់ពី ៨ នាក់ឡើងទៅ	១១០០០ រៀល

យោងតាមទិន្នន័យសុខភាពក្នុងឆ្នាំ២០១០ ពីមណ្ឌលសុខភាពកំពង់ត្រែង បានបង្ហាញអោយឃើញថាករណីជំងឺនីមួយៗ មានពិពណ៌នាក្នុងតារាង១៦៣។ មណ្ឌលសុខភាព នេះគ្រប់ដណ្តប់លើពីរឃុំ និងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ដណ្តប់ដោយ មណ្ឌលសុខ ភាពនេះមានចំនួន ១២,៣៩៩ នាក់ ។ ចំណែកឯមណ្ឌលសុខភាពព្រៃឃ្មុំវិញ គ្រប់ដណ្តប់ លើឃុំចំនួន៣ និងភូមិចំនួន១៣ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ១៧ ៧៦៨នាក់ ។ ហើយនៅក្នុងតារាងនេះទៀតសោត គឺមិនបាន បែងចែកភូមិទេ ។


តារាងលេខ៦២គ៖ ប្រភេទជំងឺដែលកើតមាននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពសិក្សាថ្ងៃទី ១០ មិនា ឆ្នាំ ៣១ ឬ ២០១០

ស្រុកទឹកល្អ		
មណ្ឌលសុខភាពកំពង់ត្រែង		
1	simple Diarrhea (រាគធម្មតា)	343
2	Malaria (គ្រុនចាញ់)	44
3	Dysentery (រាគមួល)	36
4	Skin infection (ស៊ីស្តូអ៊ីត)	245
5	Eye diseases (ជំងឺភ្នែក)	24
មណ្ឌលសុខភាពព្រៃឃ្មុំ		
1	Simple Diarrhea (រាគធម្មតា)	159
2	Malaria (គ្រុនចាញ់)	49
3	Dysentery (រាគមួល)	142
4	Dengue Fever (គ្រុនឈាម)	0
5	Cholera (អាសន្នរោគ)	29

ប្រភព៖ ផ្តល់ដោយមណ្ឌលសុខភាពកំពង់ត្រែង និងព្រៃឃ្មុំ ឆ្នាំ ២០១០ ។



រូបថតមណ្ឌលសុខភាពព្រៃឃ្មុំ




រូបថតមណ្ឌលសុខភាពកំពង់ត្រែង

៥.៤. ៧ ផ្លូវគមនាគមន៍

ទីតាំងគម្រោងស្ថិតនៅទិសពាយព្យប្រមាណ១៥គមពីទីរួមខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នៅជុំវិញនិងតំបន់គម្រោងមានដូចតទៅ៖


- ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចេញពីទីរួមខេត្តកំពតទៅវាលវេញមានប្រវែង៥៤គមសព្វថ្ងៃបានសាងសង់រួចហើយដោយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូ ។
- ផ្លូវលេខ៣៨ចូលទៅតំបន់ទឹកឈូមួយខ្សែប្រវែងប្រមាណ១០,៧៦គ.ម (គិតត្រឹមផ្លូវបំបែកពីផ្លូវជាតិលេខ៣) សព្វថ្ងៃចាក់កៅស៊ូរួចហើយប្រវែង ៨២៥០ម ហើយប្រវែង ១៤២៥ម បានជួសជុលកែលំអដោយក្រុមហ៊ុន Sinohydro kamchay.
- ផ្លូវលំដបបទខាងឆ្វេងដៃគឺផ្លូវម៉ាកេង(ធៀបតាមទិសដៅទឹកហូរនៃព្រែកទឹកឈូ) មាន១ ខ្សែប្រវែង ៧,៥៣គម គិតត្រឹមស្ពានដែកដែលសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sinohydro kamchay ដែលជាប្រភេទ ផ្លូវដីក្រាលគ្រួសក្រហមប្រវែងសព្វថ្ងៃមានលក្ខណៈពិបាកដោយ កន្លែងក្នុងការធ្វើដំណើរ ហើយរថយន្ត តូចអាចចូលបាន ចាប់ពីគល់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាភូមិ (ស្ពានថ្មីឆ្លងកាត់ព្រែកកំពង់បាយ) ដល់ឃុំស្ទឹងកែវ ។

- ផ្លូវ១ខ្សែទៀត មានប្រវែងប្រមាណជា ១០,៦៨គម គិតចាប់ពីផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ ៣ រហូតដល់ប៉ុស្តិ៍យ៉ាមរបស់ក្រុមហ៊ុន ខាងស្តាំដៃ(ទិសដៅពីភ្នំពេញ ទៅកំពត) ដែលសាងសង់ឡើងដោយក្រុម ហ៊ុន Synohydro kamchay .
- ចំពោះផ្លូវទឹកមានតែព្រែកទឹកឈូ និងដៃរបស់វា ដូចជា ព្រែកកំពង់ក្រុង ព្រែកអណ្តូងជីម៉ិន និង ស្ទឹងកែវ ក៏ប៉ុន្តែផ្លូវទឹកទាំងនេះពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរតាមកាណូតធំៗក្នុងរដូវប្រាំង ។



កំណាត់ផ្លូវចាក់បេតុងចាប់ពីប៉ុស្តិ៍បរិស្ថានទឹកឈូរហូតដល់ទីស្ពានដែកតាំងតំបោងដែលសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន

កំណាត់ផ្លូវថ្មី ឈ្មោះL6ចាប់ពីផ្លូវបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ៣ រហូតដល់ទីតាំងតំបោង និងឆ្លងកាត់ព្រែកស្ទឹងកែវ សាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន



កំណាត់ផ្លូវចាក់ក្រាលគ្រួសក្រហមស្របតាមផ្លូវជាតិលេខ ៣ មានប្រវែង ១៣,៨៣គមចាប់ពីផ្លូវចូលការដ្ឋានយកផ្លូវរហូតដល់ផ្លូវ L6 ។

៥.៤.៨ វិស័យទេសចរណ៍

ខេត្តកំពតជាខេត្តមួយស្ថិតនៅជាប់តំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងឈាងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលសំបូរដោយ ជួរភ្នំ និងភ្នំដែលគ្របដណ្តប់ដោយ ព្រៃឈើ ជ្រោះ ស្ទឹង ព្រែក អូរ និងឆ្នេរខ្សាច់ ទាំងអស់ហើយនេះគឺជាធនធាន ធម្មជាតិបំរើអោយវិស័យទេសចរណ៍។ ក្រៅពីធនធានធម្មជាតិខេត្តកំពតមានធនធានវប្បធម៌មួយចំនួនរួមមានប្រាសាទតុហារផងដែរ។ ដោយធនធានសំខាន់ៗ ទាំងពីរខាងលើបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសំរាប់រមណីយដ្ឋាន ធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ ។ ជាក់ស្តែងបច្ចុប្បន្ននេះទូទាំងខេត្តមានរមណីយដ្ឋានរហូតដល់ទៅ ១៣កន្លែង។ យោងតាមអត្ថបទសារព័ត៌មាន របស់ DAP ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១បានអោយដឹងថា នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាមកន្លងទៅនេះនៅរមណីយដ្ឋានទាំង១៣ កន្លែងទូទាំងខេត្តដូចជា ទឹកឈូ,កែបថ្មី, ភ្នំបូកគោ, ភ្នំកំពង់ ត្រាច,ប្រាសាទភ្នំឈ្មោក, ភ្នំសរ,ព្រែកអំពិល, ប្រាសាទភ្នំខ្យង, ភ្នំដូង, ទំបន់ម្លូច,ទំបន់ប្រទាក់ក្រលា, អន្លង់ធំ និងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះ សត្វព្រៃមានភ្ញៀវប្រមាណជា៣៨,៧៦៩នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវបរទេសចំនួន ៧១៨ នាក់ បានមកកំសាន្តលេង។ ចំនួននេះកើនឡើង រហូត២,០៥៣ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឱកាសដូចគ្នានេះនៅ ឆ្នាំ២០១០ ដែលមានភ្ញៀវសរុប ១៨,៨៧៥ នាក់ ភ្ញៀវ បរទេស៦៧៨នាក់។តាមស្ថិតិរបស់មន្ទីរ ទេសចរណ៍បានអោយដឹងថារយៈ ពេលបួនថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ទី ០៦ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ នៅរមណីយដ្ឋានទាំង១៣កន្លែងនេះ

មានភ្លៀវមកលេងចំនួន ៣៨,៧៦៩នាក់ ក្នុងនោះភ្លៀវបរទេសចំនួន ៧១៨នាក់ បានមកកំសាន្តលេង។ កត្តាដែលនាំអោយភ្លៀវមានករណីឡើងត្រូវបានមន្ត្រីទេសចរណ៍អះអាងថាបញ្ហាការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ ៣ជិតសម្រេចរួចរាល់នោះដែលជាមូលហេតុបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សម្រាប់ភ្លៀវធ្វើដំណើរមកលេងកំសាន្តនោះ។ យោងតាមការសិក្សារបស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពតនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ បានអោយដឹងថា សំរាប់ភ្លៀវទេសចរណ៍បរទេសជាមធ្យមក្នុងម្នាក់ចំនាយប្រមាណជា៤៥ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃ ចំណែកភ្លៀវទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកជាមធ្យមក្នុងម្នាក់ចំណាយប្រមាណជា ១០ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ ខាងក្រោមនេះជាតារាងចំនួនភ្លៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទាំង ១៣កន្លែងសរុប រយៈពេល០៥ឆ្នាំ (ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៦ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១០)របស់មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត)។ យោងតាមការសិក្សាអង្កេត នៅទីវាល ដោយក្រុមការងាររយៈពេល៤ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ អង្គារ ដើមសប្តាហ៍ និងពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ទៅលើចំនួនភ្លៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកឈូបានបង្ហាញឃើញថាភាគច្រើនភ្លៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅតំបន់ទឹកឈូ គឺចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ដោយឡែកចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់ សុក្រ គឺមិនសូវមកមានភ្លៀវទេ។ ចំពោះភ្លៀវទេសចរក្នុងស្រុក (មិនមែនបរទេស) ការចូល ទៅលេងក្នុងរមណីយដ្ឋានទឹកឈូនេះមិនយកលុយទេលើកលែងតែថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ រីឯថ្ងៃបុណ្យទាន។ ដោយឡែកនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ រីឯថ្ងៃបុណ្យទានសំរាប់ភ្លៀវទេសចរក្នុងស្រុកត្រូវបានបង់ប្រាក់តែលើយានយន្ត ដូចជា ម៉ូតូមួយគ្រឿង ១០០០ រៀល, រថយន្តធុនតូច មួយគ្រឿង គឺ ២៥០០រៀល, មីនីប៊ីស ៣០០០រៀល, ក្រុងធុនធំ ៥០០០រៀល រីឯ ភ្លៀវទេសចរវិញម្នាក់ ១ ដុល្លារអាមេរិក។ តារាង ៦២យ ខាងក្រោម៖

តារាងលេខ៖៦២យ ចំនួនភ្លៀវទេសចរជាតិ និង អន្តរជាតិមកកំសាន្តនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកឈូ សិក្សាថ្ងៃទី ១០ មីនា ដល់ ១៥ កក្កដា ២០១០

ល.រ		ទេសចរក្នុងស្រុក			ទេសចរបរទេស			
ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កុម្ភា ២០១១								
1	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី
2	៣០	០៥	០៣	០១	០២	០១		០
សរុប	៣០	០៥	០៣	០១	០២	០១	០	០
ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កុម្ភា ២០១១								
ល.រ		ទេសចរក្នុងស្រុក			ទេសចរបរទេស			
1	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី
2	២៥	០	០៤	០	០៦	០៣	០	០
សរុប	២៥	០	០៤	០	០៦	០៣	០	០
ល.រ		ទេសចរក្នុងស្រុក			ទេសចរបរទេស			
ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភា ២០១១								
1	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី
2	៨៨	១៨	១៧	០៣	៤០	១៨	០	០១
សរុប	៨៨	១៨	១៧	០៣	៤០	១៨	០	០១
ល.រ		ទេសចរក្នុងស្រុក			ទេសចរបរទេស			
ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភា ២០១១								
1	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី	មនុស្ស	ម៉ូតូ	រថយន្ត	រ៉ឺម៉កកង់បី
2	២៦៧	០	៣៩	០	១១	៦	០	០
សរុប	២៦៧	០	៣៩	០	១១	៦	០	០

សំគាល់៖ សិក្សាថ្ងៃទី ១៩ ដល់២០ និង ២៣ ដល់២៤ ខែ កុម្ភា ឆ្នាំ ២០១១ ។

តារាងលេខ ៦៣: បំនុំផ្សេងៗនៃសមាសធាតុនិងអន្តរជាតិសរុបដែលនៅសេសសល់នៅមេឌីដ្យានទឹក

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦-២០១០


ល.រ	ឆ្នាំ	ភ្នំវិទ្យុសកម្មបរទេស	ភ្នំវិទ្យុសកម្មក្នុងស្រុក
១	២០០៦	២៣៣៣	២៧៥៦៤៤
២	២០០៧	៣០៨៤	២៣៨០០២
៣	២០០៨	២៨០៩	២៥៦៨៧៥
៤	២០០៩	៤១៩៥	១៧៦៥៦៣
៥	២០១០	១៨៨៤	៦៧៦៥៨

ប្រភព: ផ្តល់ដោយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពតឆ្នាំ ២០១០ ។

ស្ថិតិផ្សេងៗនៃសមាសធាតុ និងអន្តរជាតិ តាមមេឌីដ្យាន នានាក្នុងខេត្តកំពត ២០០៦		
ឈ្មោះមេឌីដ្យាន	ភ្នំវិទ្យុសកម្មបរទេស	ភ្នំវិទ្យុសកម្មក្នុងស្រុក
១. ទឹកឈូ	2333	275644
២. កែបថ្មី	161	352
៣. ភ្នំបូកគោ	2485	1653
៤. ភ្នំកំពង់ត្រាច	739	3170
៥. ប្រាសាទភ្នំឈ្លាក់	1259	3864
៦. ភ្នំសរ	110	360
៧. ព្រែកអំពិល	483	2325
៨. ប្រាសាទភ្នំខ្យង	108	293
៩. ភ្នំដូង	203	329
១០. មជ្ឈមណ្ឌលសម្រៀងសត្វព្រៃ	177	275644
សរុបចំនួន ១០ មេឌីដ្យាន	8058	287990
ស្ថិតិផ្សេងៗនៃសមាសធាតុ និងអន្តរជាតិ តាមមេឌីដ្យាន នានាក្នុងខេត្តកំពត ២០០៧		
ឈ្មោះមេឌីដ្យាន	ភ្នំវិទ្យុសកម្មបរទេស	ភ្នំវិទ្យុសកម្មក្នុងស្រុក
១. ទឹកឈូ	3084	238002
២. កែបថ្មី	146	916
៣. ភ្នំបូកគោ	2154	5731
៤. ភ្នំកំពង់ត្រាច	946	2798
៥. ប្រាសាទភ្នំឈ្លាក់	1147	6138
៦. ភ្នំសរ	87	495
៧. ព្រែកអំពិល	191	2443
៨. ប្រាសាទភ្នំខ្យង	58	994
៩. ភ្នំដូង	176	1130
១០. មជ្ឈមណ្ឌលសម្រៀងសត្វព្រៃ	271	39634
សរុបចំនួន ១០ មេឌីដ្យាន	8260	298281
ស្ថិតិផ្សេងៗនៃសមាសធាតុ និងអន្តរជាតិ តាមមេឌីដ្យាន នានាក្នុងខេត្តកំពត ២០០៨		
ឈ្មោះមេឌីដ្យាន	ភ្នំវិទ្យុសកម្មបរទេស	ភ្នំវិទ្យុសកម្មក្នុងស្រុក
១. ទឹកឈូ	2809	256875

២. កែបថ្មី	108	615
៣. ភ្នំបូកគោ	1690	2235
៤. ភ្នំកំពង់ត្រាច	1600	3476
៥. ប្រាសាទភ្នំឈ្មោក	1730	4380
៦. ភ្នំសរ	46	293
៧. ព្រែកអំពិល	171	1966
៨. ប្រាសាទភ្នំខ្យង	50	310
៩. ភ្នំដូង	97	324
១០. មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ	471	256875
សរុបចំនួន ១០ រមណីយដ្ឋាន	8772	270474
ស្ថិតិភ្នំភ្នែងទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ តាមរចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងខេត្តកំពត ២០០៩		
ឈ្មោះរមណីយដ្ឋាន	ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេស	ភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
១. ទឹកល្អ	4195	176563
២. កែបថ្មី	216	527
៣. ភ្នំបូកគោ	651	1780
៤. ភ្នំកំពង់ត្រាច	1874	3403
៥. ប្រាសាទភ្នំឈ្មោក	2274	3587
៦. ភ្នំសរ	52	262
៧. ព្រែកអំពិល	830	2650
៨. ប្រាសាទភ្នំខ្យង	127	460
៩. ភ្នំដូង	230	614
១០. មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ	1117	176563
សរុបចំនួន ១០ រមណីយដ្ឋាន	11566	189846
ស្ថិតិភ្នំភ្នែងទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ តាមរចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងខេត្តកំពត ២០១០		
ឈ្មោះរមណីយដ្ឋាន	ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេស	ភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
១. ទឹកល្អ	1884	67658
២. កែបថ្មី	608	3192
៣. ភ្នំបូកគោ	3230	44736
៤. ភ្នំកំពង់ត្រាច	1919	25299
៥. ប្រាសាទភ្នំឈ្មោក	2618	5290
៦. ភ្នំសរ	301	2043
៧. ព្រែកអំពិល	3335	11630
៨. ប្រាសាទភ្នំខ្យង	322	2067
៩. ភ្នំដូង	360	1427
១០. ទំនប់មេ្តច	641	21837
១១. ទំនប់ប្រមាញ់ក្រឡា	521	21666
១២. មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃ	1190	18353
១៣. សហគមន៍ ព្រែកត្នោត	11	12949
សរុបចំនួន ១៣ រមណីយដ្ឋាន	16940	238147


ប្រភព៖ ផ្តល់ដោយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពតឆ្នាំ ២០១០ ។




តារាងលេខ ១៥ : បង្ហាញពីបំណុលក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១០

ឆ្នាំ	ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ	ភាគរយ %	កើនឬថយចុះប្រសិនបើមាន	ក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់	ភាគរយ %	កើនឬថយចុះប្រសិនបើមាន
2006	2333			275644		
2007	3084	132.19 %	+32.19 %	238002	86.34 %	-13.66 %
2008	2809	91.08 %	-8.92 %	256875	107.93 %	+7.93 %
2009	4195	149.34 %	+49.34 %	176563	68.73 %	-31.27 %
2010	1884	44.91 %	-55.09 %	67658	38.32 %	-61.68 %

សំគាល់: (+) ចំនួនក្រុមហ៊ុនកើនឡើង, (-) ចំនួនក្រុមហ៊ុនថយចុះ



ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកសិកម្មបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម (2011)



មេធាវីជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការកសិកម្មបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម (2011) ទំនប់ប្រឆាំងកំរាមមានក្រុមហ៊ុនកសិកម្មបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម

សន្និដ្ឋាន:

- ប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ដោយពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើជាមធ្យម ប្រចាំឆ្នាំ២០១០ក្នុងមួយគ្រួសារគឺប្រមាណជា \$1,343.87 បើធៀបនឹងការថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅ នឹងឆ្នាំ២០០៦ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងគ្រួសារគឺ \$ 1,720.50 ។ គម្រោងនេះក៏អាចប៉ះពាល់ផងដែរដល់ មុខរបរអ្នករកអនុផលព្រៃឈើ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ ដូចជាអនុផលព្រៃឈើមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ជាច្រើនឆ្នាំដែលបណ្តាលអោយមានការបាត់បង់, ការកើន ឡើងនៃតម្លៃការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។
- ចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ២០១០ជាមធ្យមរបស់អាជីវករលក់ដូរនៅទីកណ្តុរី \$ 953.22 បើប្រៀប ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០០៦ គឺមានរហូតដល់ \$ 2,186.17 ។ ដូចនេះគម្រោងនេះ អាចនឹងធ្វើអោយ ប៉ះពាល់ដោយសារ គម្រោងនេះដែរ ដូចជា គ្មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សំរាប់អោយភ្ញៀវមកដូតកំសាន្តលេង, ទឹកមានសភាពល្អក់, (ឧទាហរណ៍ នៅរដូវបុណ្យភ្ជុំក្នុង ឆ្នាំ២០១០ ពេលដែលភ្ញៀវ កំពុងដូតទឹកលេង ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុន បានបិទទឹកធ្វើអោយភ្ញៀវមិនសប្បាយចិត្ត) ។ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានកត្តាជា ច្រើនទៀតដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់ ដូចជា ស្ថានយោបល់ដាច់មិនទាន់បានជួសជុល , ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ, សេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារមានការធ្លាក់ចុះ(ឧទាហរណ៍: ភ្ញៀវភាគច្រើន ពេលមកលេង កំសាន្តពួក គាត់ច្រើនតែដាក់ម្ហូបអាហារមកជាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ), ការដាក់ វេនគ្នាដើម្បីទទួល ភ្ញៀវតាមថ្ងៃ, កំណើននៃតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តមានរហូតដល់ទៅ១៣ កន្លែង ។
- ចំពោះគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដោយសារការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះក៏ត្រូវបានទទួល សំណង រួចរាល់ហើយដែរ តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ។